





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/3

1400
A/3

A. XVII

Presented to
Henry S. Wellcome
by
General J. W. Foster
February 2nd

a. 26. a. 6738

AVRELII
COR. CELSI
DE RE MEDI-
CA LIBRI
OCTO.

ITHM

Q. SERENI Liber de Medicina.
Q. RHEMNII Fannii Palæmonis
de Ponderibus & Mensuris Liber.

*Omnia ex diuersorum codicum diligen-
tissima collatione castigata.*



LVGDVNI,
Apud Ioan. Tornæsum, & Gu-
lielmum Gazeium.

1549.

LECTORI.

NVIDIT profectò Fortuna populo Romano integrā, absolutamq; felicitatē. Nam cū bellicis artibus, & reipublice administranda peritia, ea ciuitas omnibus omnino pręstiterit nationibus, quę vel antecesserūt, vel sequutę sunt Romanum imperium: deerat illi certē nihil ad cumulum virtutum omnium, nisi vt doctrinās, atq; literas excoleret: quarū iamdiu tamen gloriam ingeniosissima, ac disertissima Gręcia cum scribendo, tum dicendo occupasse videbatur. Verū et si serò Eloquentiam, Philosophiamq; attigerit: tantos tamē in vtraq; progressus fecit, vt multos Roma habuerit nobilissimos homines postremis temporibus, non solū Philosophię deditos, sed in ea iam excellentes atq; perfectos. Eloquentia verò tantū in ea vrbe sibi paucissimis annis uendicauit, ut eloquētissimas Athenas vel æquarit, uel paruo illis proxima interuallo fuerit: id quod probare esset aut facile, aut necessarium, si pręclarissima extarent illorū monumenta, qui plurimum dicendo potuerunt, Antoniorū scilicet, & Catonum, & Crassi, & Caesarum, & Bruti, & aliorū propē innumerabilium: aut nisi vnus esset Cicero, quē omnibus aut pręferre, aut comparare saltem, opponereq; valeamus. Itaq; in Astrologia, in Geometria, in Dialecticis, omnibusq; ijs artibus, quę in veri inuestigatione versantur,

a 2 legim

legimus dignū conatibus suis præstitisse Roma-
na ingenia: sola autem Medicinæ ars, maxime
salutaris, neglecta ab illis, inculta iacuit, ac dere-
lictæ: eam enim vnā Græcarū artium non exer-
cuisse Romanam grauitatem, testis est Plinius:
quinimmo idem ipse scribit, Pop. Romanū medi-
cinæ auidum expertum demum damnassee: itaq;
caruisse medicis ad annum sexcentesium: quod
voluisse eos credendum est non artis odio, sed ar-
tificum: idq; Marcus Cato ad Marcum filium
scribens manifestissimè docet. Quod si aut Hip-
pocratē habuisset Roma, cui ciuium suorum salu-
tem commendaret, aut Galeni interpretis monu-
menta cognouisset: quemadmodum & in re mi-
litari, & in rebus cæteris aut superauit omnes
alias nationes, aut illis proxima fuit, & inter-
dum æqualis: verisimile est, in Medicina quoque
excellente futuram fuisse industriam suam. Hanc
tamen partē vt ostenderet Cornelius Celsus non
esse supra vires Romanas, eam eloquentissimè et
peritissimè tractauit octo libris: in quibus non so-
lum eius partis, quæ victu, & eius quæ medica-
mentis, sed illius etiam, quæ manu medetur, præ-
cepta copiosissimè dedit. A plerisq; autē dubita-
ri video, an artē Cornelius exercuerit, alijs exi-
stimantibus caruisse illum usu: vel quia quedam
prodidit artem coarguentia, qualia sunt, quæ de
venarū pulsu, et vrine indicijs, ac de imparibus
diebus, Asclepiadem sequutus, tradidit: uel quia
in ponendis constituendisq; præceptis longissimè
abijs.

abijt à consuetudine eorū, qui de re medica ante
illum scripserunt: alijs verò credentibus, non po-
tuisse eum tam multa, tamq; insigniter & arti-
culate nouisse, tamq; postremò appositè ad usum,
vt interdum multus sit in describenda via, &
ratione exercendi artificis actus: nisi eam aliter
quàm cogitando & audiendo, & legendo didi-
cisset. Quamuis autem eorū, qui Cornelium fuisse
medicum negant, & ratio, et autoritas me parū
moueāt: constat enim & Asclepiadem, & The-
misonē eius discipulum, & Thessalum tam sæpe,
tamq; vehemēter à Galeno damnatū, aberrasse à
placitis & à doctrina maiorū, cum tamē omnes
medicinam usu ipso professi fuerint: quamobrem
mirū non est, si in tam erratica disciplina, vix q;
tandem autore Galeno consistente, idq; non tam
certitudine rei, quàm imbecillitate eorū, qui post
Galenū fuerunt, libuit Cornelio modo ingenioq;
suo potius, quàm ex aliorū consuetudine scribēti,
eorum mutare præcepta, quibus superiorum de-
lere placita, & medendo & scribendo licuerat.
Quamuis, inquam, me parū illi moueant: adducor
tamen, nisi fallor, certissimis ad suspicandum ar-
gumentis, idem molitū fuisse Cornelium, quod Em-
pedoclem, & Democritum fecisse legimus: scili-
cet, vt eam artem non ueluti purus medicus, atq;
ad quæstū omnibus expositus, sed tanquam sa-
piens, ceu partē Philosophiæ explicaret, eam cum
studio sapientiæ coniungens. Nam cum Plinius
naturalis hystoriæ libros digesserit, indicans qui-
bus

bus autoribus, testibusq; niteretur: libro primo,
quem indicis loco esse voluit, separatim autorum
invenit & medicorum: neq; unquam retulit Cor-
nelium in medicos, sed in autores: Ex autoribus,
inquit, C. Valgio, Cornelio Celso, M. Varro, & c.
deinde subiicit externos: postremo numerat me-
dicos, in quibus nusquam Cornelij nomē legitur.
Quod si aut ille se medicum fuisset professus, aut
ali in numerū medicorum Cornelium recepisset,
Plinius illum certē non separasset in singulorum
librorū indice à medicis. Constat præterea, vixisse
Cornelium aut Augusti, aut Tiberij temporibus,
aut C. Caesaris: cum Columella, qui Claudio po-
tente rerum scripsit de re Rustica libros, men-
tionē fecerit eius, tanquam superioris: qua ætate,
si Plinio credimus, paucissimi Quiritū artē me-
dicam profitebantur, delegata ea cura ac medita-
tione vel Græcis hominibus, vel libertis, aut ser-
uis: quales fuerunt Sallustius, Dionysius, & Cu-
rio, & q̄, quos supra nominavi: quamobrē occi-
denti medicum, quod plerumq; servi essent, pœna
erat ex constitutionibus non valde magna pecu-
nia: liberi enim hominis nulla est æstimatio. Cor-
nelium verò fuisse ingenuum Romanū satis indi-
cant tria nomina: cum libertos constet duobus,
servos autē vno tantū nomine fuisse demonstra-
tos. Ceterum qualis qualis ille fuerit, dignus est
profecto vel doctrina vel elegātia non solum qui
legatur, sed qui semper habeatur in manibus.
Quamvis autem ubiq; illum reprehendat Fabius
Quintus

Quintilianus, itaq; interdum leuiter, vt studio id
eum efficere cognoscas & emulatione (scripsit
enim vterq; Rhetoricos libros) tamē veritate ita
cogente, eruditū virum eum appellat, lib. 1 x. &
lib. sequenti: Scripsit, inquit, non parum multa
Cornelius Celsus, Scepticos sequutus, nō sine cul-
tu, ac nitore. Columella verò lib. 1 l. De re rusti-
ca, eum fuisse tradit non solum agricolationis, sed
vniuersæ naturæ prudentē. Cū autē Cornelius
& ius ciuile, & philosophiam monumentis illu-
strauerit, suis & rei militaris, & rusticæ etiam
& medicinæ præcepta reliquerit: dignus (ut ait
idem Fabius) vel ipso proposito, vt eum scisse o-
mnia illa credamus: quis erit qui se satis putet
eruditum, cui ea, quæ supersunt, reliquæ uigilia-
rum tam elaboratarum ignotæ fuerint? Quædam
tamen ab eo fateor esse prodita, quæ vel insolentia,
vel nouitate deterrere lectore possunt: quale
illud est, quod de aqua frigida libro primo tradi-
tur: qua infusa, putat ille sanari posse infirmitatē
capitis, & præterea uitari grauedines, ac destil-
lationes: quibus intemperantia victus, et incon-
tinētia voluptatis præcipuē ætas hæc nostra gra-
uissimè torquetur. Caterum si balneis nunc ute-
remur, vbi calida sordes mundaretur capitis, &
sudor vapores iam itinere patefacto emitteret,
itaq; quotidie quasi caput purgaretur: non esset
fortasse usus aquæ frigidæ tam periculosus, quam
vulgo creditur. Neq; etiam ille simpliciter infun-
di frigidam iubet, sed calidariū proponit, in quo
a 4 sudet

sudetur: & calida aqua perfundi præcipit, tum
tepidam, deinde frigidam. Plin. item lib. XXVII.
capite IIII. Perfundere, inquit, caput aqua ca-
lida ante balnearum vaporacionem, et postea frigi-
da, saluberrimum intelligitur. Quæ res profecto
nisi esset valde salutaris, neque imperite eam &
imprudenter tum precise laudasset Cornelius: neq;
Plinius ita manifestè idem probaret: cum præ-
sertim Senecam eo remedio semper usum fuisse
legamus: cuius rei certè rationem reddere possem
à re medica non abhorrentem, si aut id mihi ab
initio proposuissem, cum epistolam hanc scribere
institui: aut esset hoc muneris partiumq; mearum.
Illud equidem animaduerti, sequutū esse Corne-
lium in plerisque; Hippocratem, quem lib. VI. pa-
rentem omnis medicinae appellat: quamobrem non
potest hic noster Latinus Hippocrates reprehendi,
quin alteri quoq; idem vitij tribuatur. nam si
dixerimus, nimis generaliter, & nulla reddita
causa hunc frequenter præcepta dedisse medi-
cinæ: cum eadē sit ratio atq; via Hippocratis, inter-
pretandus potius, & distinctionibus explican-
dus erat Cornelius, quam improbandus, atq; reij-
ciendus: id quod videmus in Hippocrate factum
fuisse à Galeno, non tam, quam isti sunt, delicato
& moroso, certè tamē doctiore atq; peritior: ita
enim didicissent medici, à Cornelio de rebus ad
artem suam pertinentibus proprijs, suisq; Latinis
vocibus loqui: & hunc grauissimum in prijs
autorem loco suo, suisq; sedibus posuissent &
post

postremo planū fecissent hominibus, non abhor-
rere penitus à uero, quod à Cicerone scriptū fuit,
Omnia Latinos inuenisse melius, quā Græcos:
aut ab illis accepta fecisse meliora. Sed inuidit (ut
dixi) Fortuna cunctam Romanis hominibus fe-
licitatē. Nos verò, qui aliquid nostra cura præ-
stare posse fortasse credimur Cornelio, quod eo
iamdiu utamur magistro scribendi, atq; uiuendi
(quamuis illi ignauia fortē nostra non æquē sty-
lum ac salutē debeamus) nonnihil temporis con-
sumpsimus in recognoscēdo hoc eruditissimo au-
tore: eumq; emendatissimū, quantum ipsi efficere
potuimus, excudendū dedimus Sebastiano Gry-
phio Typographo nobilissimo, ut tam culto, &
tam nitido scriptore uti commode possint omnes,
quibus bonæ artes curæ sunt: & ut Medicis,
quorum ætas nostra maximè ferax est, animum
faciamus ad Cornelium legendum, interpretan-
dum, illustrandum: ita enim futurum facile spe-
ramus, ut omnes paulatim planè Latine de me-
dicina loquentes audiamus: & aliquis apud no-
stros eam laudē consequi curet, quam apud Græ-
cos consequutus est Galenus: cuius nisi labor &
industria tantum luminis addidisset Hippocrati,
is fortē malo magno publico turpius extinctus
fuisset, quā iacet Cornelius: cuius laudi dignæ
immortalitate si uitio ingenij Medici horū tem-
porum, & posteriores inuidebunt, suis tamē ni-
tor & elegantia, vel illis contrā nitentibus, eum
à tenebris & ab interitu vindicabunt.

A V R E L I I
C O R N E L I I
C E L S I
D E
M E D I C I N A
L I B E R P R I -
M V S .

*



VT ALIMENTA *sanis cor-*
poribus Agricultura, sic sani-
tatem aegris Medicina promit-
tit. Hæc nusquam quidem non
est. Siquidem etiam imperitissi-
mæ gentes herbis, aliâq; prompta in auxilium
vulnerum, morborumq; nouerunt. Veruntamen
apud Græcos aliquanto magis, quam in cæteris
nationibus exculta est: ac ne apud hos quidem
à prima origine, sed paucis ante nos sæculis, ut
pote cum vetustissimus autor Aesculapius cele-
bretur. Qui quoniam adhuc rudem & vulgarem
hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deo-
rum numerum receptus est. Huius deinde duo
filij Podalyrius & Machaon bello Troiano du-
cem Agamemnonem secuti, non mediocrem opem
commilitonibus suis attulerunt. Quos tamen Ho-
merus non in pestilentia, neq; in uarijs generibus
morborum aliquid attulisse auxilij, sed vulneri-
bis tantummodo ferro, & medicamentis mederi
solitos

solitos esse proposuit. Ex quo apparet, has par-
 tes medicinae solas ab his esse tentatas, easq; esse
 vetustissimas. Eodemq; autore disci potest, mor-
 bos, tum ad iram deorum immortalium relatos
 esse, & ab iisdem opem posci solita. Veriq; simile
 est, inter nonnulla auxilia aduersae valetudinis,
 plerunq; tamen eam bonam contigisse ob bonos
 mores, quos neque desidia, neq; luxuria * vitia * tentara
 rant. Siquidem haec duo, corpora prius in Grae-
 cia, deinde apud nos affligerunt. Ideoq; multi-
 plex ista medicina, neq; olim apud Graecos, ne-
 que apud alias gentes necessaria, vix aliquos
 ex bonis ad senectutis principia perducit. Ergo
 etiam post eos (de quibus retuli) nonnulli clari
 viri medicinam exercuerunt, donec maiore stu-
 dio literarum disciplina agitari coepit: quae ut
 animo praecipue omnium necessaria, sic corpori
 inimica est. Primoq; medendi scientia, sapientiae
 pars habebatur, ut & morborum curatio, &
 rerum naturae contemplatio sub iisdem auctori-
 bus nata sit. Scilicet his hanc maxime requiren-
 tibus, qui corporum suorum robora * inquieta * quiesce
 cogitatione, nocturnaq; vigilia minuerat. Ideoq;
 multos ex sapientiae professoribus, peritos eius
 fuisse accepimus. Clarissimos vero ex his Pytha-
 goram, & Empedoclem, & Democritum. Hu-
 ius autem (ut quidam crediderunt) discipulus
 Hippocrates Coss, primus quidem ex omnibus
 memoria dignis ab studio sapientiae disciplinam
 hanc separauit, vir & arte & facundia insti-
 gnis.

Discipli-
 corpori
 mica.

Hippoc-
 res.

gnis. Post quem Diocles Carystius, deinde Pra-
xagoras, & Chrysippus, tum Herophilus &
Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiā
in diuersas curandi vias processerint. Iisdemq;
temporibus, in tres parteis medicina diducta
est, ut vna esset quæ victu, altera quæ medica-
mentis, tertia quæ manu mederetur. Primam
διατροφικὴν, secundam φαρμακευτικὴν, tertiā
χειρουργικὴν, Græci nominauerunt. Eius autem,
quæ victu morbos curat, longè clarissimi auto-
res etiam altius quædam agitare conati, rerum
quoque naturæ sibi cognitionem vendicauerunt,
tanquam sine ea trunca & debilis medicina
esset. post quos Serapion primus omnium, nihil
hanc rationalem disciplinam pertinere ad me-
dicinam professus, in usu & experimentis eam
posuit. Quem Apollonius & Glaucias, & ali-
quanto post Heraclides Tarentinus, & aliqui
non mediocres viri secuti, ex ipsa professione,
se Empiricos appellauerunt. Sic in duas parteis
ea quoque quæ victu curat, medicina diuisa est,
alijs rationalem artem, alijs vsum tantum sibi
vendicantibus, nullo verò quicquam post eos,
qui suprā comprehensi sunt, agitante, nisi quod
acceperat: donec Asclepiades medendi ratio-
nem ex magna parte mutauit. Ex cuius succes-
soribus Themison nuper ipse quoque quædam
in senectute deflexit. Et per os quidem maximè
viros salutaris ista nobis professio increuit. Quo-
niam autem ex tribus medicinæ partibus, ut
diffic

difficilima, sic etiam clarissima est ea, quæ mor-
bis medetur, ante omnia de hac dicendum est. Et
quia prima in ea dissensio est, quod alij sibi ex-
perimentorum tantummodo notitiam necessa-
riam esse contendunt, alij nisi corporum rerumq;
ratione comperta, non satis potentem usum esse
proponunt: indicandum est, quæ maxime ex
utraq; parte dicantur, quò facilius nostra quo-
que opinio interponi possit. Igitur hi, qui ratio-
nalem medicinam profitentur, hæc necessaria
esse proponunt, Abditarum, & morbos conti-
nentium caussarum notitiam, deinde Euiden-
tium, post hæc etiam Naturalium actionum, no-
uissimè partiũ Interiorum. Abditas caussas vo-
cant, in quibus requiritur, ex quibus principijs
nostra corpora sint, quid secundam, quid aduer-
sam valetudinem faciat. Neque enim credunt
posse eum scire, quomodo morbos curare conue-
niat, qui vnde hi sint, ignoret. Neque esse dubiũ,
quin alia curatione opus sit, si ex quatuor prin-
cipijs, vel superans aliquid, vel deficiens aduer-
sam valetudinem creat, vt quidam ex sapien-
tiæ professoribus dixerunt, alia, si in humidis
omne vitium est, vt Herophilo visum est: alia,
si in spiritu, vt Hippocrati: alia, si sanguis in
eas venas, quæ spiritui accommodatæ sunt, trans-
funditur, & inflammationẽ, quàm Græci φλε-
γμωνιν, nominant, excitat, eaq; inflammatio,
talem motum efficit, qualis in febre est, vt Era-
sistrato placuit: alia, si manantia corpuscula, per
inuisib

inuisibilia foramina subsistendo, iter claudunt,
ut Asclepiades contendit. Eum verò recte cu-
raturū, quem prima origo causſæ non sefellerit.
Neq; verò inficiantur, experimenta quoque esse
necessaria. Sed ne ad hæc quidē aditum fieri po-
tuisse, nisi ab aliqua ratione contendunt. Non
enim quidlibet antiquiores viros ægris inculcas-
se: sed cogitasse, quid maxime conueniret, & id
vſu explorasse, quod antè coniectura aliqua du-
xiſſent. Neq; interesse, *an nunc iā pleraq; explo-
rata ſint, ſi à conſilio tamē cœperunt. Et id qui-
dem in multis ita ſe habere. Sæpe verò etiā noua
incidere genera morborum, in quibus nihil ad-
huc vſus oſtenderit. Et ideo neceſſarium ſit ani-
maduertere, vnde ea cœperint: ſine quo nemo
mortalium reperire poſſit, cur hoc, quā illo po-
tius vtatur. Et ob hæc quidem in obſcuro poſitas
cauſſas perſequuntur. Euidentes verò has appel-
lant, in quibus quaerunt initium morbi calor attu-
lerit, an frigus: fames, an ſatietas: & quæ ſimi-
lia ſunt. Occurſurum enim vitio dicunt eum, qui
originem non ignorarit. Naturales verò corporis
actiones appellant, per quas ſpiritum trahimus,
& enittimus cibum, potionemq; et aſſumimus,
& concoquimus. Itemq; per quas eadem hæc in
omnes membrorū partes digeruntur. Tum requi-
runt etiā, quare venæ noſtræ modò ſubmittāt ſe,
modò attollant: qua ratio ſomni, quæ vigiliæ ſit.
Sine quorū notitia neminem putant vel occurre-
re, vel mederi morbis inter hæc naſcētibus poſſe.
Ex

Ex quibus quammaxime pertinere ad rem concoctio videtur. Huic potissimum insistant, & duce alij Erasistrato, atteri cibum in ventre contedunt: alij Plistonico, Praxagorae discipulo, putrescere: alij credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntq; Asclepiadis emuli, qui omnia ista vana & superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudam materiam (sicut assumpta est) in corpus omne diduci. Et haec quidem inter eos parum constant. Illud vero convenit, aliud dandum cibum laborantibus, si hoc: aliud, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum querendum esse, qui facillime teri possit. Si putrescit, eum in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum qui maxime calorem moueat. At nihil ex his esse querendum, si nihil concoquitur. Ea vero sumenda quae maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademq; ratione cum spiritus grauis est, cum somnus, aut vigilia urgent, eum mederi posse arbitratur, qui prius illa ipsa qualiter eueniant perceperit. Praeter haec cum in interioribus partibus & dolores, & morborum varia genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, quae ipse ignoret. Necessarium ergo esse incidere corpora mortuorum, eorumq; viscera atque intestina scrutari: longeq; optime fecisse Herophilum, & Erasistratum, qui nocentes homines à regibus ex carcere acceptos, viuos inciderint, considerarintq; etiam spiritu remanente, ea quae natura antè clausisset, eorumq; posita

posituram, colorem, figuram, magnitudinē, ordi-
nem, duriciem, molliciem, lauorem, contactum:
processus deinde singulorum, & recessus: & si-
ue quid inseritur alteri, siue quid partē alterius
in se recipit. Neq; enim cum dolor intus incidit,
scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque
viscus, intestinum ue sit, non cognouerit. Neque
curari id quod aegrum est posse, ab eo, qui quid
sit, ignoret. Et cum per vulnus alicuius viscera
patefacta sunt, eum qui sanæ cuiusquam colorem
partis ignoret, nescire quid integrum, quid cor-
ruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corru-
ptis, aptiusq; extrinsecus imponi remedia, com-
pertis interiorum & sedibus & figuris, cogni-
taq; eorum magnitudine: similesq; omnia, que
posita sunt, rationes habere. Neq; esse crudele (si-
cut pleriq; proponunt) hominum nocentium, &
horum quoq; paucorum supplicijs, remedia popu-
lis innocentibus seculorum omnium quæri. Con-
trà, hi qui se Empiricos ab experientia nomi-
nant, euidentes quidem causas, vt necessarias
amplectuntur: obscurarum verò causarum, &
naturalium actionum questionem ideo superua-
cuam esse contendunt, quoniam incomprehensi-
bilis natura sit. Non posse verò comprehendere, pa-
tere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia:
cum de ista re, neque inter sapientiæ professō-
res, neq; inter ipsos medicos conueniat. Cur enim
potius aliquis Hippocrati credat, quàm Hero-
philo? Cur huic potius, quàm Asclepiadi? Si ra-
tiones

LIBER I. 17
tiones sequi velit, omnium posse videri non impro-
probabiles: si curationes, ab omnibus his egros
perductos esse ad sanitatem. Ita neque disputa-
tioni, neque auctoritati cuiusquam fidem deroga-
ri oportuisse. Etiam sapientie studiosos maxi-
mos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret: nunc
illis verba superesse, deesse medendi scientiam.
Differre quoque pro natura locorum genera
medicinae, & aliud opus esse Romae, aliud in
Aegypto, aliud in Gallia. Quod si morbos
eadem causae facerent ubique, remedia quo-
que ubique eadem esse debuissent. Saepe etiam
causas apparere, ut puta lippitudinis, vulne-
ris, neque ex his patere medicinam. Quod si scien-
tiam hanc non subiiciat evidens causa, mul-
tominus eam posse subicere, quae in dubio est.
Cum igitur illa incerta, incomprehensibilisque sit,
à certis potius, & exploratis petendum esse
praesidium, id est his, quae experientia in ipsis
curationibus docuerit, sicut in ceteris omnibus
artibus. Nam ne agricolam quidem, aut gu-
bernatores disputatione, sed usu fieri. Ac ni-
hil istas cogitationes ad medicinam pertine-
re: eò quoque disci, quod qui diuersa de his sen-
serint, ad eandem tamen sanitatem homines
perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscu-
ris causis, neque à naturalibus actionibus, quae
apud eos diuersae erant, sed ab experimentis,
prout cuique responderant, medendi vias traxe-
rint. Ne inter initia quidem ab istis questionibus
b deduct

deductam esse medicinam, sed ab experimentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter auiditatem primis diebus, protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidium abstinnisse, leuatumque; magis eorum morbum esse, qui abstinnerant: itemque; alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem eius, optime deinde huius cessasse, qui post finem febris id fecerint. Eademque; ratione, alios inter principia protinus usus esse cibo pleniore, alios exiguo, grauiioresque; eos factos, qui se implerent. Hac, familiarique; cum quotidie inciderent, diligentes homines notasse, quae plerumque melius responderent: deinde agrotantibus ea praecipere coepisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciose discernentem a salutaribus. Repertis deinde iam medicinae remedijs, homines de rationibus eorum differere coepisse, nec post rationem medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quaesitam. Requiritur etiam, si ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem, superuacuum esse: Si aliud, esse contrariam. Primum tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc vero iam explorata esse, neque ulla aut noua genera morborum reperiri, aut nouam desiderari medicinam. Quod si iam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit, tentatur

taturumq; remedia similia illis, quæ vicino ma-
lo sæpe succurrerint, & per eius similitudinem
opem reperturum. Neque enim se dicere consi-
lio medicum non egere, & irrationale animal
hanc artem posse præstare: sed has latentium re-
rum coniecturas ad rem non pertinere: quia non
interfit, quid morbum faciat, sed quid tollat. Neq;
ad rem pertineat, quomodo, sed quid optimè di-
geratur. Siue hac de causa concoctio *interci- *incida
dat, siue de illa: &, siue concoctio sit illa, siue
tantum digestio. Neque querendum esse quomo-
do spiremus: sed quid grauem, tardumq; spiritum
expediat. Neque quid venas moueat, sed quid
quæq; motus genera significant. Hæc autem co-
gnosci experimentis, & in omnibus eiusmodi
cogitationibus in vtranque partem diffèri pos-
se. Itaque ingenium & faciundiam vincere, mor-
bos autem non eloquentia, sed remedijs curari.
Quæ si quis elinguis, usu *discreta bene norit, *discre-
tius hunc aliquanto maiorem medicum futurum, quam
si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea
quidem, de quibus est dictum, superuacua esse
tantummodo. Id verò quod restat, etiam crude-
le, vinorum hominum aluum atq; præcordia inci-
di, & salutis humane præfidem artē, non solum
pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimā infer-
re, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia
querantur, alia non possint omnino cognosci,
alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, leno-
rem, mollitiē, duritiem, similiaq; omnia non esse
b 2 talia

20
taliam inciso corpore, qualia integro fuerint: quia
cum corporibus inuiolatis, hac tamen metu, do-
lore, inedia, cruditate, lassitudine, mille alijs me-
diocribus affectibus, sepe mutetur: multo magis
verisimile est, interiora, quibus maior mollities,
lux ipsa noua sit, sub grauissimis vulneribus, &
ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse
stultius, quam quale quicquam uiuo homine est,
tale existimare esse moriente, imò iam mortuo.
Nam utrum quidem, quò minus ad rem perti-
neat, spirante homine posse diduci? Simul atque
verò ferrum ad praeordia accessit, & discis-
sum transversum septum est, quod membrana
quadam superiores partes ab inferioribus didu-
cit (διάφραγμα Graeci vocant) hominem protin-
us animam amittere. Ita demum mortui praeor-
dia, & viscus omne in conspectum latrocinan-
tis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale
mortui sit, non quale uiui fuit. Itaque cōsequi me-
dicum, ut hominem crudeliter iugulet: non ut sciat
qualia uiui viscera habeamus. Si quid tamē sit,
quod adhuc spirante homine conspectui subijcia-
tur, id sepe casum offerre curantibus. Interdum
enim gladiatorem in harena, vel militem in acie,
vel viatorem à latronibus exceptum, sic vul-
nerari, ut eius interior aliqua pars aperiatur,
& in alio alia sita, ita sedem, positum, ordinem, fi-
guram, similiaque cognoscere prudentem medi-
cum, non cadem, sed sanitatem molientem, idque per
misericordiam discere, quod alij dira crudelitate
cognom

cognouerint. Ob hæc ne mortuorum quidem lace-
 rationem necessariam esse. Quæ etsi non crudelis,
 tamen fæda sit, cum aliter pleraque in mortuis
 se habeant. Quantum verò in viuis cognosci po-
 test, ipsa curatio ostendat. Cum hæc per multa vo-
 lumina, perq; magnæ contentionis disputationes
 à medicis sæpe tractata sint, atq; tractentur: subij-
 ciendum est quæ proxima vero videri possint.
 Ea neq; addicta alterutri opinioni sunt, neq; ab
 vtraque nimium abhorrentia, media quodam-
 modo inter diuersas sententias. Quod in plurimis
 cōtentionibus deprehendere licet, sine ambitione
 verum scrutantibus, vt in hac ipsa re. Nam quæ
 demum causse vel secundam valetudinem præ-
 stent, vel morbos excitent: quomodo spiritus, aut
 cibus, vel detrahatur, vel digeratur, ne sapientiæ
 quidem professores scientia comprehendunt, sed
 coniectura persequuntur. Cuius autem rei non est
 certa notitia, eius opinio certum reperire reme-
 dium non potest. Verumq; est, ad ipsam curan-
 di rationem nihil plus conferre, quam experien-
 tiam. Quanquàm igitur multa sint ad ipsas ar-
 tes propriè non pertinentia, tamen eas adiuuat
 excitando artificis ingenium. Itaq; ista quoq; natu-
 ræ rerum contēplatio,* quamuis non faciat medi-
 cum aptiorem, tamen medicinæ reddit profectū.
 Veriq; simile est, & Hippocratem, & Erasistra-
 tum, & quicumque alij non contenti febres &
 vlcera agitare, rerum quoq; naturam ex aliqua
 parte scrutati sunt, nō ideo quidē medicos fuisse, perfecti
 b 3 verum

* Ali
 quāis
 faciat
 dicū ap
 rem ta
 medicū
 reddit,
 perfecti

Caro ex
turalib³
prolapsa.

verū ideo quoq; maiores medicos extitisse. Ra-
tione verò opus est ipsi medicina, et si non inter
obscuras causas, neq; inter naturales actiones,
tamen saepe. *Est enim hæc ars cōiecturalis: neq;
respondet ei plerunq; non solum cōiectura, sed
etiam experientia. Et interdum non febris, non
cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Ra-
rius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse
nouus est, quem non incidere, manifestè falsum
est: cū etate nostra quedam ex naturalibus
partibus carne prolapsa, et arente, intra paucas
horas expirauerit: sic vt nobilissimi medici, neq;
genus mali, neq; remedium inuenerint. Quos ego
nihil ideo tentasse iudico, quia nemo in splendi-
da persona periclitari cōiectura sua voluerit: ne
occidisse, nisi seruasset, videretur. Veri tamen si-
mile est, potuisse aliquid cogitare, detracta tali
verecundia, et fortasse responsurū fuisse id, quod
aliquis esset expertus. Ad quod medicine genus
neq; semper similitudo aliquid cōfert, etsi quan-
do confert, tamen id ipsum rationabile est inter
multa similia genera, et morborum, et reme-
diorum cogitare, quo potissimū medicamento sit
utendum. Cū igitur talis res incidit, medicus a-
liquid oportet inueniat, quod non utiq; fortasse,
sed sepius tamen etiam respondeat. Petet autem
nouum quoq; cōsiliū, non à rebus latentibus (istæ
enim dubiæ, et incertæ sunt) sed ab his, quæ ex-
plorari possunt, id est euidentibus causis. Interest
animi fatigatio morbi, an sitis, an frigus, an ca-
lor,

lor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi, viniq;
abundantia, an intemperantia libidinis. Neq; igno-
rare huc oportet, quæ sit ægri natura, humidum
magis, an magis siccum corpus eius sit: validi ner-
ui, an infirmi: frequens aduersa valetudo, an ra-
ra: eaq; cum est, vehemens esse soleat, an levis:
brevis, an longa. Quod is vitæ genus sit secutus,
laboriosum, an quietum: cum luxu, an cum frugali-
tate. Ex his enim, similibusq; sæpe curandi noua
ratio ducenda est. Quamuis ne hæc quidē sic præ-
teriri debent, quasi nullam cōtrouersia recipiant.
Nam & Erasistratus non ex his fieri morbos
dixit, quum & alij, et ijdem aliàs post ista non
febricitarent: et quidem medici seculi nostri sub
autore (vt ipsi videri volūt) Themisone conten-
dunt, nullius causse notitiā quicquā ad curatio-
nes pertinere, satisq; esse quedam cōmunia mor-
borum intueri. Siquidem horum tria genera esse,
vnum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum.
Nam modo parum excernere ægros, modò nimium:
modò alia parte parum, alia nimium. Hæc autem
genera morborum, modò acuta esse, modò longa:
& modò increfcere, modò cōsistere, modò minui
consueuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si
corpus adstrictum est, digerendum esse: si proflu-
vio laborat, cōtinendum: si mixtum vitium habet,
occurrendum subinde vehementiori malo: & a-
liter acutis morbis medendum, aliter vetustis,
aliter increfcantibus, aliter subsistentibus, aliter
iam ad sanitatem inclinantibus. Horum obser-
b 4 natio

uationem medicinam esse, quam ita finiunt, ut
quasi viam quandam, quam *μεθόδον* Græci no-
minant, eorumque quæ in morbis communia sunt,
contemplatricem esse contendunt. ac neque ratio-
nalibus se, neque experimenta tantum spectanti-
bus annumerari volunt, cum ab illis eo nomine
* nolunt dissentiant, quod in cōiectura rerū latentium* vo-
lunt esse medicinam ab his, eò quod parum artis
esse in obseruatione experimentorum credūt. Quod
ad Erasistratum pertinet, primum ipsa eviden-
tia eius opinioni repugnat, quia raro, nisi post
horum aliquid morbus venit. Deinde nō sequi-
tur, ut quod aliū nō afficit, aut eundem aliās,
id ne alteri quidē, aut eidem tēpore alio noceat.
Possunt enim quadā subesse corpori, vel ex in-
firmitate eius, vel ex aliquo affectu, quæ vel in
alio nō sunt, vel in hoc aliās nō fuerunt, eaque per
se non tāta vi concitant morbum, tamē obnoxium
magis alijs iniurijs corpus efficiūt. Quod si con-
templationē rerū naturæ (quātemere medici sibi
vendicant) satis cōprehendisset, etiā illud scisset,
nihil omnino ob vnā causā fieri, sed id pro
causā apprehēdi, quod cōtulisse plurimum vide-
tur. Potest autē id dum solū est, nō mouere, quod
iunctum alijs maxime mouet. Accedit ad hæc,
quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāsuso in
arterias sanguine febrē fieri dicit, idque nimis re-
pleto corpore icidere reperit, cur ex duobus equē
repletis, alter in morbum inciderit, alter omni pe-
riculo vacarit (quod quotidie fieri apparet) non
discere

discreuerit. Ex quo disci potest, ut vera sit illa
transfusio, tamen illā non per se (cum pleni cor-
pus est) fieri: sed cum horum aliquid accesserit.
Themisonis verò æmuli, si perpetua quæ promit-
tunt habēt, magis etiā quānulli rationales sunt.
Neq; enim si q̄s non oīa tenet, quæ rationalis a-
lius probat, protinus alio nouo nomine artis in-
diget: si modo, quod primitū est, non memoria so-
li, sed rationi quoq; insitit. Si verò, quod pro-
pius est, vix vlla perpetua præcepta medicina-
lis ars recipit: ydē sunt quod y, quos experimēta
sola sustinent. Eo magis, quoniā si cōpresserit ali-
quē morbus, an fuderit, quilibet etiā imperiti-
simus videt. Quid aut̄ compressum corpus resol-
uat, quid solutū teneat, si à ratione tractum est,
rationalis est medicus. Si (ut ei, qui se rationa-
lem negat, consiteri necesse est) ab experientia
Empiricus est. Ita apud eū morbi cognitio ex-
tra artē, medicina intra vsum est. Neq; adiectū
quicquā Empiricorum professioni, sed dēptum
est: quoniā illi multa circūspiciunt, hi tantū fa-
cilima, & non plus quā vulgaria. Nā & qui
pecorū iumentis medētur, cum propria cu-
iusq; ex multis animalibus nosse non possint, cō-
munibus tantummodo insi-
unt. Et exteræ gen-
tes, cum subtilē medicinae rationē non nouerint,
communia tantum vident. Et qui amplē valetu-
dinarios nutriūt (quia singulis summa cura con-
sulere non sustinent) ad cōmunia ista cōfugiunt.
Neq; Hercules istud, & antiqui medici nescie-
runt.

Hinc m
dicina,
interpol
a Plinio
ita est.

runt, sed his cōtenti non fuerunt. Ergo etiā vetu-
stissimus autor Hippocrates dixit, mederi oportere
et communia, et propria intuentē. Ac ne
istī quidem ipsi intra suā professionē consistere
ullo modo possunt. Siquidē et compressorum et
fluentium morborū genera diuersa sunt, faciliusq;
id in his quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim
sanguinem, aliud bilem, aliud cibū vomere: aliud
deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud
sudore digeri, aliud tabe cōsumi. Atq; in partes
quoq; humor erumpit, vt in oculos auresq;. Quo
periculo nullum humanū membrum vacat. Nihil
autem horum sic, vt aliud curatur. Ita protinus
in his à cōmuni fluentis morbi cōtemplatione, ad
propriā medicina descendit. Atq; in hac quoq;
rursus alia proprietatis notitia sepe necessaria
est: quia non eadem omnibus, etiā in similibus
casibus opitulant. Siquidē certæ quedā res sunt,
quæ in pluribus vētem aut adstringūt, aut re-
soluunt. Inueniuntur tamen, in quibus aliter atq;
in ceteris, idē eueniat. In his ergo cōmunium in-
spectio cōtraria est, ppriorum tantum salutaris.
Et causæ quoq; æstimatio sepe morbum soluit.
Ergo etiā ingeniosissimus seculi nostri medicus,
quem nupervidimus, Cassius febricitanti cuidā,
et magna siti affecto, cum post ebrietatem eum
premi cœpisse cognosceret, aquā frigidā ingessit.
Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset,
protinus febrem somno et sudore discussit. Quod
auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo,
quod

quòd aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex
 causa, quæ antè præcesserat. Estq; etiã proprium
 aliquid & loci & tēporis, istis quoq; autoribus,
 qui cū disputāt, quemadmodum sanis homini-
 bus agēdum sit, præcipiunt, vt grauibus aut lo-
 cis aut temporibus, magis vitetur frigus, æstus,
 satietas, labor, libido, magisq; vt conquiescat ijs-
 dem aut locis, aut temporibus. si quis grauitatem
 corporis sentit, ac neq; vomitu stomachum, neq;
 purgatiōe aluum sollicitet. Quæ vera quidē sunt,
 à communibus tñ ad quædā propria descēdunt:
 nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem consi-
 derandum esse, qđ cælum qđ tempus anni sit, æ-
 gris verò non est. Quibus tanto magis omnis ob-
 seruatio necessaria est, quāto magis obnoxia of-
 fensis infirmitas est. Quinetiā morborum in ijsdē
 hominibus aliæ atq; aliæ proprietates sunt: &
 qui secundis aliqn frustra curatus est, cōtrarijs
 sepe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discri-
 mina reperiuntur, ex quibus contentus vno ero.
 Nā famem facilius fert adolescens, quā puer:
 facilius* in denso cælo, quā in tenui: facilius in
 hyeme, quā æstate: facilius vno cibo, quā pran-
 dio quoq; assuetus: facilius in exercitatus, quā
 exercitatus homo sustinet. Sæpe aut in eo magis
 necessaria cibi festinatio est, qui minus in ediam
 tolerat. Ob quæ competit eū, qui propria non no-
 uit, communia tantum intueri debere: eumq; qui
 nosse propria potest, illa quidem nō oportere ne-
 gligere, sed his quoq; insilire. Ideoq; cū par
 scientia

* Quibu
 dā vider
 hic legē
 potius,
 tenui c
 lo, quā
 dēso: &
 state qu
 hyeme:
 proptere
 quòd H
 pocrat.

at libro 1. scientia sit, vtiliorem tñ medicum esse amicū
 phor. Vē quā extraneū. Igitur vt ad propositū meū
 res hyeme redeam, rationalem quidē puto medicinam esse
 vere sūt debere, instrui verò ab euidentibus causis, obs-
 alidissimi. curis omnibus non à cogitatione artificis, sed ab
 quare per ipsa arte reiectis. Incidere autē viuorum corpo-
 a tempo- ra, & crudele, & superuacuum est: mortuorum
 a alimēta corpora discentibus necessarium. Nā positum, &
 opifiora ordinē nosse debent: quæ cadauera melius, quā
 nt exhi- viuis, et vulneratus homo representant. Sed et
 nda. Et cetera, quæ modò in viuis cognosci possunt, in
 ul^o Ae- ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius,
 neta lib. sed aliquanto mitius, vsus ipse monstrauit. His
 de 1. 6. 53. propositis, primum dicam, quemadmodum sanos
 vemequi agere cōueniat: tum ad ea transibo, quæ ad mor-
 & for- bos, curationesq; eorum pertinebunt.

Quemadmodum sanos agere conueniat.

C A P.

I.

SANVS homo, qui & bene valet,
 & suæ spontis est, nullis obligare se
 legibus debet: ac neq; medico, neq;
 iatralipta egere. Hūc oportet va-
 rium habere vitæ genus: modò ruri esse, modò in
 vrbe: sæpiusq; in agro, nauigare, venari, quiesce-
 re interdum, sed frequētius se exercere. Siquidē
 ignauia corpus hebetat, labor firmat: illa maturā
 senectutem, hic lōgā adolescentiā reddit. Prodest
 etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis
 vti: modò vngi, modo idipsum negligere: nullum
 sibi genus fugere, quo populus vtatur: interdum
 in cor

in coniugio esse, interdū ab eo se retrahere: modò
plus iusto, modò non amplius assumere: bis die
potius, quàm semel cibū capere: et semper quàm
plurimum, dummodo hunc cōcoquat. Sed ut hu-
ius generis exercitationes, cibiq; necessarij sunt,
sic athletici superuacui. Nā & intermissus pro-
pter ciuiles aliquas necessitates ordo exercita-
tionis corpus affligit: & ea corpora, quæ more
eorum repleta sunt, celerrime & senescunt, &
egrotāt. Cōcubitus verò neq; nimis concupiscen-
dus, neq; nimis pertimescendus est. Rarus, cor-
pus excitat, frequens soluit. Cū autē frequens,
non numero sit, sed natura, ratione ætatis &
corporis scire licet, eum non inutilem esse, quem
corporis neq; lāguor, neq; dolor sequitur. Idē in-
terdiu peior est, noctu tutior: ita tamē, si neq; illi
cibus, neq; hunc cū vigilia labor statim sequit̃.
Hæc firmis seruanda sunt, cauendumq; ne in se-
cunda valetudine, aduersæ præsidia cōsumantur.

Quæ stomacho imbecillis seruanda sint.

C A P. I I.

ET imbecillis stomacho (quo in numero ma-
gna pars vrbānorum, omnesq; penè cupidi
literarum sunt) observatio maior necessaria est:
ut quod vel corporis, vel loci, vel studiij ratio de-
trahit, cura restituat. Ex his igitur qui bene con-
coxit, manēt tutò surget: qui parum, quiescere de-
bet: & si manēt surgendi necessitas fuerit, redor-
mire. Qui non concoxit, ex toto conquiescere, ac
neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio
credere.

Paul⁹ A
gineta li.
ca 37. Fre
quēs cōc
bitus, co
pus rari
frigidi⁹,
imbellius
reddit.

credere. Qui crudū sine præcordiorum dolore riu-
 elat, is ex interuallo aquam frigidā bibere, &
 se nihilominus continere. Habitare verò edificio
 lucido, per flatum æstiuum hybernum solem ha-
 bente, cauere meridianum solem, matutinum &
 respertinum frigus, itemq; auras fluminū, atq;
 stagnorum, minimeq; nubilo cælo, soli aperiēti
 se committere, ne modò frigus, modò calor mo-
 ueat. Quæ res maximè grauedines, distillatio-
 nesq; concitat. Magis verò grauib; locis ista
 seruanda sunt, in quibus etiam pestilentiam fa-
 ciunt. Scire autem licet, integrū corpus esse, cum
 quotidie mane vrina alba, dein ruffa est. Illud
 concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi ex per-
 rectus est aliquis, paulum intermittere, deinde
 (nisi hyems est) fouere os multa aqua frigida
 debet, longis diebus meridiari potius ante cibū,
 sin minus, post eum: per hyemem potissimum to-
 tis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est,
 non post cibum id facere, sed post cōcoctionem.
 Quem interdū vel domestica, vel ciuilia officia
 tenuerunt, huic tempus aliquod seruandum cu-
 rationi corporis sui est. Prima autem eius cura-
 tio exercitatio est, quæ semper antecedere cibum
 debet: in eo, qui minus laborauit, et bene conco-
 xit, amplior: in eo, qui fatigatus est, & minus
 concoxit, remissior. Cōmodè verò exercent, cla-
 ra lectio, arma, pila, cursus, ambulatio: atq; hæc
 non vtiq; plana commodior est. Siquidem me-
 lius ascensus quoq; & descensus cum quadam
 varietate

Exercita-
 tio.

varietate corpus moueat, nisi tamen id perquam
 imbecillum est. Melior autem est sub diuo, quam
 in porticu: melior (si caput patitur) in sole, quam
 in umbra: melior in umbra, quam parietes, aut
 viridaria efficiunt, quam quæ tecto subest: me-
 lior recta, quam flexuosa. Exercitationis autem
 plerunq; finis esse debet sudor, aut certè lassitu-
 do, quæ citra fatigationem sit, idq; ipsum, modò
 minus, modò magis faciendum est. Ac ne his
 quidem Athletarum exemplo, vel certa esse lex,
 vel immodicus esse labor debet. Exercitationem
 recte sequitur, modò vinctio, vel in sole, vel ad
 ignem, modò balneum, sed in cõclauis, quam ma-
 xime & alto, & lucido, et spatiofo. Ex his ve-
 rò neutrum sæpe fieri oportet, sed sæpius alter-
 utrum pro corporis natura. Post hæc paulum con-
 quiescere opus est. Vbi ad cibum ventum est,
 nunquam utilis est nimia satietas. Sæpe etiam
 inutilis nimia abstinentia. Sæpe si qua intempe-
 rantia subest, *durior est in potione, quam in
 esca. Cibus à salsamentis, oleribus, similibusq;
 rebus melius incipit. Tum caro assumenda est,
 quæ assa optima, aut elixa est. Condita omnia
 duabus de causis inutilia sunt, quoniam et plus
 propter dulcedinem assumitur, & quod modò
 par est, tamen ægrius cõcoquitur. Secunda men-
 sa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coace-
 scit. Si quis itaq; hoc parum valet, palmulas po-
 maq; & similia melius primo cibo assumit. Post
 multas potiones, quæ aliquantum sitim exesse-
 runt,

Lassitu-
 est gran-
 tas corp-
 ris. Verg-
 Lassitudo
 pauera
 lo. quæ
 citra lab-
 rē acci-
 Fatigati-
 nē verò
 mietatē
 boris ite-
 gimus. I-
 Veloces
 culo
 nos, cur-
 q; fatiga-
 quod m-
 imodicū
 borē ap-
 lauit. Ve-
 de gene-
 bō lassi-
 dinis le-
 dus ē lil-
 Galeni
 Sanitate
 tuenda.
 * tutior
 Cibus.

35
runt, nihil edendum est, post satietatem, nihil
agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius con-
coquit, si quicquid assumpsit potione aquæ fri-
gidæ includit, tum paulisper inuigilat, deinde
bene dormit. Si quis interdiu se impleuit, post
cibum neq; frigori, neq; æstui, neq; labori se de-
bet committere. Ntq; enim tam facile hæc inani
corpore quàm repleto nocent. Si quibus de caus-
sis futura inedia est, labor omnis vitandus est.

Observationes quædam prout res no-
uæ accidunt, & prout corporum
genera, & sexus, & ætates,
& tempora anni sunt,

C A P.

III.

ATq; hæc quidem penè perpetua sunt. Quas-
dam autem observationes desiderant &
nouæ res, & corporum genera, & sexus, & æ-
tates, & tempora anni. Nam neq; ex salubri lo-
co in grauem, neq; ex graui in salubrem transi-
tus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima
hyeme: ex graui in eum, qui salubris est, prima
æstate transire melius est. Neq; verò ex multa
fame, nimia satietas: neq; ex nimia satietate,
fames idonea est. Periclitaturq; & qui semel, et
qui bis die cibum incontinenter, contra consue-
tudinē assumit. Item neq; ex nimio labore subitū
ociū, neq; ex nimio ocio subitus labor sine graui
noxa est. Ergo cū quis mutare aliquid volet,
paulatim debet assuescere. Omnē etiā laborem
facilius,

facilius, vel puer, vel senex, quàm insuetus ho-
mo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis otiosa vita
utilis non est, quia potest incidere laboris neces-
sitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit,
aut multo plus quàm solet, etiã is qui assuevit,
huic ieiuno dormiendũ est, multo magis, si etiam
os amarũ est, vel oculi caligant, aut venter per-
turbatur. Tum enim non dormiendum tantum-
modo ieiuno est, sed etiam in posterũ diem per-
manendum, nisi cito id quies sustulit. Quod si fa-
ctum est, surgere oportet, & lente paululum am-
bulare. At si somni necessitas non fuit, quia mo-
dicè magis aliquis laboravit, tamen ingredi ali-
quid eodẽ modo debet. Communia deinde omni-
bus sunt post fatigationem cibum sumpturus, vbi
paulum ambulauerunt, si balneum non est, calido
loco, vel in sole, vel ad ignem vngi, atq; sudare:
si est, ante omnia in tepidario residere, deinde vbi
paulum conquieuerunt, intrare, & descendere in
solum, tum multo oleo vngi, leniterq; perfricari,
iterum in solum descendere. Post hæc os aqua
calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruẽs
idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato
penè febris est, huic abunde est loco tepido dimit-
tere se inguinibus tenus in aquam calidam, cui
paulum olei adiectum sit: deinde totum quidem
corpus, maxime tamen eas partes, quæ in aqua
fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinũ, &
paulum contriti salis sit adiectũ. Post hæc, omni-
bus fatigatis, aptum est cibum sumere, eoq; hu-
mido

Puer,
Senex,
Homo.

mido uti: aqua, vel certè diluta potione esse con-
 tentos, maximeq; ea que moueat vrinam. Illud
 quoq; nosse oportet, quòd ex labore sudanti, fri-
 gida potio perniciosissima est, atq; etiam (cum su-
 dor se remisit) itinere fatigatis inutilis. A balneo
 quoque venientibus Asclepiades inutilem eam
 iudicauit. Quod in his verum est, quibus aluus
 facile, nec tutò resoluitur, quiq; facile inhorre-
 scunt. Perpetuum in omnibus non est, cum potius
 naturale sit, potione æstuantè stomachum refri-
 gerari, frigentè calefieri. Quod ita præcipio, ut
 tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti
 adhuc frigidū bibendū esse. Solet etiam prodesse,
 post varium cibum, frequentesq; dilutas potio-
 nes, vomitus, & postero die longa quies, deinde
 modica exercitatio. Si assidua fatigatio vrget,
 in vicè modò aqua, modò vinum bibendum est,
 raroq; balneo vtendum. Leuatq; lassitudinē etiam
 laboris mutatio, eumq; quem nouum genus eius-
 dem laboris pressit (id quod in consuetudine est)
 reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum
 est, insolitū contrā lassat. Quod enim contra con-
 suetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.
 Propria quædam ad eum pertinet, qui ambulan-
 do fatigatur: hunc reficit in ipso quoque itinere
 frequens frictio, post iter, primum sedile, deinde
 vinctio, tum calida aqua in balneo magis superio-
 res partes, quàm inferiores foveat. Si quis verò
 exustus in sole est, huic in balneum protinus
 eundum est, perfundendumq; oleo corpus & ca-
 put,

put, deinde in solium bene calidum descēdendum est, tum multa aqua per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At ei qui perfrixit, opus est balneo primum inuoluto sedere donec insudet, tum vngi, deinde lauari, cibum modicum, deinde potiones meracas assumere. Is verò qui nauigabit, & nausea pressus est, si multam bilem euomuit, vel abstinere cibo debet, vel paulū aliquid assumere. Si pituitam acidam effudit, utiq; sumere cibum, sed assueto leuiorem: si sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui verò toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currēdum, sed lentè ambulandum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein cœna exigua prodesse consueuerunt. Si quis in balneo æstuat, reficit hunc ore exceptum, & in eo retentum acetum. Si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisq; naturam sui corporis: quoniam alij graciles, alij obesi sunt, alij calidi, alij frigidiores, alij humidi, alij sicci, alios astricta, alios resoluta aluus exercet. Raro quisquam, non aliquam partē corporis imbecillam habet. Tenuis verò homo implere se debet, plenus extenuare: calidus refrigerare, frigidus calefacere: madens siccare, siccus madesfacere: itemq; aluum firmare is, cui fusa, soluere is, cui astricta est. Succurrendumq; semper parti maximè laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequētior quies, vinctio, & si post prandium est balneum, contra-

Et aluus, modicum frigus hyeme, somnus & plenus & non nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos & potiones maxime dulcia & pingua, cibus & frequentior, & quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisq; si salsa est, in ieiunio balneum, inurens sol, & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis, vel longus, lectus per aetatem terra, hyeme durum cubile, cursus, multa ambulatio, omnisq; vehemens exercitatio, vomitus, deiectio, acida res & austera, & semel die assumptae epulae, & vini non perfrigidi potio ieiuno in consuetudinem adducta. Cum vero inter extenuantia posuerim vomitum, & deiectionem, de
nitus. his quoq; propria quaedam dicenda sunt. Eiectum esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod de Tuenda sanitate composuit, video, neq; reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie eiciendo vorandi facultatem moliuntur. Paulo etiam longius processit. Idem purgationes quoq; eodem volumine expulit. Et sunt haec perniciosa, si nimis valentibus medicamentis fiunt. Sed haec tamen submouenda esse non est perpetuum, quia corporum temporumq; ratio potest ea facere necessaria, dum et modo, & non nisi cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid iam corruptum esset, expelli debere confessus est. Ita non ex toto res condemnanda est. Sed esse eius etiam plures causae possunt, estq; in ea quaedam

dam paulo subtilior observatio adhibenda. Vomitus utilis est hyeme, quàm æstate. Nam tum & pituita plus, & capitis gravitas maior subest. Inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. Utilis est, plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est, quàm quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet. Si verò corruptum est, nihil commodius est, quàm id, qua via primum expelli potest, eijcere. Itaq; ubi amari ructus cum dolore & gravitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Item prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens saliva, uel nausea est, aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterq; ei, qui vel cælum vel locum mutat. hisq; quibus (si per plures dies non vomuerint) dolor præcordia infestat. Neq; ignoro inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus, nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. Interdum valetudinis causa rectè fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere, et senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tanquam tepidam antè debet assumere: si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum adijcere. At qui mane vomiturus est, antè bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet, deinde aquam tepidam, ut supra

Pro
tiav

scriptum est, bibere. Cetera quæ antiqui medici
præceperunt, stomachum omnia infestant. Post
vomitum (si stomachus infirmus est) paulum cibi,
sed huius idonei, gustandum, & aquæ frigide
cyathi tres bibendi sunt. Si autem vomitus fau-
ces exasperavit, qui vomuit (si mane id fecit)
ambulare debet, tum vngi, deinde cœnare. Si post
cœnam, postero die lauari, & in balneo sudare,
hinc proximus cibus, mediocris utilior est, isq;
esse debet cum pane hesterno, vino austero, me-
raco, & carne assa, cibisq; omnibus quàm siccis-
simis. Qui vomere bis in mense vult, melius con-
sulet, si biduo continuerit, quàm si post quintum
demum diem vomuerit, nisi hæc mora gravitatem
iectio. pectori faciet. Deiectio autem medicamento quoq;
petenda est, ubi venter suppressus parum reddit,
ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolo-
res, aliaq; superioris partis mala increpant. Quid
enim inter hæc adiuuare possunt quies & ine-
dia, quæ per illam maxime eveniunt? Qui eij-
cere volet, primum cibus, vinisq; utetur his, quæ
hoc præstant. Dehinc si parum illa proficiant,
gatio- aloën sumat. Sed Purgationes quoq; ut interdum
necessariæ sunt, sic ubi frequentes sunt, pericu-
lum afferunt. Assuescit enim non ali corpus, &
ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obno-
xia maxime infirmitas sit. Calefacit autem vn-
ctio, aqua salsa, magisq; si calida est, omnia &
salsa, amara, carnosæ, si post cibum est balneum,
vinum austerrum: refrigerat in ieiunio & bal-
neum

neum & somnus, nisi nimis longus est, et omnia
 acida, aqua quàm frigidissima, oleum si aque
 misceatur. Humidum autem corpus efficit labor
 * maior, quàm ex consuetudine, frequens bal- * aliàs, n
 neum, cibus plenior, multa potio, posthac ambu- nor
 latio, & vigilia: per se quoq; ambulatio multa,
 & vehemens, & matutina exercitatio, & non
 protinus cibus adiectus, ea genera esca quæ ve-
 niunt ex locis frigidis, & pluuijs, & irriguis.
 Contrà siccatur, * modica exercitatio, fames, vñctio * aliàs,
 sine aqua, calor, sol * modicus, frigida aqua, cibus modica
 exercitationi statim subiectus, & is ipse ex sic- * aliàs,
 cis & æstuosis locis veniens. Alium astringit modici
 labor, sedile, creta figuralis corpori illita, cibus
 imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo,
 qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi
 cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit:
 post cibum quies. Contrà soluit, aucta ambula-
 tio atque esca, post motus qui post cibum est, sub-
 inde potiones cibo immixtæ. Illud quoque scire
 oportet, quòd ventrem vomitus solutum compri-
 mit, compressum soluit. Itemq; comprimit is vo-
 mitus, qui statim post cibum est: soluit is, qui
 tarde superuenit. Quod ad ætates verò pertinet,
 in ediam facillime sustinent mediæ ætates, mi-
 nus iuuenes, minime pueri, & senectute conse-
 cti. Quo minus fert facile quisq; eo sæpius debet
 cibum assumere, maximeq; eo eget, qui increscit.
 Calida lauatio, & pueris & senibus apta est.
 Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri

etati quæ inflationes mouent. Iuuenum minus,
quæ assumant, & quomodo curentur, interest.
Quibus iuuenibus fluxit aluus, plerunq; in sene-
ctute cōtrahitur: quibus in adolescētia fuit astri-
cta, sepe in senectute soluitur. Melior est autem
in iuene fusior, in sene astrictior. Tempus quoq;
anni considerare oportet. Hyeme plus esse conue-
nit: minus, sed meracius bibere: multo pane uti,
carne potius elixa, modicè oleribus: semel die ci-
bum capere, nisi si nimis venter astrictus est. Si
prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, &
ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo
tempore anni calidis omnibus potius vtendū est,
vel calorē mouentibus. Venus tum non aequè per-
niciosa est. At vere paulum cibo demēdum, adij-
ciendumq; potioni, sed dilutius tamen bibendum
est: magis carne vtendum, magis oleribus: trans-
eundū paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tem-
pore anni tutissima est. Aestate verò & potione
& cibo corpus sæpius eget. Ideo prandere quoq;
commodum est. Eo tempore aptissima sunt &
caro, & olus, potio quàm dilutissima, vt & si-
tim tollat, nec corpus incendat, frigida lauatio,
caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Vt sæ-
pius autē cibo vtendum, sic exiguo est. Per au-
tumnū propter cæli varietatē periculum ma-
ximum est. Itaq; neq; sine veste, neq; sine calcea-
mentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigi-
dioribus: neq; sub diuo nocte dormire, aut certe
bene operiri. Cibo verò iam paulo pleniore uti
licet:

licet : minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quæ immodicè toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quàm in his noxa est. Sed his uti non sæpius, quàm alio cibo convenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neque æstate verò, neque autumnò utilis venus est. Tolerabilior tamen per autumnum : æstate verò in totum, si fieri potest, abstinendum.

De his qui aliqua parte corporis laborant,
& primum de his quibus caput infirmum est.

C A P. IIII.

Proximum est, ut de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is (si bene concoxerit) leniter perfricare id manè manibus suis debet: nunquam id (si fieri potest) veste velare, aut ad cutem tonderi: utileq; lunam vitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solisq; concursus: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere, multum ambulare: sed (si licet) sub tecto, neq; in sole. Ubique autem vitare solis ardorem, maximeq; post cibum & vinum: potius vngi quàm lauari, nunquam ad flammam vngi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi vngi, tum transire in calidarium: ubi sudabit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per

c 5 caput

Aqua frigida capiti prodest.

caput se totum perfundere : tum tepida uti, deinde frigida, diutiusq; ea caput, quam ceteras partes perfundere : deinde id aliquandiu perfricare : nouissimè detergere & ungere. Capiti nihil equè prodest, atq; aqua frigida : itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subijcere. Semper autem, etiam si sine balneo vinctus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum ceteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat, eamq; ne quid oculis, alijs'ue partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat : isq;, si ieiunio caput læditur, assumendus etiam medio die est : si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutū, leue, quam aquam magis expedit : ut cum caput grauius esse cœperit, sit quò cōfugiat : eiq; ex toto neq; vinū, neq; aqua semper vtilia sunt : medicamentū vtrunq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, utiq; post cœnā, postquam nec cogitatio quidē ei satis tuta est, maxime tamē vomitus alienus est.

De his qui lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisq; laborant. C A P. V.

NEque verò his solis, quos capitis imbecillitas torquet, vsus aquæ frigidae prodest : sed ijs etiam, quos assidue lippitudines, grauedines, destillationes, tonsillæq; malè habent. His autem

autem non caput tantum quotidie perfundendum est, sed os quoque multa frigida aqua fouendum est: præcipueq; omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi grauius cæli Austri reddiderunt. Cumq; omnibus inutilis sit, post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tñ his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueuerunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiã grauedines, destillationesq; possunt, si quàm minime eñ (qui his opportunus est) aërem vel loca, aquasq; mutet, si caput in se protegit, ne incendatur, ne'ue subitum ex repentino nubilo frigus id moueat, si post coctionem ieiunus caput radit, si post cibum neque legit, neq; scribit.

Ad solutam aluum remedia. C A P. VI.

Quem verò frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusq; superiores partes exercere, dum ieiunus est ambulare, vitare solis nimium ardorẽ, continua balnea, vngi citra sudorem, non uti cibis varijs, minimeq; iurulentis, aut leguminibus, oleribus'ue his, quæ celeriter descendunt, omnia denique fugere quæ tarde concoquuntur. Venatio, duriq; pisces, et ex domesticis animalibus assa caro maximè iuant. Nunquam vinum salsum bibere expedit, Plin. lib. 14. cap. 8. ne tenue quidem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neq; id ipsum peruetus. Si mulso uti volet, Tenue, Dulce, id ex decocto melle faciendũ est. Si frigida potiones ventrem eius non turbant, his utendum potissimum Plinius.

tiſſimum eſt. Si quid offenſæ in cœna ſenſit, vo-
mere debet, idq; poſtero quoq; die facere, tertio
modici ponderis panẽ ex vino eſſe, adiecta vna
vel olea, vel ex defruto, ſimilibusq; alijs, dein-
de ad conſuetudinem redire. Semper autem poſt
cibum conquieſcere, ac neq; intendere animum,
neq; ambulatione, quamvis leui, dimoueri.

Remedia ad coli dolorem. C A P. VII.

ET ſi laxius inteſtinũ dolere cõſueuit (quod
nũcop nominant) cum id nihil niſi genus
inflationis ſit, id agendum eſt, vt concoquat ali-
quis, vt lectione, & alijs generibus exerceatur:
vtatur balneo calido, cibus quoq; & potionibus
calidis: deniq; omnimodo frigus euitet, item dul-
cia omnia, leguminaq; , & quicquid inflare
conſueuit.

Quæ agenda ſint ſtomacho laborantibus.

C A P. VIII.

SI quis verò ſtomacho laborat, legere clarè
debet: poſt lectionẽ ambulare: tum pila, vel
armis, alio'ue quo genere, quo ſuperior pars mo-
uetur, exerceri: non aquam, ſed vinum calidum
bibere ieiuus: tum cibum bis die aſſumere, ſic ta-
men vt facile concoquat: vti vino tenui, & au-
ſtero, & poſt cibum frigidis potionibus potius.
Stomachũ autem infirmum indicant, pallor, ma-
cies, præcordiorum dolor, nauſea, & nolentium
vomitus, in ieiuo dolor capitis. Quæ in quo non
ſunt, iſ firmi ſtomachi eſt. Neq; credendum utiq;
noſtris eſt, qui cùm in aduerſa valetudine vi-
num

num aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrociniū in accusationem, non merentis stomachi habent. At qui tardè concoquunt, & quorum ideo præcordia inflātur, qui'ue propter ardorem aliquem noctu sitire consueuerunt, antè quàm conquiescant, duos, tres'ue cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam aduersus tardam concoctionem clarè legere, deinde ambulare, tum vel vngi, vel lauari assiduè, vinum frigidum bibere, & post cibum magnam portionem, sed (vt suprà dixi) per siphonem, deinde omnes potiones aqua frigida intercludere. Cui verò cibus acescit, is ante eum bibere aquam egellidam debet, & vomere. At is cui ex hoc frequens deiectio incidit, quoties aluus ei constiterit, frigida portione potissimum vtatur.

Quid obseruandum sit dolore neruorum laborantibus.

CAP. IX.

SI cui verò dolere nerui solent (quod in podagra, chiragra'ue esse consuevit) huic quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, obijciendumq; labori & frigori, nisi cum dolor increuit. Sub dio quies optima est. Venus semper inimica est. Cōcoctio (sicut in omnib. corporis affectibus) necessaria est. Cruditas enim id maxime lædit, & quoties offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit. Vt concoctio autem omnibus vitijs occurrit, sic rursus alijs frigus, alijs calor. Quæ sequi quisq; pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, vulneri,

vulneri, præcordijs, intestinis, vesicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvæ, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores, tremoresq; nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis, erectiorq; mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cauetur. Aqua verò frigida infusa, præterquam capiti, etiam stomacho prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine vlceribus. Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adiuvat omnia quæ frigus infestat. Item lippientes si nec dolor, nec lacrymæ sunt. Nervos quoque qui contrahuntur, præcipueq; ea vlcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit, urinam mouet. Si nimius est, corpus effæminat, nervos emollit, stomachum soluit. Minime verò aut frigus, aut calor tuta sunt, ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolores, aliq; vitia: frigida aqua strumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

Observatio in pestilentia.

C A P. X.

Est etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia vtatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, nauigare. Vbi id non licet, gestari, ambulare sub diuo, ante æstum leniter, eodemq; modo vngi, & vt supra cōprehensum est, vitare
fatig

fatigationem, crudelitatem, frigus, calorem, libidinem, multoq; magis se continere, si qua grauitas in corpore est: tum neq; mane surgendum, neq; pedibus nudis ambulandum est, minimeq; post cibum, aut balneum, neq; ieiuno, neq; cœnato vomendum est. Neque mouenda alius, atque etiam si per se mota est, comprimenda est. Abstinentum potius, si plenius corpus est. Itemq; vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique si cibus quoque antecessit, qui tamen semel die tunc commodius assumitur: in super etiã modicus, ne crudelitatem moueat. Alternis diebus inuicem modò aqua, modò vinum bibendum est. Quibus seruatis, ex reliqua victus consuetudine, quàm minimũ mutari debet. Cum verò hæc in omni pestilentiã facienda sint, tum in ea maxime, quàm austri excitarint. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, vbi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel vbi in graues regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit, utiq; abstinere debet. Atq; ita ab vino ad aquam, ab hac ad vinum eo, qui suprapositus est, modo transitus ei esse.

LIBER II.

INSTANTIS autẽ aduersæ valetudinis signa complura sunt. In quibus explicãdis nõ dubitabo auctoritate antiquorum virorum vti, maximeq; Hippocratis: cum recentiores quoque Medici

Medici, quāvis quaedam in curationibus mutarint, tamen haec illum optimè praesagisse fateantur. Sed antequā dico, quibus praecedētibz morborum timor subsit, non alienū videtur exponere, quae tempora anni, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora maximè tuta, vel periculis opportuna sint, quod genus aduersae valetudinis in quoq; timeri maximè possit. Non quò non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis aetatis, omnis habitus hominū per omnia genera morborum & egrotent, & moriantur: sed quòd frequentius tamen quaedam eueniant. Ideoq; vtile est scire vnumquemque, quid, & quando maxime caueat.

Quae anni tempora, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora vel tuta, vel morbis opportuna sint: & quod valetudinis genus in quoque timeri possit. CAP. I.

Igitur saluberrimum ver est, proxima deinde ab hoc hyems, periculosior aestas, autumnus longe periculosissimus. Ex tempestatibus verò optima aequales sunt, siue frigidae, siue calidae: pessima, quae variant maxime. Quò fit, vt Autumnus plurimos opprimat. Nam fere meridianis temporibus calor, nocturnis atq; matutinis simulq; etiam vespertinis frigus est. Corpus ergo & aestate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed vt eo tempore id maximè fit, sic quādocunq; euenit, noxiū est. Vbi aequalitas autem est, tamen saluberrimi sunt

sunt sereni dies, meliores pluuij, quàm tantum Pluuij,
 nebulosi, aut nubili, optimiq; hyeme qui omni Nebulosi,
 vento vacant: æstate quibus Fauonij perflant. Nubili.
 Si genus aliud ventorū est, salubriores Septen-
 trionales, quàm Subsolani, vel Austrī sunt. Sic
 tamen, vt hæc interdum regionum sorte muten-
 tentur. Nam ferè ventus vbiq; à mediterraneis
 regionibus veniens salubris, à mari grauis est.
 Neq; solum in bono tempestatum habitu certior
 valetudo est, sed priores morbi quoq; (si qui inci-
 derunt) leuiores sunt, & promptius finiuntur.
 Pessimū ergo cælum est, quod ægrum fecit, adeo
 vt in id quoq; genus, quod natura peius est in
 hoc statu, salubris mutatio sit. Aetas media tu-
 tißima est, quæ neq; iuuentæ calore, neq; senectū-
 tis frigore infestatur. Longis morbis senectus,
 acutis adolescentia magis patet. Corpus autē ha-
 bilißimum quadratum est, neq; gracile, neq; ob-
 esum. Nam longa statura, vt in iuuenta decora
 est, sic matura senectute conficitur. Gracile cor-
 pus, infirmū: obesum, hebes est. Vere tamē maxi-
 mē quæcunq; humoris motu nouantur, in metu
 esse consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustule,
 profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀπο-
 σμήναι Græci nomināt, bilis atra, quā μελαγ-
 χολία appellāt, insania, morbus comitialis, an-
 gina, grauedines, destillationes oriri solent. Hi
 quoq; morbi qui in articulis, neruisq; modo vr-
 gent, modo quiescunt, tum maximē & inchoan-
 tur & repetunt. At æstas non quidē vacat ple-
 risq;

Corp^o qu
 dratum.

risq; ab his morbis, sed adiicit febres, vel conti-
nuas, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alius
deiectiones, auricularū dolores, vlcera oris, can-
cros, & in ceteris quidē partibus, sed maxime
obscænis, & quicquid sudore hominem resoluit.
Vix quicquā ex his in autumnum non incidit:
febres in- sed oriuntur eo quoq; tēpore febres incertæ, lienis
certæ. dolor, aqua inter cutem, tabes, quā Græci φθίσιν
nominant: vrine difficultas, quam εἰς γαστήρα
appellant: tenuioris intestini morbus, quē εἰς λεπ-
nominant. Fit item lenitas intestinorum, quæ
λενέτης vocatur, coxæ dolores, morbi comi-
tiales. Idemq; tempus & diutinis malis fatiga-
tos, & ab æstate tantum proxima oppressos in-
terimit, & alijs nouis morbis conficit, & quos-
dam longissimis implicat, maximeq; quartanis,
quæ per hyemem quoque exerceant. Neq; aliud
magis tēpus pestilentie patet, cuiuscunq; ea gene-
ris est, quāuis varijs rationibus nocet. Hyems au-
tem capitis dolores, tussim, & quicquid in fau-
cibus, in lateribus, in visceribus mali contrahi-
tur, irritat. Ex tēpestatibus Aquilo tussim mo-
uet, fauces exasperat, ventrē astringit, vrinam
supprimit, horrores excitat, item dolores lateris
& pectoris. Sanū tamen corpus spissat, & mobi-
lius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebe-
tat, sensus tardat, capitis dolores mouet, aluum
soluit, totū corpus efficit hebes, humidū, langui-
dum. Ceteri venti quod vel huic vel illi propiores
sunt, eo magis vicinos his illis'ne affectus faciunt.
Deniq;

Deniq; omnis calor & iecur, & lienem inflam-
mat: mentem hebetat: vt anima deficiat, vt san-
guis prorumpat, efficit. Frigus modo neruorum
distentionē, modo rigorem infert, illud σπασμὸς,
hoc τέτανος Græcè nominatur: nigriciem in
vulceribus, horrorē in febribus excitat. In sicca-
tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, vrine
difficultas, articulorū dolores oriūtur. Per hym-
bres longæ febres, alui deiectiones, angina, can-
cri, morbi comitiales, resolutio neruorum, quam
παράλυσις Græci nominant. Neq; solum inter-
est, quales dies sint, sed etiam quales antè præ-
cesserint. Si hyems sicca Septentrionales ventos
habuit, ver autem Austros & pluuias exhibet,
ferè subeunt lippitudines, tormina, febres, maxi-
mèq; in mollioribus corporibus, ideoq; præcipuè
in mulieribus. Si verò Austrum, pluuiæq; hyemē
occuparunt, ver autē frigidum et siccum est, gra-
uidæ quidem fœminæ, quibus dum adest partus,
abortu periclitantur. Hæ verò quæ gignunt, imbe-
cillosq; , vixq; vitales edunt. Ceteros lippitudo
arida, & si seniores sunt, grauedines, atq; destil-
lationes malè habet. At si à prima hyeme Au-
stri ad vltimū ver continuarunt, laterū dolores,
& insania febricitantiū, quæ φρενίτις apellant,
quàm celerrime rapiunt. Vbi primò calor à pri-
mo vere orsus, æstatē quoq; similē exhibet, ne-
cesse est multū sudorē in febribus subsequi. At si
sicca estas Aquilones habuit, autūno verò hym-
bres, Austrūq; sunt, tota hyeme quæ proxima
d 2 est

est tussis, de stillatio, raucitas, in quibusdā etiam
tabes, oriuntur. Sin autem autumnus quoque, æquē
ficcus, iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus
quidē mollioribus corporibus, inter quæ mulie-
bria esse proposui, secunda valetudo contingit.
Durioribus verò instare possunt & arida lip-
pitudines, et febres partim acuta, partim longa,
& hi morbi, qui ex atra bile nascuntur. Quod
ad ætates verò pertinet, pueri, proximūq; huius, ve-
re optime valēt, & æstate prima tutissimi sunt:
Senes æstate, & autumnī primā parte: iuvenes
hyeme, quique inter iuventutem senectutemque sunt.
Inimicior senibus hyems, æstas adolescentibus
est. Tum si qua imbecillitas oritur, proximū est,
ut infantes, tenerosque adhuc pueros serpentia
ulcera oris (quæ ἄφθας Græci nominant) vomit-
us, nocturnæ vigilæ, aurium humor, circa umbi-
licum inflammationes exerceant. Propriè etiā den-
tientium gingivarum exulcerationes, distentiones
nervorum, febriculae interdum, alui deiectiones,
maxillæ, & maximeque caninis dentibus orientibus ma-
le habent. Quæ pericula plenissimi cuiusque sunt,
& cui maxime venter adstrictus est. At ubi
ætas paulum processit, glandulae, & vertebrarum
quæ in spina sunt, aliquæ inclinationes: strumæ,
verrucarum quædam genera dolentia (ἀνγοχόσ-
σους Græci appellant) & plura alia tubercu-
la oriuntur. Incipiente verò iam pube, ex iisdem
multæ & longæ febres, sanguinis ex naribus
cursus. Maximeque omnis pueritia primum circa
quadrag

quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infan-tem inciderunt, ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in sœmina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabiq; maxime obiecta est, fereq; iuvenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum & pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quedam etiam velut ora venarum (αἱμορροΐδας Græci appellant) profusio. In senectute spiritus & urinae difficultas, grauedo articulorum, & renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus (καχεξία Græci appellant) nocturnæ vigiliæ, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueq; soluta aluus, & quæ sequuntur hanc tormina, vel leuitas intestinorum, ceteraq; fusi ventris mala. Præter hæc graciles, tabes, deiectiones, destillationes. Item viscerum & laterum dolores fatigant. Obesi plerunq; acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoq; sæpe moriuntur. Quod in corpore tenuiore vix euenit.

De*signis aduersæ valetudinis futuræ.

*not.

C A P. II.

ANte aduersam autem valetudinem (vt supra dixi) quedam notæ oriuntur, quarum omnium cōmune est, aliter se corpus habere, atq;

d 3

consue

consuevit, neq; in peius tantū, sed etiam in me-
lius. Ergo si plenior aliquis, et speciosior, & co-
loratior factus est, suspecta habere bona sua de-
bet. Quæ quia neq; in eodem habitu subsistere,
neq; ultra progredi possunt, ferè retro, quasi rui-
na quadam, reuoluuntur. Peius tamen signum
est, ubi aliquis contra consuetudinem emacruit,
& colorem decorēq; amisit, quoniam in his quæ
superant, est quod morbus demat: in his quæ de-
sunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter
hæc protinus timeri debet, si grauiora membra
sunt, si crebra vlcera oriuntur, si corpus supra
cōsuetudinem incaluit, si grauior somnus pressit,
si tumultuosa somnia fuerunt, si sæpius expergi-
scitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur,
si corpus dormientis circa partes aliquas
contra consuetudinem insudat, maximeq; circa
pectus, aut ceruices, aut crura, vel genua, vel co-
xas. Item si marcet animus, si loqui & moueri
piget, si corpus torpet, si dolor præcordiorum est,
alias, aut totius pectoris, * aut, qui in plurimis euenit,
i plu- capitis: si salinæ plenum est os, si oculi cum dolo-
ris ve- re vertuntur, si tempora aspera sunt, si membra
capitis inhorrescunt, si spiritus grauior est, si circa fron-
tem intentæ venæ mouentur, si sequentes osci-
tationes, si genua quasi fatigata sunt, totum ve
corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura,
nunquam nō aliqua, febrem antecedunt. In pri-
mis tamen illud considerandum est, nunquid sæ-
pius horum aliquid eueniat, ac ideo neque cor-
poris

poris vlla difficultas subsequatur. Sunt enim quaedam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum praesagiri potest. Facile itaq; securus est in his aliquis, quae saepe sine periculo euasit. Ille sollicitari debet, cui haec noua sunt, aut qui ista nunquam sine custodia sui tuta habuit.

Quae bona in aegrotantibus signa sint.

C A P. III.

Vbi verò febris aliquem occupat, scire licet non periclitari, si in latus aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi visum est, cubat, cruribus paulum reductis: qui ferè sani quoq; iacentis habitus est: si facile conuertitur, si noctu dormit, si interdiu vigilat, si ex facili spirat, si non confluetatur, si circa umbilicum & pubem cutis plana est: si praecordia eius sine vlllo sensu doloris aequaliter mollia in vtraque parte sunt: quod si paulò tumidiora sunt, sed tamè digitis cedunt, & non dolent, haec valetudo, ut spatium aliquod habeat, sic tuta erit. Corpus quoque quod aequaliter molle & calidum est, quodq; aequaliter totum insudat, & cuius febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iam ad sanitatē venit corpus. Sternutamentum etiam inter bona indicia est: et cupiditas cibi, vel à primo seruata, vel etiam post fastidium orta. Neq; terrere debet ea febris, quae eodè die finita est: ac ne ea quidem, quae quamuis longiore tempore euasit, tamen ante alteram accessionem ex toto quieuit,
d 4 sic ut

sic vt corpus integrum quod εἰλησῶνς Græci
vocant, fieret. Si quis aut̃ incidit vomitus, mix-
tus esse ex bile & pituita debet, & in vrina
subsiderere album, leue, æquale, sic vt etiam si quæ
quasi nubecula innatarint, in imum deferantur.
At vëter ei qui à periculo tutus est, reddit mo-
dò mollia, figurata eodem ferè tempore, quo se-
cunda valetudine: assuevit modò cōuenientia his
quæ assumuntur. Peior cita aluus est. Sed ne hæc
quidem terrere protinus debet, si matutinis tem-
poribus coacta magis est, aut si procedente tem-
pore paulatim contrahitur, et ruffa est, neq; sæ-
ditate odoris similem aluum sani hominis exce-
dit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi
descendisse, nihil nocet. Si inflammatio in supe-
rioribus partibus dolorem tumoremq; fecit, bo-
num signum est. Sonus ventris inde ad inferio-
res partes euolutus, magisq; etiam si sine diffi-
cultate cum stercore excessit.

Mala signa ægrotantium. CAP. IIII.

Contra grauis morbi periculum est, vbi su-
pinus æger iacet, porrectis manibus &
cruribus, vbi residere vult, in ipso acuti morbi
impetu, præcipueq; pulmonibus laborantibus.
Vbi nocturna vigilia premitur, etiam si interdum
somnus accedit. Ex quo tamen peior est, qui in-
ter quartam horam & noctem, quàm qui ma-
tutino tempore ad quartam. Pessimum tamen
est, si somnus neq; noctu, neq; interdum accedit: id
enim ferè sine continuo dolore esse non potest.
Aequè

Aequè verò signū malum est, etiam somno ultra debitum vrgeri, peiusq; quo magis se sopor interdiu, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est, vehementer & crebro spirare, à sexto die cœpisse inhorrescere, pus expuere, vix excreare, dolorem habere continuum, difficulter ferre morbum, iactare brachia & crura, sine voluntate lacrymare, habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, cutem circa umbilicum & pubem macram, præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta: magisq; si hæc dextra parte, quàm sinistra sunt: periculosissimum tamen est, si venæ quoq; ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter emacrescere, caput, & pedes, manusq; calidas habere, ventre & lateribus frigentibus, aut frigidas extremas partes acuto morbo vrgente, aut post sudorem inhorrescere, aut post vomitum singultum esse, vel rubere oculos, aut post cupiditatem cibi, post'ue longas febres hunc fastidire, aut multum sudare, maximeq; frigido sudore: aut habere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non finiant, & eas febres quæ quotidie tempore eodem reuertantur, quæ'ue semper pares accessiones habeant, neq; tertio quoq; die leuentur, quæ'ue cōtinuent, *vel per accessiones increcant, per dis- *cessiones tantum molliantur, nec vnquam integrum corpus dimittant. Pessimum est, si ne leuatur quidem febris, sed aequè concitata conti-

d s nuat.

nuat. Periculosum est etiā post arquatum mor-
bum febrē oriri, utiq; si prae cordia dextra parte
dura manserunt, ac dolentibus his leua. Nulla
acuta febris leuiter terrere eos debet: neq; unquā
in acuta febre, ut à somno, non est terribilis ner-
uorum distentio. Timere etiam ex somno, mali
morbi est. Itemq; in prima febre protinus men-
tem esse turbatam, membrum' ve aliquod esse re-
solutum. Ex quo casu quāuis vita redditur, ta-
men id ferē membrū debilitatur. Vomitus etiam
periculosus est syncera pituita, vel bilis, peiorq;
Vrina. si viridis, aut niger est. At mala vrina est, in
qua subsidunt subrubra, aut liuida: deterior, in
qua quasi fila quaedam tenuia, atq; alba: pessima
ex his, si tanquam ex fursuribus factas nube-
culas repraesentat: diluta quoq; atq; alba vitiosa
est, sed in phreneticis maxime. Alius autē mala
est ex toto suppressa. Periculosa etiā quae inter
febres fluens, conquiescere hominem in cubili
non patitur: utiq; si quod descendit est perliqui-
dum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans.
Præter hæc periculum ostendit id quod excerni-
tur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idēq;
subpallidum, vel si est aut liuidum, aut biliosum,
aut cruentum, aut peioris odoris, quā ex con-
suetudine. Malum est etiam, quod post longas
febres syncerum est.

De signis longæ valetudinis. CAP. V.

Post hæc indicia, notū est longum morbum
feri. Sic enim necesse est, nisi occidit. Neq;
vlla

ulla alia spes in malis magnis est, quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturq; in id tempus, quod curationi locum praestet. Protinus tamen signa quaedam sunt, ex quibus colligere possumus morbum, & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non acutus circa caput tantum, et cervices oritur: aut ubi febre non quiescente corpus insudat: aut ubi corpus modò frigidum, modò calidum est, & color alius ex alio fit: aut ubi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non pervenit: aut ubi eger pro spatio parum emacrescit. Item si urina modò liquida & pura est, modò habet quaedam subsidencia, si levia, atq; alba, rubra' ve sunt, quae in ea subsident, aut si quasdam quasi maculas representat, aut si bullulas excitat.

Urina.

De indicijs mortis.

CAP. VI.

Sed inter hac quidē proposito metu spes tamen superest. Ad ultima verò iam ventum esse testantur, nares acutae, collapsa tempora, oculi concavi, frigidae languidaeq; aures, & imis partibus lemiter versa, cutis circa frontem dura et intenta, color aut niger, aut per pallidus, multoq; magis si ita haec sunt, ut neq; vigilia praecesserit, neq; ventris resolutio, neq; inedia. Ex quibus causis interdum haec species oritur, sed vno die finitur. Itaq; diutius durans mortis index est. Si verò in morbo vetere iam triduo talis est, in propinquo mors est: magisq; si praeter haec

Habes
his indicia
Hippocratem
ipsum
in primo
Prognostico,
ubi
haec au-
desump-
tione
ut aliarum
in primo
secundo
bro.

haec

hæc oculi quoq; lumē refugiunt, & illacrymant,
quæq; in ijs alba esse debent, rubescunt, atq; in
hisdem venula pallent, pituitaq; in ijs innatans
nouissimè angulis inhaerescit, alterq; ex his mi-
nor est, hiq; aut vehementer subsederunt, aut fa-
cti tumidiores sunt: perq; somnum palpebra non
committuntur, sed inter has ex albo oculorum
aliquid apparet: neq; id fluens alius expressit:
eademq; palpebrae pallent, & idem pallor labra
& nares decolorat. Eademq; labra & nares
oculiq; & palpebrae & supercilia, aliqua' ve
ex his peruertuntur, isq; propter imbecillitatem
iam non audit, aut non videt: eadem mors de-
nuntiatur, vbi ager supinus cubat, eiq; genua
contracta sunt. Vbi deorsum ad pedes subinde
delabitur. Vbi brachia & crura nudat, & in-
æquabiliter dispergit, neq; his calor subest. Vbi
hiat, vbi assidue dormit: vbi is qui mentis suæ
non est, neq; id facere sanus solet, dentibus stri-
det. Vbi vlcus quod aut antè, aut in ipso mor-
bo natum est, aridum, & aut pallidum, aut li-
nidum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt,
ungues, digitiq; pallidi, frigidus spiritus, aut si
manibus quis in febre & acuto morbo vel in-
saniam, pulmonis' ve dolore, vel capitis, in veste
floccos legit, fimbrias' ve diducit, vel in adiun-
cto pariete, si qua minuta eminent, carpit. Do-
lores etiam circa coxas & inferiores partes or-
ti, si ad viscera transierunt, subitoq; desierunt,
mortem subesse testantur, magisq; si alia quoq;
signa

signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui sine* vllotremore febricitans, subito strangulatur, * alij, tu-
aut deuorare saluam suam non potest. Cui' ve in more. alij,
eodem febris corporisq; habitu ceruix conuerti- timore
tur, sic vt deuorare æquè nihil possit. Aut. cui si-
mul & continua febris, & vltima corporis in-
firmitas est: aut cui febre non quiescente, exte-
rior pars friget, interior sic calet, vt etiam sitim
faciat: aut qui febre æquè non quiescente simul
& delirio, et spirandi difficultate vexatur: aut
qui epoto veratro exceptus distentione neruo-
rum est: aut qui ebrius obmutuit. Is enim febre,
adiecta neruorum distentione consumitur, nisi
aut febris* accessit, aut eo tempore, quo ebrietas * abscessu
solui debet, loqui cœpit. Mulier quoq; gravida,
acuto morbo facillè consumitur. & is cui somnus
dolorem auget, & cui protinus in recenti mor-
bo bilis atra vel infra, vel supra se ostēdit, cui' ve
alterutrum modo se prompsit, cū iam longo mor-
bo corpus eius esset extenuatum & affectum.
sputum etiam biliosum & purulentum, siue se-
paratim ista, siue mixta proueniunt, interitus
periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem
tale esse cœpit, proximum est, vt is circa quar-
tumdecimum diem decedat, nisi alia signa me-
liora, peiora' ve accesserint: quæ quo leuiora,
grauiora' ve subsecuta sunt, eò vel seriores mor-
tem, vel maturiorem denuntiant. Sudor quoq;
frigidus in acuta febre pestiferus est, atq; in o-
mni morbo vomitus, qui varius, & multorum
colorum

* In magna cruditate, subaudiendū est morbi. Sic in Prognosis Hippocra. lib. 2. Vrina quoad ruffa tenuisq; apparuerit, crudum morbum significat.

colorum est, præcipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoq; in febre vomuisse, pestiferum est. Vrina verò rubra, & tenuis* in magna cruditate esse consuevit, & sæpe antequam spatium mature scat, hominem rapit. Itaq; si talis diutius permanet, periculum mortis ostendit. Pestifera tamē est, præcipueq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atq; in viris quidem & mulieribus talis deterrima est. In pueris verò quæ tenuis & diluta est. Aluus quoq; varia pestifera est, quæ strigmentū, sanguinem, bilem viridem, aliquid modò diuersis temporibus, modò simul, & in mistura quadam, discreta tamen representat. Sed hæc quidem potest paulo diutius trahere. In præcipiti verò iam esse denunciat quæ liquida, eademq; vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utiq; si magna fœditas odoris accessit. Illud interrogari me posse ab aliquo scio: Si certa future mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti à medicis conualescant, quosdamq; fama prodiderit in ipsis funeribus renixisse? quinetiā vir iure magni nominis Democritus, ne finitæ quidem vitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa future mortis essent. Aduersus quos ne illud quidem dicam, quòd in vicino sæpe quedam notæ posite, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt. quod Asclepiades funeri obuius intellexit, eum viuere, qui efferebatur, ne protinus crimen artis esset, si quod professoris

fessoris sit. Illa tamē moderatius subiiciam: Con-
iecturalem artem esse medicinam, rationemq; Medicina
coniectura talem esse, vt cum sepius aliquando certitudo
responderit, interdum tamen fallat nos. Si quid
itaq; vix in millesimo corpore aliquando deci-
pit, id notam non habet, cum per innumerabiles
homines respondeat. Idq; non in his tantum, quæ
pestifera sunt, dico: sed in his quoq; quæ saluta-
ria. Siquidem etiam spes interdum frustratur,
et moritur aliquis, de quo medicus securus pri-
mò fuit. Quæq; medendi causa reperta sunt, non-
nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq; id
euitare humana imbecillitas in tanta varietate
corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides,
quæ multo sepius, perq; multo plures ægros pro-
dest. Neq; tamē ignorare oportet, in acutis mor-
bis fallaces magis notas esse, et salutis et mortis.

De notis, quas aliquis in singulis morborum
generibus habere possit. CAP. VII.

SEd cum proposuerim signa quæ in omni ad-
uersa valetudine communia esse consueve-
runt, ea quoq; transibo, vt quas aliquis in singu-
lis morborum generibus habere possit notas,
indicem. Quedam autem sunt, quæ ante febres,
quedam quæ inter eas, quid aut intus sit, aut
venturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput
graue est, aut ex somno oculi caligant, aut fre-
quentia sternutamenta sunt, circa caput aliquis
pituitæ ipetus timeri potest. Si sanguis aut calor
abundat,

abundat, proximum est, ut aliqua parte proflu-
uium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacre-
scit, ne in malum habitum corpus eius recidat,
metus est. Si prae cordia dolent, aut inflammatio
gravis est, aut non toto die concocta fertur uri-
na, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu
color sine morbo regio malus est, hi vel capitis
doloribus conflantur, vel terram edunt. Qui
diu habent faciem pallidam, & tumidam, aut
capite, aut visceribus, aut aluo laborant. Si in
continua febre puero venter nihil reddit, muta-
turq; ei color, nec somnus accedit, ploratq; is as-
sidue, metuenda neruorum distentio est. Frequens
autem destillatio in corpore tenui longoq; tabem
timendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non
descendit aluus, docet aut subitam deiectionem,
aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, longae
deiectiones sunt. Vbi dolor in imo ventre & in
coxis est, aqua inter cutem instat. Sed hoc morbi
genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum pe-
riculum est his, quibus voluntas desidendi est,
venter nihil reddit, nisi & aegre & durum, tu-
mor in pedibus est, idemq; modo dextra, modo
sinistra parte ventris inuicem oritur atq; finitur:
sed à iocinere id malū proficisci videtur. Eiusdē
morbi nota est, vbi circa umbilicum intestina
torquentur (σπασμός Graci nominant) coxaeq; do-
lores manent, eaq; neq; tempore, neq; remedijs
soluuntur. Dolor autem articularū, prout in pe-
dibus, manibus'ue, aut alia qualibet parte sic
est,

est, ut eo loco nervi contrahantur, aut si id membrum ex levi causa fatigatum aequè frigido calidoq; offenditur, $\pi\omicron\delta\lambda\acute{\alpha}\gamma\gamma\alpha\upsilon\ \chi\epsilon\iota\rho\acute{\alpha}\gamma\gamma\alpha\upsilon$ ve, vel eius articuli in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desijt, hi vel capitis doloribus confligentur necesse est, vel in articulis aliquis exulcerationes graues habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus fœminis mēstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel qualibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his pericula sunt, quibus articularum vitia, dolores, tumoresq; sine podagra similibusq; morbis oriuntur & desinunt. Vtique si saepe tempora iisdem dolent, noctuq; corpora insudant, frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier à partu vehementes dolores habet, neque alia præterea signa mala sunt circa vigesimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicumq; etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis profusionem, si senior, per suppurationem. Febris autem quæ subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine & interdum & noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque præcordiorum, neq; tussis, neque vomitus, neque febricula præcesserit, huius aut in naribus, aut in faucibus vlcus
e reper

reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque caussa apparet, vlcus in vulua est.

Vrina. *Vrina* autem crassa, ex qua quod desidet album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem viridis aut viscerum dolorem tumoremq; cum aliquo periculo subesse, aut certè corpus integrum non esse testatur. At si sanguis aut pus in vrina est, vel vesica, vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa carunculis quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, & male olet, & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ, quæq; inter has, superq; pubem sunt, & accedunt frequentes ructus, interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigescent, vrinæ crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est aquæ simile, vel ruffum, vel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, aluus verò cum multo spiritu redditur, utiq; in renibus vitium est. Aut si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, & in eo quædam cruenta concreta sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem *Calculosi.* vesica vitium est. Calculosi verò his indicijs cognoscuntur: Difficulter vrina redditur, paulatimq; interdum etiam sine voluntate destillat. Eadem harenosa est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamq; quidam promptius reëti, quidam

quidam resupinati, maximeq; hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemq; extendendo, dolorem leuant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea cursu omniq; motu augmentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicant. Fœminæ verò oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admouerunt, ubi vesicæ cervicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Mulieri gravida sine modo fusa alius elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit. Durae mammae sanis illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super vlcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit, vel distentio nervorum vel rigor timeri potest. At si à priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia cum longo timore & vigilia est, atræ bilis morbus subest. Quibus sepe ex naribus fluit sanguis, his

aut lientumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, aut quedam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt, et os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit. Quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala vlcera, et ex his nigre cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus eius est, his mens labat. Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus vertitur. Si à coxis, et ab inferioribus partibus dolor in petus transit, neq; vllum signum malum accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. *Vrina.* Urina quoque quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat. Hæc verò cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit, atq; etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, ubi expeditior alicuius, quàm sani fuit, sermo est: subitaq; loquacitas orta est, et hæc ipsa solito audacior: aut ubi raro quis et vehementer spirat, venasq; concitatas habet, præcordijs duris et tumentibus. Oculorum quoq; frequens motus, et in capitis dolore offusæ oculis tenebræ, vel nullo dolore substante somnus ereptus, continuataq; nocte et die vigilia, vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic, ut ipsius alui dolor

lor id non coëgerit : item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor insanie signa sunt. Si quid etiam abscessit, & antequam suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua, vehementi q̄, sepe mentem turbat, & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diem moriuntur, seniores tardius : quoniam neq; æquè magnas febres experiuntur, neque æquè insaniunt, ita sustinent, dum is affectus intus versatur. Suffusæ quoque sanguine mulieris mammae, furorem venturum esse testantur. Quibus autem longæ febres sunt, his abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit, idq; sepe intra septimum diem occidit. Quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionem, tormina : Post hæc intestinorum leuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. Post lateris dolores, vitia pulmonum, post hæc, insania. Post magnos feruores corporis, nervorum rigor aut distentio. Vbi caput vulneratum est, delirium. Vbi vigilia torset, nervorum distentio. Vbi vehementer venæ supra vlcera mouentur, sanguinis profluvium erit. Suppuratio verò pluribus morbis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in ali-

quam partem id malum incumbit, in iunioribus tantum: in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante vigesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus: utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt, sed cum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem mollem habent, neq; habere intra sexaginta dies desinunt, hæretq; per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa ulcera non fluit, circa aures erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem aliàs, ferè spectet, * magis eò tendit is, qui in præcordiis, quàm is, qui infra est. Si lassitudinis etiam tendit sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis, aliquid abscedit. Interdum quoque urina tenuis & cruda, sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint, ex q; eo casu, plerumque infra transversum septum (quod διαφραγμα Græci vocant) fit abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas * interdum excitat, exci. aut circa vigesimum diem, aut circa * quadragessimum, nonnunquam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem eius partis sensit. Sed hæ vomicae modò
à pulm

à pulmone, modò à contraria parte nascuntur.
Quod suppurat ab ea parte, quam afficit, dolo-
rem, inflammationemq; concitat, ipsum calidius
est: & si in partē suam aliquis decubuit, onera-
re eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam
suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic depre-
hendi potest: Si febris non dimittit, eaq; inter-
diu leuior est, noctu increscit, multus sudor ori-
tur, cupiditas tussendi est, & penè nihil in tussi
excreatur, oculi cavi sunt, malæ rubent, venæ sub
lingua inalbescunt, in manibus sunt adunci vn-
gues, digiti, maximeq; summi^{*} pallēt, in pedibus ^{*calent}
tumores sunt, spiritus difficiliter trahitur, cibi
fastidium est, pustule toto corpore oriuntur.
Quòd si protinus initio dolor, & tussis fuit, &
spiritus difficultas, vomica vel ante, vel circa
vigessimū diem erumpet. Si serius ista cœpe-
rint, necesse est quidem increcant, sed quò mi-
nus cito affecerint, eò tardius soluentur. Solent
etiam in graui morbo pedes cum digitis vngu-
ibusq; nigrescere. Quòd si non est mors conse-
cuta, & reliquum corpus inualuit, pedes tamen
decidunt.

Quæ notæ in quoque morbi genere, vel spem,
vel pericula ostendant. CAP. VIII.

Sequitur, ut in quoq; morbi genere proprias
notas explicem, quæ vel spem, vel periculum
ostendant. Ex vesica dolente, si purulenta vrina ^{Vrina,}
processit, inq; ea leue & album subsedit, metum
detrahit. In pulmonis morbo, si sputo ipse leua-

tur dolor, quamuis id purulentum est, tamen ager
 facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non
 difficulter fert, potest ei secunda valetudo con-
 tingere. Neq; inter initia terreri conuenit, si pro-
 tinus sputum mistum est ruffo quodam & san-
 guine, dummodo statim edatur. Laterum dolores
 suppuratione facta, deinde intra quadragessimū
 diem purgata, finiuntur. Si in iocinore vomica
 est, & ex ea fertur pus purum & album, salus
 ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-
 purationibus verò, hæ tolerabiles sunt, quæ in
 exteriorem partem feruntur & acuiuntur. Et ex
 his quæ intus procedunt, hæ leuiore, quæ contra
 se cutem non afficiunt, eamq; & sine dolore esse,
 & eiusdem coloris, cuius reliquæ partes sunt,
 sinunt esse. Pus quoq; quacunq; parte erumpit, si
 est leue, album, & vnius coloris, sine vlllo metu
 est, & quo effuso, febris protinus conquieuit,
 desieruntq; urgere cibi fastidium, & potionis
 desiderium: si quando etiam suppuratio descen-
 dit in crura, sputumq; eiusdem factum pro ruffo
 purulentum est, periculi minus est. At in tabe
 eius qui saluus futurus est, sputum esse debet al-
 bum, æquale totum, eiusdemq; coloris, sine pitui-
 ta, eiq; etiam simile esse oportet si quid in nares
 à capite destillat. Longe optimum est febrem
 omnino non esse: secundum est, tantulum esse, vt
 neq; cibum impediat, neq; crebram sitim faciat.
 Alius in hac valetudine ea tuta est, quæ quoti-
 die coacta, eaq; conuenientia his, quæ assun-

tur,

puti iudi-
 atio.

tur, reddit. Corpus id, quod minimè tenue, ma-
 ximeq; lati pectoris atque setosi est, cuiusq;
 cartilago exigua, & carnosae est. Super tabem Alui iudi-
catio.
 si mulieri quoque suppressa menstrua fuerunt,
 & circa pectus atque scapulas dolor mansit,
 subitoq; sanguis erupit, leuari morbus solet. Nam
 & tussis minuitur, & sitis atque febriculae desi-
 nunt. Sed ipsædem ferè, nisi redit sanguis, vomica
 erumpit, quæ quo cruentior, eo melior est. Aqua
 autem inter cutem minime terribilis est, quæ nul-
 lo antecedente morbo cœpit, deinde quæ longo
 morbo superuenit. Vtique si firma viscera sunt,
 si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore
 corpus est, equaliterq; in extremis partibus
 macrum est, si venter mollis, si nulla tussis, nul-
 la sitis, si lingua ne per somnum quidem inare-
 scit, si cibi cupiditas est, si venter medicamen-
 tis mouetur, si per se excernit mollia, & figura-
 ta, si extenuatur, si vrina & vini mutatione,
 & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si
 corpus sine lassitudine est, & morbum facile
 sustinet. Siquidem in quo omnia hæc sunt, is ex
 toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in
 bona spe est. Articulorum verò vitia, vt poda-
 græ, chiragræq;, si iuuenes tentarunt, neque
 callum induxerunt, solui possunt, maximeq; tor-
 minibus leniuntur, & ex quocunq; modo ven-
 ter fluit. Item morbus comitialis ante puberta-
 tem ortus, non agrè finitur, & in quo ab vna
 parte corporis venientis accessionis sensus inci-
 pit,

Deiectio
sine vlla
noxa est.

pit, optimum est à manibus pedibus'ue initium fieri, deinde à lateribus, pessimum inter hæc à capite. Atque in his quoque ea maxime prosunt, quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine vlla noxa est, quæ sine febre est, si celeriter desinit, si contracto ventre nullus motus eius sentitur, si extremam aluum spiritus sequitur. Acrida tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum
adsint febris ceteræq; accessiones huius morbi absint, adeo ut etiam gravida mulier non solum reservari possit, sed etiam partum reservare. Prodestq; in hoc morbo, si iam ætate aliquis processit. Contrà intestinorum leuitas facilius à teneris ætatibus depellitur, utique si fieri vrina & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas prodest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa si sine torpore est, si leuiter friget, quamvis magnos dolores habet, tamen & facile & mature sanatur, resolutumq; membrum, si nihilominus aliter fieri sanum potest, oris resolutio etiam, aluo cita finitur. Omnisq; deiectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atræ bilis solvuntur. Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones supprimit vomitus. Mulier sanguinẽ vomens profusa

fisis menſtruis liberatur. Quæ menſtruis non
 purgatur, ſi ſanguinem ex naribus fudit, omni
 periculo vacat. Quæ locis laborat, aut difficulter
 partum edit, ſternutamento leuatur. Aëſtina
 quartana ferè brevis eſt. Cui calor & tremor eſt,
 ſaluti delirium eſt. Lienofis bono tormina ſunt.
 Deniq; ipſa febris (quod maxime mirum videri
 poteſt) ſæpe præſidio eſt. Nam & præcordio-
 rum dolores, ſi ſine inflammatione ſunt, finit,
 & in iocineris dolore ſuccurrit, & nervorum
 diſtentionem rigoremq; (ſi poſtea cæpit) ex
 toto tollit, & ex difficultate vrine morbum
 tenuioris inteſtini ortum, ſi vrinam per calorem
 mouet, leuat. At dolores capitis, quibus oculo-
 rum caligo, & rubor cum quadam frontis pru-
 rigine accedunt, ſanguinis profuſione, vel fortui-
 ta, vel etiam petita ſum mouentur. Si capitis ac
 frontis dolores ex vento, vel frigore, aut æſtu
 ſunt, grauedine & ſternutamentis finiuntur. Fe-
 brem autem ardentem (quam Græci* *ναυσόλην* *ναύσο-*
vocant) ſubitus horror exoluit. Si in febre au- *væ*
 res obtuſæ ſunt, ſi ſanguis è naribus fluxit, aut
 venter reſolutus eſt, illud malum deſinit ex to-
 to. Nihil plus aduerſus ſurditatem, quàm bilioſa
 aluus poteſt. Quibus in fiſtula vrine vt̃i minu-
 ti* abſceſſus (quos *βύματα* Græci vocant) eſſe *apices
 cæperunt, ijs vbi pus ea parte profluxit, ſanitas
 redditur. Ex quibus cum pleraq; per ſe proue-
 niant, ſcire licet inter ea quoque, quæ ars adhi-
 bet, naturam plurimum poſſe. Contra, ſi caput fe-
 bre

bre continenti dolet, neque quicquam reddit, malum atque mortiferum est: maximeq; id periculum est pueris à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit, deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit, periculosum est. Quantoq; magis mistos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterius. Et tamen nihil peius est, quàm syncerum id edi, siue ruffum est, siue cruentum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans: nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam (quod aliàs salutare habetur) sternutamentum. Periculosissimum est, si hæc secuta subita deiectio est. Ferè verò quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consueverunt. Ex iocinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt quæ intus tendunt, sic ut exteriorem quoq; cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maxima, quæq; planissima sunt. Quòd si ne rupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emissio febris quieuit, aut quavis quieverit, tamen repetit. Item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est liuidum, & pallidum, si nihil eger excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atq; ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitarunt, ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores.

res. At in tabe sputum mixtum purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit, & siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testatur. Si quis etiâ in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt, ubi urina quædam araneis similia Urina subsidentia ostendit, atq; in his odor fædus est, maximeq; ubi post hæc orta deiectio est, protinus moritur. Utique si tempus autumnus est, quo ferè, qui cetera parte anni traxerunt, resolvuntur. Item pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spuerè defuisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica, fistulaq; oriri, quæ non facile sanescunt, nisi si multa signa bonæ valetudinis subsecuta sunt. Ex reliquis verò minime facile sanantur virgines, aut hæ mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui verò sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic ut stertat, neque expergiscatur, intra septimum diem pereundum est: magis si eum alius cita non antecesserit. Si palpebræ dormientis non coeunt, si album oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo cæpit, ad sanitatem raro perducitur, utique si contraria his quæ supra posita sunt subsequuntur, æquè in ea quoque tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit, & aqua medium corpus implevit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde
rursus

rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt,
quàm qui suprà comprehensi sunt, si attendun-
tur, sed ferè fiducia secundæ valetudinis oppri-
muntur. Illud iure aliquis mirabitur, quomodo
quædam simul & affligant nostrà corpora, &
parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cu-
tem quem impleuit, siue in magno abscessu mul-
tum puris coijt, simul id omne effudisse æquè
mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere
factus exanguis est. Articuli verò qui sic do-
lent, vt super eos ex callo quædam tubercula,
innata sint, nunquam liberantur: quæq; eorum
vitia vel in senectute cœperunt, vel in senectu-
tem ab adolescentia peruenerunt, vt aliquan-
do leniri possunt, sic nunquam ex toto finiun-
tur. Morbus quoq; comitialis post annum quin-
tum & vigesimum ortus ægrè curatur: mul-
toq; ægrius is, qui post quadragesimum annum
cœpit: adeo vt in ea etate aliquid in natura
spei, vix quicquam in medicina sit. In eodem
mobo si simul totum corpus afficitur, neque antè
in partibus aliquis venientis mali sensus est,
sed homo ex improviso concidit, cuiuscunque
is ætatis est, vix sanescit. Si verò aut mens læ-
sa est, aut neruorum facta resolutio, medicinæ
locus non est. Deiectionibus quoque si febris
accescit, si inflammatio iocinoris, aut præcordio-
rum, aut ventris, si immodica sitis, si longius tem-
pus, si alius varia, si cum dolore est, etiam mor-
tis periculum subest, maximeq; si inter hac tor-
mina

mina vetera esse ceperunt. Isq; morbus maxime pueros absumit vsque ad annum decimum. Cetera etates facilius sustinent. Mulier quoque grauida eiusmodi casu rapi potest, atque etiam si ipsa conualuit, partum tamen perdit. Quinetiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt, aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra aluus profluxit, aut intestinorum leuitas. Periculosior est, si frequens deiectio est. Si venter omnibus horis & cum somno, & sine hoc profluit. Si similiter noctu & interdiu. Si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum, & prater id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis vrget, si post potionem vrina non redditur, quod euenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit, si os exulceratur, si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur, si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus, si & cibi cupiditas non est. Inter quae cum euidentis mors sit, multo euidentior est, si iam longum quoque id vitium est, maximeq; si etiam in corpore senili est: si verò in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato durum fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde inuersa sunt, vel in aquam inter cutem, vel in intestionorum leuitatem, vix vlla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris, nisi

nisi resolutus est, inter septimum diem occidit. Multum ex partu, si cum febre, vehementibus etiam & assiduus capitis doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in ceruices ac scapulas transit, rursusque in caput reuertitur, aut à capite ad ceruices scapulasque peruenit, perniciosus est, nisi vomitam aliquam excitauit, sic ut pus extussiretur, aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit, aut nisi in capite multa prurigo, toto uel corpore pustule ortæ sunt. Aequè magnum malum est, ubi torpor atque prurigo peruagantur, modò per totum caput, modò in parte, aut sensu alicuius ibi quasi frigoris est, eaque ad summam quoque linguam perueniunt. Et cum in iisdem abscessibus auxilium sit, eò difficilior sanitas est, quò minus saepe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ verò doloribus si vehemens torpor est, frigescitque crus & coxa, aliusque nisi coacta non reddit, idque quod excernitur mucosum est, iamque ætas eius hominis quadragesimum annum excessit, is morbus erit longissimus, minimeque annuus, neque finiri poterit, nisi aut vere, aut autumno. Difficilis aequè curatio est, in eadē ætate, ubi humerorum dolor, vel ad manus peruenit, vel ad scapulas tendit, torporemque & dolorem creat, neque bilis vomitu leuatur. Quacunque verò parte corp

corporis membrum aliquod resolutum est, si neque mouetur, & emacrescit, in pristinum habitum non reuertitur, eoq; minus, quo vetustius id vitium est, & quo magis in corpore senili est. Omniq; resolutioni neruorum ad medicinam non idonea tempora sunt, hyems, & autumnus: aliquid sperari potest vere & æstate. Isq; morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ patet, qui sursum procedit. Mulieri grauida, si subito mamma emacruerunt, abortus periculum est. Quæ neque peperit, neque grauida est, si lac habet, à mens truis defecta est. Quartana æstiuæ breuis, autumnalis ferè longa est, maximeq; quæ cæpit hyeme appropinquante. Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione neruorum, periculum mortis est. Itemq; si medicamentis purgatum, & adhuc inanem neruorum distentio oppressit, aut si in magno dolore extremæ partes frigent. Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore detractus est. Aluus nigra, sanguini atro similis repentina, siue cum febre, siue etiam sine hac, perniciosa est.

De morborum curationibus.

C A P. I X.

Cognitis indicijs, quæ nos vel spe consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quedam communes sunt, quedam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis.

f

gulis.

gulis. Antè de communibus dicam. Ex quibus tamen quedam non agros solùm, sed sanos quoque sustinent: quedam in aduersa tantum valetudine adhibentur. Omne verò auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adijcit, aut euocat, aut reprimat, aut refrigerat, aut calefacit, simulq; aut durat, aut mollit. Quedam non vno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrarijs adiuuant. Demitur materia, sanguinis detractio, cucurbitula, deiectione, vomitu, frictione, gestatione, omniq; exercitatione, corporis abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

De sanguinis detractioe per venas. CAP. X.

Sanguinem incisa vena mitti, nouum non est: sed nullum penè morbum esse, in quo non mittatur, nouum est. Item mitti iunioribus, & fœminis vterum non gerentibus, vetus est. In pueris verò idem experiri, & in senioribus, & in grauidis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui, primam ultimamq; etatem sustinere non posse hoc auxilij genus indicabāt, persuaferantq; sibi mulierem grauidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea verò vsus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasq; potiores observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier, quæ grauida non est, pa-
rum.

rum valet, malè sanguis emittitur. Emoritur enim vis, si quæ his supererat, & hoc modo erepta est. At firmus puer, & robustus senex, & grauida mulier valens, tutò curantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest, quia ferè minus roboris illis atatibus subest. Mulieriq; pregnantì post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partu sustinendum. Non quicquid aut intentione animi, aut prudetiam exigit, protinus faciendum est, cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires æstimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in vna muliere duo corpora simul sustineat. Inter est enim inter valens corpus, & obesum, inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi sustinent, celeriusq; ea si nimium est pinguis aliquis affligitur. Ideoq; vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie æstimatur. Neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus, quod sit. Vtrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia sui male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenaq; venæ tument, sanguinis detractione requirit. Item viscerum, morbi,

neruorumq; resolutio, & rigor, & distentio, quicquid deniq; fauces difficultate spiritus strangulat, quicquid subito supprimit vocem, quisquis intolerabilis dolor est, & quacunq; de causa, ruptum aliquid intus atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesq; acuti morbi, qui modo (vt supra dixi) non infirmitate, sed onere nocent. Fieri tamen potest, vt morbus quidem id desideret, corpus autem vix pati posse videatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusq; sit, qui laborat, nisi temeraria quoq; via fuerit adiutus in hoc statu: boni medici est ostendere, quam nulla spes sine sanguinis detractione sit, fateriq; quantus in hac ipsa re sit metus. Et tum demum si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitari in eiusmodi re non oportet. Satius est enim, anceps auxilium experiri, quam nullum. Idq; maxime fieri debet, vbi nerui resoluti sunt. Vbi subito aliquis obmutuit. Vbi angina strangulatur. Vbi prioris febris accessio penè cōfecit, paremque subsequi verisimile est, neq; eandem videntur sustinere egri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. Neque enim semper concoctionem res exspectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quamuis paulo antè sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subsederit, corpus affligat. Idemq; etiam in alijs.

alijs casibus repentinis, qui strangulabunt, dictū
 erit. At si morbi ratio patiatur, tum demū nulla
 cruditatis* suspēctione remanente id fiet. Ideoq; *suspicio
 ei rei videtur aptissimus aduersa valetudinis ne-
 dies secundus aut tertius. Sed vt aliquando etiā
 primo die sanguinem mittere necesse est, sic
 nunquam vtile post diem quartum est, cum iam
 spatio ipso materia & exhausta est, & cor-
 pus corrumpit, vt detractio imbecillum id fa-
 cere possit, non possit integrum. Quod si vehe-
 mens febris vrget, in ipso impetu eius sangui-
 nem mittere, hominem iugulare est. Expectāda
 ergo remissio est, si non decrescit, sed crescere de-
 syt, neq; speratur remissio, tunc quoq; quamuis
 peior, sola tamen occasio non omittenda est. Fe-
 re etiam ista medicina vbi necessaria est, in bi-
 duum diuidēda est. Satiū est enim primum le-
 uare agrū, deinde perpurgare, quā simul omni
 vi effusa fortasse precipitare. Quod si in cura
 quoq; aqua, quae inter cutem est, * ita respondet, * ista
 quanto magis necesse est in sanguine respōdeat?
 Mitti verō is debet, si totius corporis causa sit,
 ex brachio: si partis alicuius, ex ea ipsa parte,
 aut certe quā proxima, quia non vbiq; mitti
 potest, sed in temporibus, in brachijs, iuxta ta-
 los. Neq; ignoro quosdam dicere, quā longissi-
 me sanguinem inde, vbi ledit, esse mittendum:
 sic enim auerti materiae cursum: at illo modo in
 idipsum quod grauat, euocari. Sed idipsum fal-
 sum est. Proximum enim locum primo*exhau- *exaruit
 f 3 rit.

rit. Ex vltioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur, vbi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen vsus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse. Si quod in humero vitium est, ex altero brachio: credo, quia si quid parum cesserit, opportuniore sunt partes iniuriæ sunt, quam quæ iam malè habent. Auertitur quoque interdum sanguis, vbi alia parte prorumpens, alia emittitur. Desinit enim fluere quàm volumus, inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mitti autem sanguinem cum sit expeditissimum, vsum habenti, tum ignaro difficilimum est. Iuncta enim est vena arterijs, his nervi. Ita si nervum scalpellus attigit, sequitur nervorum distentio, ea quæ hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque venæ, si forte præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam etiã ea latet, neque facile reperitur. Ita multæ res id difficile incerto faciunt, quod perito facilimum est. Incidenda ad medium vena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est. Ideoque utiliter effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. Eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat, prot

67
protinusq; is suppressendus est. Sed id euenire
non potest sub eo medico, qui scit ex quali cor-
pore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri so-
let, ut aque niger assidue ac primo die profluat.
Quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit,
suppressendus est. Semperq; ante sinus faciendus
est, quam anima deficiat. Deligandumq; bra-
chium super imposito expresso ex aqua frigida
penicillo, * & postero die aduerso medio digito * alias: &
vena ferienda, ut recens coitus eius resoluatur, postero di-
iterumq; sanguinem fundat. Siue autem primo, auerso m-
dio digito
siue secundo die sanguis, qui crassus & niger non autem
initio fluxerat, & rubere & pellucere coepit, scalpello
satis materiae detractum est, atq; quod superest, vena fa-
cienda.
sincerum est. Ideoq; protinus brachium deli-
gandum, habendumq; ita est, donec valens cica-
trícula sit, quae celerrime in vena confirmatur.

De sanguinis detractione per cucurbitulas.

C A P. X I.

Cucurbitularum verò duo genera sunt, æ-
neum, & corneum. Aenea altera parte
patet, altera clausa est. Cornea altera parte aquè
patens, altera foramen habet exiguum. In aneam
linamētum ardens conijcitur, ac sic os eius cor-
pori aptatur, imprimiturq; donec inhaereat. Cor-
nea per se corpori imponitur, deinde ubi ea par-
te qua exiguum foramen est, ore spiritus addu-
ctus est, superq; cera cauum id clausum est, æ-
què inhaerescit. Vtraq; non ex his tantum mate-
ria generibus, sed etiam ex quolibet alio rectè
f 4 fit.

fit. At si cetera defecerunt, caliculus quoque aut
 pultarius oris compressioris, ei rei commodè apta-
 tur. Vbi inhaesit, si concisa antè scalpello cutis est,
 sanguinem extrahit: si integra est, spiritum. Er-
 go vbi materia quæ inius est ledit, illo modo:
 vbi inflatio, hoc imponi solet. Vfus autem cucur-
 bitule præcipuus est, vbi non in toto corpore, sed
 in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad
 confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum
 testimonium est, etiam scalpello sanguinem, vbi
 membro succurritur ab ea potissimè parte, quæ
 iam laesa est, esse mittendum, quod nemo cucur-
 bitulam diuersæ parti imponit, nisi cum profu-
 sionem sanguinis eò auertit, sed ei ipsi quæ dolet
 quæque liberanda est. Opus etiam esse cucurbi-
 tula potest in morbis longis, * quamuis & ijs iam
 * alias, spatium aliquod accessit, siue corrupta materia,
 uamuis siue spiritu male habente. In acutis quoque qui-
 tiam spa busdam, si & leuari corpus debet, & ex vena
 ium sanguinem mitti, vires non patiuntur. Idque au-
 xilium vt minus vehemens, ita magis tutum.
 Neque vnquam periculosum est, etiam si in me-
 dio febris impetu, etiam si in cruditate adhibe-
 tur. Ideoque vbi sanguinem mitti opus est, si in-
 cisa vena, præceptum periculum est, aut si in par-
 te corporis etiam vitium est, huc potius confu-
 giendum est. Cum eo tamen, vt sciamus, hic vt
 nullum periculum, ita leuius præsidium esse, nec
 posse vehementi malo, nisi æquè vehemens au-
 xilium succurrere.

De

Diectionem autem antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui ductione in omnibus ferè morbis moliebantur, dabantq; aut nigrum veratrum aut filiculam, aut squamam erici, quoniam λεπίδος χαλκον Græci vocant, aut lactucæ marinæ lac, cuius gutta pani adiecta abunde purgat, aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, eiq; salis paulum adijciebant, decoquebantq; id, & sublatis his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant. Sed medicamenta stomachum ferè lædunt. Ideoq; omnibus catharticis aloë miscenda est. Alius si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa valetudine medicamentum eius rei causa rectè datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut ijs quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est eius rei causa cibos, potionesq; assumere, qui simul & alant, & ventrem molliant. Suntq; valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit. Plerumque verò alius *potioni- *potius bus ducenda est, quod ab Asclepiade quoque sic *vitupe *temperatum, ut tamen servatum sit, video plerumque seculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is secutus videtur, aptissima: ut neq; sæpe ea medicina tentetur, & tamen semel sumptum vel bis non omittatur. Si caput
f s graue

grave est: si oculi caligant: si morbus maioris in-
testini est, quod Græci κώλον nominant: si in
imo ventre, aut in coxa dolores sunt: si in stoma-
chum quedam biliosa concurrunt, vel etiam pi-
tuita eò se, humor' ve aliquis aquæ similis con-
fert: si spiritus difficiliter redditur: si nihil per se
venter excernit, utiq; si iuxta quoq; stercus est,
et intus remanet: aut si stercoris odorem, nihil
deiciens, eger ex spiritu suo sentit: aut si cor-
ruptum est quod excernitur: aut si prima inedia
febrem non sustulit: aut si sanguinem mitti,
cum opus sit, vires non patiuntur, tempus' ve
eius rei præterit: aut si multum ante morbum
portavit aliquis* potavit: aut si is qui sæpe vel sponte, vel
casu purgatus est, subito habet aluum suppres-
sam. Servanda verò illa sunt, ne ante diem ter-
tium ducatur, ne ulla cruditate substantive, ne in
corpore infirmo, diuq; in adversa valetudine
exhausto, ne' ve in eo, cui satis alvus reddit quo-
tidie, qui' ve eam liquidam habebit, ne in ipso
accessionis impetu, quia quod tum infusum est,
alvo continetur, regeſtumq; in caput, multo gra-
vius periculum efficit. Pridie verò abſtinere
debet eger, ut aptus tali curationi sit. Eodem die
ante aliquot horas aquam calidam bibere, et
*aliàs, superiores eius partes madescāt, tum *deicien-
mitten da alvus est, si levi medicina contenti sumus,
et si alvum pura aqua: si paulò valentiori, mulsa, si leni: ex
aqua, in qua fœnum græcum, vel ptisana, vel
malva decocta sit. Si reprimendi causa, ex ver-
benis

benis. Acris autem est marina aqua, vel alia
 sale adiecto, atq; vtraq; decocta commodior est.
 Acrior fit adiecto vel oleo vel nitro, vel melle
 quoque. Si acrior est, eo plus extrahit, sed mi-
 nus facile sustinetur. Id quod infunditur, neque
 frigidum esse oportet, neq; calidum, ne alterutro
 modo ledat. Cum infusum est, quantum fieri
 potest, continere se in lectulo debet ager, nec pri-
 mæ cupiditati deiectionis protinus cedere. Vbi
 necesse est, tum demum *desidere. Fereq; eo mo- *residere.
 do dempta materia superioribus partibus leua-
 tis morbum ipsum mollit. Cum verò quoties res
 coëgit, desidendo aliquis se exhaust, paulisper
 debet conquiescere, & ne vires deficient, utiq;
 eo die cibum assumere: qui plenior an exiguus
 sit dandus, ex ratione eius accessionis, quæ ex-
 pectabitur, aut in metu non erit, æstimari oport-
 tebit.

De Vomitu.

CAP. XIII.

AT Vomitus, ut in secunda quoq; valetudi-
 ne sæpe necessarius biliosis est, sic etiam
 in his morbis, quos bilis concitavit. Ergo omni-
 bus qui ante febres horrore & tremore vexan-
 tur, omnibus, qui cholera laborant, omnibus etiã
 cum quadam hilaritate insanientibus, & comi-
 tiali quoq; morbo oppressis, necessarius est. Sed si
 acutus morbus est, sicut in cholera, si febris est,
 ut inter horrores, asperioribus medicamentis o-
 pus non est, sicut in deiectionibus quoq; supra
 dictum

dictum est, satisq; est ea vomitus causa sumi,
 quæ sanis quoq; sumenda esse proposui. At ubi
 longi, valentesq; morbi sine febre sunt, ut comi-
 tialis aut insania, veratro quoq; albo utendum
 est. Id neq; hyeme, neq; æstate recte datur, opti-
 me vere, tolerabiliter autumnus. Quisquis datu-
 rus erit, id agere antè debet, ut accepturi corpus
 humidum sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi
 medicamentum, quod potui datur, non semper
 ægris prodesse, semper sanis nocere.

De Frictione.

CAP. XIII.

DE Frictione verò & Gestatione adeo
 multa Asclepiades, tanquam inuentor e-
 ius, posuit: quod in eo volumine quod commu-
 nialias, vi nium auxiliorum scripsit, cum trium tantum face-
 iscilicet, ret mentionem, *huius & equi & gestationis,
 & aquæ tamen maximam partem in hoc consumpserit.
 t gestat. Oportet autè neq; recentiores viros in his frau-
 dare, quæ vel reppererunt, vel rectè secuti sunt,
 & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos po-
 sita sunt, autoribus suis reddere. Neq; dubitari
 potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi
 & quomodo frictione utendum esset, Ascle-
 piades præceperit, nihil tamen repercrit, quod
 non à vetustissimo autore Hippocrate paucis
 verbis comprehensum sit, qui dixit, Frictione si
 vehemens sit, durari corpus: si lenis, molliri: si
 multa, minui: si modica, impleri. Sequitur er-
 go, ut tum utendum sit, cum aut astringendum
 corpus

corpus sit, quod fluens est: aut molliendum, quod induruit: aut dirigendum in eo quod copia nocet: aut alendum id, quod tenue, & infirmum est. Quas tamen species si quis curiosius aestimet, quod iam ad medicum non pertinet, facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam & astringitur aliquid eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat: & mollitur eo detracto, quod duriciem creabat: & impletur non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam relaxatam penetrat. Diversarum verò rerum in modo causa est. Inter unctionem autem & frictionem, multum interest. Ungi enim, leuiterq; pertractari corpus etiam in acutis & recentibus morbis oportet, in remissione tamen & ante cibum. Longa verò frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus conuenit, præterquam cum phreneticis somnus ea queritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & iam à primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse, incrementibus morbis, non cum iam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est, ut & quam primum bona valetudo contingat: & ne morbus, qui remanet, iterum, quamuis leui de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gra-
uis

uis esse quàm fuerit, neque ideo tamen solui, sed reliquys quibusdam inherere, quas admotum aliquod auxilium discutit. Sed vt leuata quoque aduersa valetudine rectè frictio adhibetur, sic nunquam adhibenda est febre increcente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit, minus certè cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corporibus esse debet, vt cum infirmus aliquis implendus modo est in partibus, aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat, non in impetu tamen doloris, et membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sepius aliud perfricandum est, cum aliud dolet, maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis euocare materiam volumus, ideoq; extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Et si is perinfirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse faciendum. Inter vtrunq; deinde, prout vires sunt. Quò fit, vt etiam minus sepe in muliere, quàm in viro, minus sepe in puero vel sene, quàm in iuvene manus dimouende sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentiq; frictione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quàm plurimum materie digerere, siue id ipsum membrum,

LIB. II. 95
brum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigat, breuior esse debet & lenior, ut tantummodo summam cutem emolliat, quò facilius capax ex recenti cibo noue materia fiat. In malis iam agrum esse testatur, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui. Sed tunc quoq; vnicum in frictione praesidium est, quæ si calorem in cutem euocauit, potest alicui medicinae locum facere.

De Gestatione.

CAP. XV.

Gestatio quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est, utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt: & his quibus lente morborum reliquæ remanent, neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, vehementiq; febre, precipueq; ardente, ad discutendam eam, gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit, meliusq; quiete eiusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri volet, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durties, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut precordijs suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, siue id in toto, siue in parte est, nisi tamen solis nervis dolentibus: neq; vnquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt & pro viribus cuiusq;

iusq; , & pro opibus, ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili obsint. Gestationum lenissima est naui, vel in portu, vel in flumine: vehementior in alto mari naui, vel lectica, aut scamno: acrior vehiculo. Atq; hæc ipsa, & intendi & leniri possunt: si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moueri: si ne id quidem est, at certè vni pedi lecti funiculus subijciendus est, atq; ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis, infirmis conueniunt. Valentiora verò his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his, qui grauium morborum initia sic sentiunt, vt adhuc febre vacent. Quod & in tabe, & in stomachi vitijs, & cum aqua cutem subijt, & interdum in morbo regio fit. Aut vbi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamuis diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco, quo quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent, præcepimus.

De Abſtinentia. CAP. XVI.

Abſtinentiæ verò duo genera ſunt. Alteri vbi nihil aſſumit æger. Alterum, vbi non niſi quod oportet. Initia morborum, primum famem, ſitimq; deſiderant: ipſi deinde morbi moderationem, vt neq; aliud, quàm expedit, neque eius ipſius nimium ſumatur. Neq; enim conuenit

nit iuxta inediam protinus satietatem esse. Quòd si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore etiam agro? Neque vlla res magis adiuvat laborantem, quàm tempestiva abstinencia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt, sibipps modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cetera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi quærat, quid medico liceat, non quid agro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in eius quod assumitur, vel tempore vel modo, vel genere peccatur.

De Sudore.

CAP. XVII.

Sudor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenae calidae, & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus vapor edificio includitur, sicut super Baias in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoque, & exercitatione is mouetur. Vtiliaq; hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isq; digerendus est. Ac nervorum quoque quedam vitia sic optimè curantur. Sed cetera infirmis possunt conuenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam grauibus morbis tenentur. Ca-

g

vel

vel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus
est. Nam modò discussis febribus initium cibi
plenioris, viniq; firmiter valetudini facit: mo-
dò febrem ipsam tollit, fereq; adhibetur, ubi sum-
mam cutem relaxari, euocariq; corruptum hu-
morem, & habitum corporis mutari expedit.
Antiqui timidius eo utebantur, Aesclepiades
audacius. Neque terrere autem ea res, si tempe-
stiva est, debet: & ante tempus nocet. Quisquis
febre liberatus est, simul atq; ea vno die non ac-
cessit, eo qui proximus est, post tempus accessio-
nis, tutò lauari potest. At si circuitum habere ea
febris solita est, sic ut tertio, quarto'ue die reuer-
tatur, quandocunq; non accessit, balneum tutum
est. Manentibus verò adhuc febribus, si hæ sunt
lentæ, lienesq; iamdiu male habent, rectè medi-
cina ista tentatur. Cum eo tamen, ne præcordia
dura sint, ne'ue ea tumeant, ne'ue lingua aspera
sit, ne'ue aut in medio corpore, aut in capite do-
lor ullus sit, ne'ue tum febris increascit. At in his
quidem febribus quæ certum circuitum habent,
duo balnei tempora sunt, alterum ante horro-
rem, alterum febre finita. In his verò qui lentis
febriculis diu detinentur, cum aut ex toto reces-
sit accessio, aut si id non solet certè lenita est,
iamq; corpus tam integrum est, quàm maxime
esse in eo genere valetudinis solet: imbecillus ho-
mo iturus in balneum, vitare debet, ne aut è fri-
gus aliquod experiatur. Vbi in balneum ve-
resistere nit, paulisper*residere, expeririq; num tempora
astring

astringantur, & an sudor aliquis oriatur. Illud
 si incidit, hoc non secutum est, inutile eo die bal-
 neum est: perungendus est is leniter, & referen-
 dus est, vitandumq; omnimodo frigus, & absti-
 nentia vtendum. At si temporibus integris, pri-
 mum ibi, deinde alibi sudor incipit, fouendum os
 aqua calida, tum in solio desidendum est: atque
 ibi quoque videndum, num sub primo contactu
 aque calide summa cutis inhorrescat, quod vix
 tamen fieri potest, si priora rectè cesserunt. Cer-
 tum id autem signum inutilis balnei est. At tē
 verò, an postea, quàm in aquam calidam se de-
 mittat, aliquis perungi debeat, ex ratione vale-
 tudinis sue cognoscat. Ferè tamen, nisi vbi no-
 minatim, vt postea fiat, id præcipietur, moto sit-
 dore leniter corpus perungendum, deinde in a-
 quam calidam demittendum est. Atq; hic quoq;
 habenda virium ratio est. Neq; committendum,
 vt per æstum anima deficiat: sed maturius is
 auferendus, curiosoq; in vestimentis inuoluen-
 dus est, vt neque ad eum frigus aspiret, & ibi
 quoque antequam aliquid assumat, insudet. Fo-
 menta quoque calida sunt, milium, sal, harena,
 quodlibet eorum calefactum, & in linteum con-
 iectum. Si minore vi opus est, etiam solum lin-
 teum. At si maiore, extincti titiones, inuolutiq;
 panniculis, & sic circumdati. Quinetiam calido
 oleo replentur vtriculi, & in vasa fictilia, ad si-
 militudinem, quas lenticulas vocant aqua con-
 iicitur, & sal sicco linteo excipitur, demitti-
 turq;

De his ex-
 tinctis t-
 tionibus
 bes infra
 3. cap. 12.
 Lenticul.

turq; in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fouendum est, collocatur: iuxtaq; ignem ferramenta duo sunt capitulis paulo latioribus, alterumq; ex his demittitur in eum salem, & aqua super leuiter aspergitur. Vbi frigere cæpit, ad ignem refertur, & idem in altero fit, deinde inuicem in utroque inter quæ descendit salsus & calidus succus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoq; vtendum sit, in ipsis morborum generibus dicetur.

Qui cibi, potionésue, aut valentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint. CAP. XVIII.

Cum de his dictum sit, que detrahendo iuant, ad ea veniendum est, quæ nos alunt, id est cibum & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetq; ad rem, omnium proprietates nosse: primum, vt sani sciant, quomodo his vtantur: deinde vt exsequentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, quæ assiduè necessariæ erunt, subijcere. Neque necesse est subinde singulas illas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæq; ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse. Id valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Item omne animal quadrupes

drupes domi natum, omnem grandem feram,
 quales sunt caprae, ceruus, aper, onager: omnem
 grandem auem, quales sunt anser, & pavo, &
 grus. Omnes belluas marinas, ex quibus nāt
 est, quaeq; his pares sunt. Item mel, & caseum.
 Quò minus mirum est, opus pistorium, valen-
 tissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle,
 caseo constat. In media verò materia, numera-
 ri ex oleribus debere ea, quorum radices vel
 bulbos assumimus. Ex quadrupedibus, leporem.
 Aues omnes à minimis ad Phœnicopterum:
 item pisces omnes, qui salem non patiuntur, so-
 lidi ue saliuntur. Imbecillissimam verò mate-
 riam esse omne olus, & quicquid in cauliculo
 nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, &
 capparitis. Omnia poma, oleas, cochleas, itemq;
 conchylia. Sed quamuis hæc ita discretæ sunt, ta-
 men etiam quæ sub eadem specie sunt, magna
 discrimina recipiunt, aliaq; res alia vel valen-
 tior est vel infirmior. Siquidem plus alimenti
 est in carne, quàm in vlllo alio. Firminus est triti-
 cum, quàm milium, id ipsum quàm ordeum, &
 ex tritico firmissima siligo, deinde simila, dein-
 de cui nihil ademptum est (quod αὐτόωρον
 Græci vocant) infirmior est, ex polline infir-
 missimus cibarius panis. Ex leguminibus ve-
 rò valentior faba, vel lenticula, quàm pisum.
 Ex oleribus valentior rapa, napiq; & omnes
 bulbi (in quibus cepam quoque & allium nu-
 mero) quàm pastinaca, vel quæ specialiter, ra-
 dicula

Cibarius
 panis.

Varro I.
 4. de Lin
 Latin. R
 dix, inqu

eregrinū dīcula appellatur. Item firmior brassica, & be-
 vocabulū: ta, & porrum, quā lāctuca, vel cucurbita, vel
 c enim an asparagus. At ex fructibus surculorum valen-
 qui Græ- tiores vūc, ficus, nūces, palmule, quā quæ po-
 i, quū nūc ma proprie nominantur. Atque ex his ipsis fir-
 aphanū. fragilia miora quæ succosa, quā quæ *frigida sunt.
 Itemq; ex his auiibus, quæ in media specie sunt,
 valentior ea, quæ pedibus, quā quæ volatu
 magis nititur: & ex his quæ volatu fidunt, fir-
 miores sunt, quæ grandiores aues, quā quæ
 minutæ sunt, vt ficedula & turdus. Atque eæ
 quoq; quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præ-
 stant, quā quæ natandi scientiam non habent.
 Inter domesticas verò quadrupedes, leuissima
 suilla est, grauiissima bubula. Itemq; ex feris
 quo maius quodque animal, eo robustior ex eo
 cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media mate-
 ria sunt, quibus maxime vtimur: tamen gra-
 uissimi sunt, ex quibus salsamenta quoque fieri
 possunt, qualis Lacertus est, deinde qui quam-
 uis teneriores, tamen duri sunt, vt aurata, cor-
 uus, scarus, oculata: tum plani. post quos etiam
 leuiiores, lupi, mulliq;, & post hos omnes saxa-
 tiles. Neque verò in generibus rerum tantum-
 modo discrimen est, sed etiam in ipsis, quod &
 atate fit, & membro, & solo, & cælo, & ha-
 bitu. Nam quadrupes animal omne si lactans
 est, minus alimenti præstat. Item quo tenerior
 pullus cohortalis est. In piscibus quoque media
 etas, quæ nondum summam magnitudinem im-
 pleuit.

pleuit. Deinde ex eodem sue ungulae, rostrum,
aures, cerebellum. Ex agno, haedo'ue, cum petio-
lis totum caput aliquāto, quā cetera membra,
leuiora sunt, adeo vt in media materia poni pos-
sint. Ex auibus, colla alae'ue recte infirmis an-
numerantur. Quod ad solum verò pertinet, fru-
mentum quoque valentius est collinum, quā
campestre. Leuior piscis inter saxa editus, quā
in harena: leuior in harena, quā in limo. Quò
fit, vt ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem ge-
nera grauiora sint. Leuiorq; qui in alto, quā
qui in vado vixit. Omne etiam ferum animal
domestico leuius: & quodcunque humido cœ-
lo, quā quod sicco natum est. Deinde eadem
omnia pingua, quā macra, recentia quā sal-
sa, noua quā vetusta, plus alimenti habent.
Tum res eadem magis alit iurulenta, quā assa:
magis assa, quā* frixa. Ouum durum valen- * elixa
tissime materiae est, molle vel sorbile, imbecillif-
sime. Cumq; panificia omnia firmissima sint,
elota tamen quedam genera frumenti, vt alica,
ōpusa, ptisana, vel ex hisdem facta sorbitio, vel
pulticula, & aqua quoque madens panis imbe-
cillissimis annumerari potest. Ex potionibus ve-
rò, quaecunque ex frumento facta est, itemq; lac,
mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce,
aut vehemens, aut mustum, aut magnae vetu-
statis, valentissimi generis est. At acetum, &
id vinum, quod paucorum annorum, vel auste-
rum, vel lenē est, in media materia est. Ideoq;
g 4 infirm

infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est: firmiorq; ex frumento potio est, quò firmitus fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quàm quod tenui, quodq; temperato caelo, quàm quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumq; aut frigido, aut calido natum est. Mulsum quò plus mellis habet, defrutum quo magis incoctum est, passum quo ex sicciore uva est, eo valentius est. Aqua leuissima pluuialis est, deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo, post hæc ex niue, aut glacie, grauior his ex lacu, grauiissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturam eius requirentibus. Nam leuis pondere apparet, & ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæq; est, quo celerius & calefit, & frigescit, quoq; celerius ex ea legumina percoquuntur. Ferè verò sequitur, vt quò valentior quæq; materia est, eo minus facile concoquatur, sed si concocta est, plus alat. Itaque vtendum est materiæ genere pro viribus, modusq; omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus infirmis- simis opus est. Mediocriter firmos media materia optime sustinet: & robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest, magis in his, quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

Quæ natura ac proprietas cuiusque rei sit, quæ
vescitur.

C A P. XIX.

Neque

NEquæ hæc sola discrimina sunt, sed etiam alia res boni succi, alia mali sunt, quas οὐχὺλὰς, vel κακοχὺλὰς Græci vocant. Alia lenes, alia acres, alia crassiores pituitam in nobis faciunt, alia tenuiorem, alia idonea sunt stomacho, alia aliena sunt. Itemq; alia inflant, alia ab hoc absunt, alia calefaciunt, alia refrigerant, alia facile in stomacho acescunt, alia non facile intus corrumpuntur, alia mouent alium, alia supprimunt, alia citant urinam, alia tardant. Quædam somnum mouent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

Quæ res boni succi sint.

C A P. XX.

Boni succi sunt, triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Item & lenes sunt & stomacho aptæ & calefaciunt, tragum, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoque hæc, quas supra nominauimus. Notedij inter teneros duosq; pisces, vt mullus & lupus, verna, lactuca, vrtica, malua, cucumis, cucurbita, ouum forbile, portulaca, cochleæ, palmulæ. Ex pomis quodcunq; neq; acerbum neq; acidum est. Vinum dulce vel lene, passum, defrutum, olea quæ ex his duobus in alterutro seruata sunt, vuluæ, rostra, *trunculiq;. In summa omnis pinguis caro, *ventri-
culiq;

§ §

Quæ

Quæ res mali succi sint.

CAP. XXI.

MAli verò succi sunt milium, panicum, ordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisq; caro salsa, omne salsamentum, garum, vetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica, magisq; etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, fœniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, & allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunq; acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, pisces quoq; saxatiles, omnesq; qui ex tenerissimo genere sunt, aut hi qui rursus nimium duri, virosiq; sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosi uerui ferunt, qui uer in nimiam magnitudinem excesserunt.

Quæ res lenes, quæ uer acres sint.

CAP. XXII.

Lenes autem sunt, sorbitiones, pulticula, Laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, & quæcunq; glutinosa est. Quod fere quidem in omni, quæ domestica fit, præcipue tamen in vngulis, trunculisq; suum, in petiolis, capitulisq; hœdorum, & vitulorum, & agnorum, omnibusq; cerebellis. Item si qui proprie bulbi nominantur, lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria sunt omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis

Petiolis, id
est, paruis
pedibus: à
Catone pe
decini, in
de re ru
stic. appel
lati.

mis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, lactuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiores, quæ uero tenuiores pituitam faciant.

CAP. XXIII.

Crassiores autem pituitam faciunt, oua sorbilia, alica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; fere glutinosa. Extenuant eandem omnia salsa, atq; acria, & acida.

Quæ res stomacho idoneæ sint.

CAP. XXIII.

Stomacho autem aptissima sunt, quæcunque austera sunt, etiam quæ acida sunt, quæq; contacta sale modico sunt. Item panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel ptisana, omnis auis, omnis venatio atq; utraq; vel assa, vel elixa. Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex ceteris sumitur, macrum potius, quam pingue. Ex sue ungule, rostra, aures, *vulueq; steriles. *vulue, Ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, sifer. Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pirum fragile, quale crustuminum, vel neuianum est. Item pira, quæ reponuntur tarentina atq; signina. Malum orbiculatum, aut scandianum, vel amerinum, vel cotoneum, vel punicum. Vux ex olla, molle ouum, palmule, nuclei, pinei, oleæ albæ ex dura muria, eadem aceto intinctæ, vel nigrae, quæ in arbore bene permaturuerunt, vel quæ in passo, defruto uero seruata sunt. Vinum austerrum, licet iam asperum sit, item resinatissimum.

Duri

Duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpurae, cochleae: cibi, potionesq; vel frigidae vel feruentes, absinthium.

Quae res alienae stomacho sint. CAP. XXV.

Aliena verò stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, praedulcia, omnia pingua, sorbitio, panis fermentatus, itēq; vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices olerum, & quodcumq; olus ex oleo garo'ue estur, mel, mulsum, defrutū, passum, lac, omnis caseus, vna recens, ficus & viridis & arida, legumina omnia, quaeq; inflare consueuerunt: item thymum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lappathum, lapsana, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

Quae inflant, aut inflammationem leuent.

CAP. XXVI.

Inflant autem omnia fere legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atque etiam id vinum, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus allium, cepa, brassica, omnesq; radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam aridae, sed magis virides, vnae recentes, nuces omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisq; caseus, quicquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchylijs, ouis vel mollibus, vel sorbilibus, vi-

no

no vetere. Fœniculum verò & anethum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calefaciant, aut refrigerent.

CAP. XXVII.

AT calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, alliū, cepa, ficus arida, salsamentū, vinum, & quo meracius est, eo magis. Refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, vt intubus, & lactuca. Item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetum, sine cibis ex eo, siue potio assumitur.

Quæ res intus facile vitientur, vel minime corrumpantur.

CAP. XXVIII.

FAcile autem intus corripiuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quam ex tritico est, lac, mel, ideoq; * lactaria atq; omne pisto. * lactatia riū opus, teneri pisces, ostrea, olera, caseus, et recens, & vetus, crassa vel tenera caro, vinū dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde vel iurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aues, & eæ potius duriores, aurati pisces: neque solum aurata pura, aut scarus, sed etiam lolligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est, si macra, si salsa est, omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpureæ, vinum austereum, vel resinatum.

Quæ res alium moueant.

CAP. XXIX.

AT alium mouent, panis fermentatus, magisq; si cibarius vel hordeaceus est, brassica,

ca, si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtium,
 ocymum, vrtica, portulaca, radícula, capparis,
 allium, cepa, malua, lapathum, beta, asparagus,
 cucurbita, cerasia, mora, vna, omnia mitia, ficus
 etiam arida, sed magis viridis, vna recetes, pin-
 gues, minutæ aues, cochlea, garum, salsamenta,
 ostrea, pelorides, echini, muscoli, et omnes fere
 conchilæ, maximeq; ius earum, saxatiles, et
 omnes teneri pisces, sepiarum atramentum, si qua
 caro assumitur pinguis eadem, vel iurulenta,
 * lactatia vel elixa, aues, quæ natant, mel crudum, lac, * la-
 ctaria omnia, mulsum, vinum dulce, vel salsum,
 aqua tenera, omnia tepida, dulcia, pingua, eli-
 xa, iurulenta, salsa, diluta.

Panis.

Quæ res aluum astringant. C A P. XXX.

Contra astringunt, panis ex siligine, vel ex
 simila, magis si sine fermento est, magis etiã
 si vstus est, intenditurq; vis eius etiam si bis
 coquitur. Pulticula vel ex alica, vel ex panico,
 vel ex milio, itemq; ex iisdem sorbitio, et ma-
 gi si hæc antè fricta sunt. Lenticula, cui vel be-
 ta, vel intubus, vel ambubcia vel plantago ad-
 iecta est, magisq; etiam, si illa antè fricta est,
 per se etiã intubus, vel ex plantagine vel am-
 bubeia fricta, minuta olera, brassica bis deco-
 cta, dura oua, magisq; si assa sunt, minutæ aues,
 merula, palumbus, magisq; si in posca decoctus
 est, graues omnes aues, quæ magis currunt, quàm
 volant: lepus, caprea, iecur ex his quæ seuum ha-
 bent, maximeq; bubulum, ac seuum ipsum, ca-
 seus,

sens, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione quam in caseo transmarino videmus, aut si recens est ex melle, mulso'ue decoctus. Item mel coctum, pira immatura, sorba, magisq; ea, quæ torminalia vocantur, mala cydonia, & punica, oleæ vel albæ vel permaturæ, myrta, pal-mula, purpure, murices, vinum refinatum vel asperum, item meracum, acetum, mulsum quod inferbuit, item defrutum, passum, aqua vel tepida, vel præfrigida, dura, id est ea quæ tarde putrescit, ideoq; pluvia potissimum, omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, & in eadem carne assa potius quàm elixa.

Quæ res urinam mouent. C A P. XXXI.

Vrinam autem mouent, quæcunq; in horto nascentia boni odoris sunt, vt apium, ruta, anethum, ocymum, menta, hyssopum, anesum, coriandrum, nasturtium, eruca, sceniculum. Præter hæc asparagus, capparis, nepeta, thymum, satureia, lapsana, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, sifer, cepa. Ex venatione maxime lepus, vinum tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum moueant, aut sensus excitent.

C A P. XXXII.

Somno verò aptum est papauer, lactuca, maximeq; æstiva, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum, porrum. Sensus excitant nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueq; pulegium, ruta & cepa.

Qua
D^r Joseph Vaz Buendz

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant,
aut refrigerent, aut calefaciant, aut du-
rent, aut emolliant. C A P. XXXIII.

EVocare verò materiam multa admodum
possunt. Sed ea quæ ex peregrinis medica-
mentis maxime constant, alijsq; magis quàm
quibus ratione victus succurritur, opitulantur,
in præsentia differã. Ponam ea verò, quæ prom-
pta, & his morbis (de quibus protinus dictu-
rus sum) apta corpus erodunt, & sic ex eo, quod
mali est, extrahunt. Habent autem hanc facul-
tatem semina erucæ, nasturtij, radiculæ, præci-
pue tamen omnium sinapi. Salis quoque & fici
eadem vis est. Leniter verò simul & reprimunt
vel ace- & molliunt lana succida * ex aceto vel vino,
o vel vi- cui oleum adiectum est, contrita palmulæ, fursu
io, quo res in salsa aqua, vel aceto decocti. At simul re-
leu adi. primunt, & refrigerant, herba muralis, parthe-
nium, vel perdicium appellant, serpyllum, pule-
gium, ocymum, herba sanguinalis, quam Græci
πολύγονον vocant, portulaca, papaveris folia, ca-
preoliq; vitium, coriandri folia, hyoscyamũ, mu-
scus, sifer, apium, solanum, quàm στυχρον Græci
vocant, brassicæ folia, intubus, plantago, fœnicu-
li semen, contrita pira vel mala, præcipueq; cy-
donia, lenticula, aqua frigida, maximeq; plu-
uialis, vinum, acetum, & ex horum aliquo ma-
gis, madens vel panis, vel farina, vel spongia,
vel cinis, vel lana succida, vel etiam linteolum,
creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa,
acerb

herba san-
guinalis.

acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia, cuius generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hedera, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cydonia, malicorium, aqua calida, in qua verbenae coctae sunt, quas supra proposui, pulvis vel ex fecerini, vel ex myrti folijs, amarae nuges. Calefacit verò ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex farri, siue hordei, siue erui, vel lolij, vel milij, vel panici, vel lenticulae vel fabae, vel lupini, vel lini, vel faeni graeci, ubi ea deferebuit, calidaq; imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Praeterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iuncta oleo, magisq; si vetus est, sal, nitrũ, git, piper, quinquefolium, fereq; quae vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant quae calefaciunt & digerunt, & emolliunt. Praecipueq; ad emolliendũ potest cataplasma ex lini vel faeni graeci semine. His autem omnibus & simplicibus & permixtis variè medici vtuntur, vt magis quid quisq; persuasit sibi appareat, quam quid euidenter cõpeterit.

h

LIB

LIBER III.

De morborum generibus.

CAP. I.



PROVISIS omnibus, quae pertinent ad vniuersa genera morborum, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Graeci diuiserunt, aliosque ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Ideoque quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alij inter acutos, alij inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse manifestum est. Quidam enim breues utique sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est. Tertiumque genus eorum est, qui modo acuti, modo longi sunt. Idque non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est, sed in alijs quoque fit. Atque etiam praeter hos, quartum est, quod neque acutum dici potest, quia non perimit: neque utique longum, quia si occurritur, facile sanatur. Ego cum de singulis dicam, cuius quisque generis sit, indicabo. Diuidam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, et eos qui oriuntur in partibus. Incipiam a prioribus, pauca de omnibus praefatus. In nullo quidem morbo minus fortuna sibi vindicare, quam
 fortuna ars potest, utpote cum repugnante natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis,

bis, quàm in longis. Hic enim breue spatium est, intra quod si quod auxilium non profuit, aeger extinguitur. Ibi & deliberationi & mutationi remediorum tempus patet, adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens aeger sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quò vetustior est, longus autem quò recentior, eò facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quòd non omnibus aegris eadem auxilia conueniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi auctores, quasi sola vendicauerint, prout cuique cesserant. Oportet itaque ubi aliquid non respondit, non tanti putare autorem, quanti aegrum, & experiri aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis citò mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit, non statim condemnetur, si quid non statim profuit. Minus verò remoueatur, si quid paulum saltem iuuat, quia profectus tempore expletur.

Quomodo morbi cognoscantur, & an incrementum, an constant, an minuantur: & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.

CAP. II.

Protinus autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit: non in his solis in quibus semper ita se habet, sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones & dolores graues
h 2 urgent

urget, acutus morbus est. Vbi lenti dolores, lenti
ue febres sunt, & spatia inter accessiones por-
riguntur, acceduntq; ea signa, quæ in priore vo-
lumine exposita sunt, longum hunc futurum esse
manifestum est. Videndum etiam est, morbus
an increseat, an consistat, an minuatur, quia
quædam remedia incrementibus morbis, plura
inclinantibus conueniunt. Eaq; quæ decrescen-
tibus apta sunt, vbi acutus increscens urget, in
remissionibus potius experienda sunt. Increscit
autem morbus, dum grauiores dolores accessio-
nesq; veniunt, hæq; & antè quàm proximæ re-
uertuntur, & postea desinunt. Atque in longis
quoq; morbis etiam tales notas non habentibus,
scire licet increscere, si somnus incertus est, si
deterior concoctio, si fædiore deiectiones, si
tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit cor-
pus frigus aut calor, si idem magis pallet. Ea ve-
rò quàm contraria his sunt, decedentis eius no-
te sunt. Præter hæc in acutis morbis serius eger
alendus est, nec nisi iam inclinatis, vt primò
aduentu turius, vt sustinere spatium^x affecturi mali
possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed
in parte est, magis tamen ad rem pertinet vim
totius corporis molliri, quàm propriæ partes
egre sanentur. Multum etiam interest, ab ini-
tio quis recte curatus sit, an perperam, quia cu-
ratio minus his prodest, in quibus assidue fru-
stra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris
virib

viribus viuit, admota curatione momento resti-
tuitur. Sed cum ab his cœperim, quæ notas quas-
dam futuræ aduersæ valetudinis exhibent, cura-
tionum quoque principium ab animaduersione
eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his
quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt,
quies, & abstinentia. Si quid bibendum, aqua.
Idq; interdum vno die fieri satis est. Interdum,
si terrentia manent, biduo. proximeq; absti-
nentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda
aqua, postera die etiam vinum, deinde inui-
cem alternis diebus, modò aqua, modò vinum,
donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc enim
sæpe instans grauis morbus discutitur. Pluri-
miq; falluntur, dum se primo die protinus subla-
turos languorem, aut exercitatione, aut balneo,
aut coacta deiectione, aut vomitu, aut sudatio-
nibus, aut vino sperant. Non quo non interdum
id incidat, aut non decipiat, sed quò sæpius fal-
lat, solaq; abstinentia sine vllò periculo medea-
tur. Cum præsertim etiam pro modo terroris mo-
derari liceat, & si leuiora indicia fuerint, satis
sit à vino tantum abstinere: quod subtractum,
plus quàm si cibo aliquid dematur, adiuvat: si
paulò grauiora, facile sit, non aquam tantum bi-
bere, sed etiam cibo carnem subtrahere. Interdum
panis quoq; minus quàm pro consuetudine assu-
mere, humidoq; cibo esse contentum, & olere po-
tissimum. Satisq; sit tum ex toto à cibo, à vino,
ab omni motu corporis abstinere, cum vehe-

mentes nota terruerunt. Neque dubium est quin vix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrit, ægrotet.

De Februm generibus.
CAP. III.

ATque hæc quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. sequitur verò curatio febriū, quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his vna quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædā redeunt, sed id raro euenit. In prioribus & morbi sunt, & medicina. At quartanæ quidem simpliciores sunt. Incipiunt fere ab horrore, deinde calor erumpit, finitaq; febre biduum integrum est, ita quarto die reuertitur. Tertianarum verò duo genera sunt. Alterum eodem modo quo quartana & incipiens & desinens, illo tantum interposito discrimine, quod vnum diem præstat integrum, tertio redit. Alterū longe perniciosius, quod tertio quidem die reuertitur, ex octo autē & quadraginta horis, fere sex & triginta per accessionem occupat, interdum etiam vel minus vel plus, neq; ex toto in remissione desistit, sed tantū lenius est. Id genus pleriq; medici hemitritæo appellat. Quotidianæ verò variæ sunt, Frigus. & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus voco, vbi extrema partes membrorum inalgescunt: horror

horrorē, ubi totum corpus intremittit. Rursus alie
sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: alie
sic, ut aliquantum quidem minuat ex febre,
nihilominus tamen quedā reliquā remaneant,
donec altera accessio accedat, ac sæpe alie vix
quicquam, aut nihil remittant, sed ita ut conti-
nuent. Deinde alie feruorem ingentem habent,
alie tolerabilem, alie quotidie pares sunt, alie
impares, atq; inuicem altero die leniores, altero
vehementiores, alie tēpore eodem posttridie reuer-
tuntur, alie vel serius vel celerius, alie diem no-
ctemq; accessionē et decessionē implent, alie mi-
nus, alie plus, alie cum decedūt sudorē mouent,
alie non mouent: atq; aliās per sudorem ad in-
tegritatem venit, aliās corpus tantum imbe-
cillius redditur. Accessiones etiam, modò singu-
le singulis diebus fiunt, modò binæ, plures ve
concurrunt. Ex quo sæpe euenit, ut quotidie plu-
res accessiones, remissionesq; sint. Sic tamen ut
vnaquaq; alicui priori respondeat. Interdum
verò accessiones quoq; confunduntur, sic ut no-
tari neq; tempora earum, neque spatia possint.
Neq; verum est, quod dicitur à quibusdam, nul-
lam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vom-
ica, aut ex inflammatione, aut ex vlcere. Facilior
enim semper curatio foret, si hoc verum esset.
Sed quod euidentes causse faciunt, facere etiam
abditæ possunt. Neq; de re, sed de verbo contro-
uersiam mouent. Qui cum aliter aliterq; in eodē
morbo febres accedant, non easdē inordinate re-
b 4 dire,

dire, sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. Quod
tamen ad curandi rationem nihil pertineret, e-
tiam si verè diceretur. Tempora quoq; remissio-
num modò liberalia, modò vix vlla sunt.

De curationū diuersis generibus. CAP. IIII.

ET februum quidem ratio maxime talis est.
Curationū verò diuersa genera sunt, prout
autores aliqui habēt. Asclepiades officium esse
medici dicit, vt tutò, vt celeriter, vt iucundè cu-
ret. Id notum est, sed ferè periculosa esse nimiū,
& festinatio & voluptas solet. Qua verò mo-
deratione vtendū sit, vt quantum fieri potest o-
mnia ista cōtingant, prima semper habita salu-
te in ipsis partibus curationū considerandū erit.
Et ante omnia queritur, primis diebus aeger qua
ratione continendus sit. Antiqui medicamentis
quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò
quòd cruditatē maxime horrebant: deinde eam
materiam, quæ ledere videbatur, ducēdo sepius
aluū subtrahebant. Asclepiades medicamenta
sustulit, aluū non toties, sed ferè tamen in o-
mni morbo subduxit. Febre verò ipsa præcipuè
se ad eius remedium vtī professus est. Conuellen-
das enim vires egri putauit, luce, vigilia, siti
ingenti: sic, vt ne os quidem primis diebus elui
sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia iu-
Et is e- cundam eius disciplinam esse contendunt. * His
m enim vltioribus quidem diebus cubātis etiam
luxuriæ subscripsit: primis verò tortoris vicem
exhibuit. Ego autem medicamentorum dari po-
potiones,

potiones, & aliud duci non nisi raro debere, con-
 cedo. Et id non ideo tamen agendum, ut aegri vi-
 res conuellantur, existimo: quoniam ex imbecil-
 litate summum periculum est. Minui ergo tan-
 tam materiam superatam oportet, quæ naturali-
 ter* digeritur, ubi nihil noui accedit. Itaq; abf- * detra-
 tinendus à cibo primis diebus est, in luce haberi hatur
 dus aeger, nisi infirmus interdum est, quoniam
 corpus ista quoq; digerit, isq; cubare quam ma-
 ximo conclaus debet. Quod ad sitim verò so-
 mnumq; pertinet, moderandum est, ut interdum
 vigilet: noctu, si potest, conquiescat: ac neq; po-
 tet, neq; nimium siti crucietur. Os etiam eius e-
 lui potest, ubi & siccum est, et ipsi fœtet, quam-
 uis id tempus aptum potioni non est. Commodeq;
 Erasistratus dixit, sæpe inferiore parte humo-
 rem non requirente, os & fauces requirere, neq;
 ad rem male haberi ægrum pertinere. Ac primò
 quidem sic tenendus est. Optimum verò medi-
 camentum est, opportunè cibus datus, qui quan-
 do primum dari debeat, queritur. Plerique ex
 antiquis tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sex-
 to, & id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto
 cœli ratio patitur. Asclepiades ubi ægrum tri-
 duo per omnia fatigarat, quarto die cibo desti-
 nabat. At Themison nuper, non quando cœpisset
 febris, sed quando desisset, aut certè lenata
 esset, considerabat, & ab illo tempore expectato
 die tertio, si non accesserat febris, statim: si acces-
 serat, ubi ea vel desierat, vel si assidue inhaere-
 bat,

bat, si certè se inclinauerat, cibum dabat. Nihil
autem horum utiq; perpetuum est. Nam potest
primo die primus cibus dandus esse, potest se-
cundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut
quinto, potest post vnā accessionem, potest post
duas, potest post plures. Refert enim qualis mor-
bus sit, quale corpus, quale cælum, quæ ætas,
quod tempus anni. Nolinimeq; in rebus multum
inter se differentibus, quod intermittendum non
est, perpetuum esse præceptum temporis potest.
In morbo qui plus virium aufert, celerius cibus
dandus est, itemq; eo cælo, quo magis digerit.
Ob quam causam in Aphrica, nullo die æger
abstinere recte videtur. Maturius etiam puero,
quàm iuueni, æstate, quàm hyeme dari debet.
Vnum illud & semper & ubiq; seruandum est,
vt ægri vires subinde assidens medicus inspi-
ciat, & quamdiu supererunt, abstinentia pu-
gnet: si imbecillitatem vereri cœperit, cibo sub-
ueniat. Id enim eius officium est, vt ægrum neq;
superuacua materia oneret, neq; imbecillitatem
*fami *fame perdat. Idq; apud Erasistratum quoq;
odat inuenio, qui quamuis parum docuit, quādo ven-
ter, quando corpus ipsum exinaniretur, dicendo
tamen hac esse visenda, et tum cibum dandum,
cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires
superessent, dari non oportere: ne deficerent, con-
sulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab
vno medico multos non posse curari, eumq; (si
artifex est) idoneum esse, qui non multum ab æ-
gro

gro recedit. Sed qui quæstui seruiunt, quoniam
is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea
præcepta, quæ sedulitatem non exigunt, ut in
hac ipsa re. Facile est enim dies, vel accessiones
numerare his quoque, qui ægrum raro vident. ille
assideat necesse est, qui quod solum opus est, vi-
surus est, quando nimis imbecillus futurus sit,
nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad ini-
tium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.
Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, Dies impar-
res. quoniam antiqui potissimum impares sequeban-
tur, eosque, tanquam tunc de ægris iudicaretur,
negiorum nominabant. Hi erant dies tertius,
quintus, septimus, nonus, undecimus, quartus-
decimus, unus et vigesimus, ita ut summa po-
tentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni
et vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutrie-
bant, ut dierum imparium accessiones expecta-
rent, deinde postea cibum quasi leuioribus ac-
cessionibus instantibus darent, adeo ut Hippo-
crates, si alio die febris desisset, recidivam timere
sit solitus. Id Asclepiades iure ut vanum repu-
dianit, neque in ullo die, quia par, imparue esset,
his vel maius, vel minus periculum esse dixit.
Interdum enim peiores dies pares fiunt, et op-
portunius post earum accessiones cibus datur.
Nonnunquam etiam in ipso morbo, dierum ratio
mutatur, fitque grauior, qui remissior esse consue-
uerat, atque ipse quartusdecimus par est, in quo
esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum
octauum

octauum primi naturam habere contenderent,
 vt ab eo secundus septenarius numerus incipe-
 ret, ipsi sibi repugnabant, non octauum, neq; de-
 cimum, neq; duodecimum diem sumendum quasi
 potentiozem. Plus enim tribuebant nono & vn-
 decimo. Quod cum fecissent sine vlla probabili
 ratione, ab vndecimo non ad tertiumdecimum,
 sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam
 apud Hippocratem, ei quem septimus dies libe-
 raturus sit, quartum esse grauissimum. Ita illo
 quoq; autore in die pari & grauior febris esse
 potest, & certa futuri nota. Atq; idem alio loco
 quartum quemq; diem, vt in vtrumq; efficacis-
 simum apprehendit, id est, quartum, septimum,
 vndecimum, quartumdecimum, decimumsepti-
 mum, in quo & ab impari ad paris rationem
 transit: & ne hoc quidem propositum conserua-
 uit, cum à septimo die vndecimus, non quartus,
 sed quintus sit: adeo apparet quacunq; ratione
 ad numerum respeximus, nihil rationis sub illo
 quidem autore reperiri. Verum in his quidē an-
 tiquos tunc celebres admodum Pythagorici nu-
 meri fefellerunt, cum hic quoq; medicus non nu-
 merare dies debeat, sed ipsas accessiones intue-
 ri, & ex his coniectare, quando dandus cibus
 sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire,
 tum ne oporteat dari, cum iam bene venæ con-
 quieuerunt, aut etiam num manentibus reliquijs
 febris. Antiqui enim quàm integerrimis corpo-
 ribus alimentum offerebant. Asclepiades incli-
 nata

d si octa
 s primi
 turā ha-
 t: vnde-
 n^o quar-
 s, non
 intus e-

nata quidem febre, sed adhuc tamen inherente.
 In quo^{*} vanam rationē secutus est, non quò non ^{*} vanam
 sit interdum maturius cibus dandus, si maturè
 timetur altera accessio. sed quò scilicet quàm sa-
 nissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur
 quod integro corpori infertur. Neq; tamen ^{*} ve- ^{*} non va-
 rum est, quod Themisoni videbatur, si duabus num est
 horis integer futurus esset ager, satius esse tunc
 dare, vt ab integro corpore potissimum diduce-
 retur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset
 optimum. Sed cum hoc breue tempus nō præstet,
 satius esse principia cibi à decedente febre quàm
 reliquias ab incipiente excipi, ita, si longius tem-
 pus secundum est, quàm integerrimo dandus
 est: si breue, etiam antequàm ex toto integer fiat.
 Quo loco verò integritas est, eodem est remissio,
^{*} quæ maxime in febre continua potest esse. At ^{*} si qua
 hic quoq; queritur, vtrum tot horæ expectandæ
 sint, quot febrem habuerunt, an satis sit, primam
 partem earum præteriri, vt aegris iucundius in-
 sidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum
 est autem ante totius accessionis tempus præter-
 ire, quamuis vbi longa febris fuit, potest indul-
 geri aegro maturius, dum tamen antè minime
 pars dimidia prætereatur. Idq; non in ea sola fe-
 bre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus
 ita seruandum est.

De febrium speciebus, & singularum curatio-
 nibus: & primò, quando cibus febricitan-
 tibus dandus sit.

CAP. V.

Hæc

HAec magis per omnia genera febrium perpetua sunt, nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desijt, eaq; vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex aestu, alia' ve simili re fuit, sic ut interior nulla causa metum fecerit, postero die cum tempus accessionis ita transijt, ut nihil mouerit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, & grauitas vel capitis vel praecordiorum secuta est, neq; apparet quid corpus confuderit, quamuis vniam accessionem secuta integritas est, tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessionis tempus praeterijt, cibus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoq; timeri potest. Et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia vtendum. Si vero postero, tertio' ve, aut quarto die secuta febris est, scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumq; quarum & certus circuitus est, & finis integer, & quia liberaliter quiescunt tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam. Nunc vero eas explicabo, quae quotidie vrgent. Igitur tertio quoq; die cibus aegro commodissime datur, ut alter febrem minuat, alter viribus subueniat. Sed his dari debet, si quotidiana febris est, quae ex toto desinat, simul atq; corpus integrum factum est. si quamuis non accessiones, febres tamen iunguntur, & quotidie quidem crescunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpus ita se habet, ut maior remissio non expectetur.

Etetur. Si altero die grauior, altero leuior accessio
 est, post grauiorem. Ferè verò grauiorē accessio-
 nem leuior nox sequitur: quò fit, vt grauiorē ac-
 cessionē nox quoq; tristior antecedit. At si con-
 tinuatur febris, neq; leuior vnquā fit, & dari ci-
 bum necesse est, quādo dari debeat, magna quidē
 dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matu-
 tinum tēpus aegris est, tunc putant dandū. Quod
 si respondet, non quia mane est, sed quia remis-
 sio est aegris, dari debet. Si verò ne tunc quidem
 vlla requies aegris est, hoc ipso peius id tempus
 est, quòd cum sua natura melius esse debeat, mor-
 bi vitio non est, simulq; insequitur tēpus meri-
 dianum: à quo cum omnis aeger ferè peior fiat,
 timeri potest, ne ille magis etiam, quā ex con-
 suetudine vrgeatur. Igitur alij vespere tali agro
 cibum dant. Sed cum eo tempore ferè pessimi
 sint, qui egrotant, verendum est, ne si quid tunc
 mouerimus, fiat aliquid asperius. Ob hanc ad me-
 diam noctem decurro, id est finito iam grauissi-
 mo tempore, eodemq; longissimè distante, secu-
 turis verò antelucanis horis, quibus omnes ferè
 maximè dormiunt: deinde matutino tempore,
 quod natura sua leuissimum est. Si verò febres
 vagæ sunt, quia verendum est, ne cibum statim
 subsequantur, quādoq; quis ex accessione
 leuatus est, * tunc debet assumere. At si plures * hunc
 accessiones eodem die veniunt, considerara oport-
 tet, pares'ne per omnia sint, (quod vix fieri po-
 test) an impares. Si per omnia pares sunt, post
 eam

Febres v
gæ.

eam potius accessionem cibis dari debet, quæ non inter meridiem & vespere definit. Si impares sunt, considerandum est, quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est, post grauiorẽ dari debet: si altera longior, altera breuior, post longiorem: si altera grauior, altera longior est, considerandum est, vtra magis affligat, illa vi, an hæc tempore, & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest, quantæ, qualesq; inter eas remissiones sint. Nā si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est: integro corpore, cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est, adeo vt vbi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dandus cibis sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne cõsiliũ dirigi potest, cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere, & hoc saluo, dare quàm integerrimo corpori. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cum sit aptissimum tertio quoq; die cibum dare, tamen si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multoq; magis si continentes febres sine remissione sunt, quanto magis corpus affligunt, aut si due pluresve accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, vt & à primo die protinus cibis dari quotidie debeat. Si protinus venæ conciderunt, & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud
tamen

tamen in his seruandum est, vt post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum verò febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur, scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde cum decessio eius consistit: tertium si necesse est, quandoque decedit, cetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre, quam increscente. Satius esse instante, quam incipiente: cum eo tamen, vt nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque Hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem, seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interueniunt. Cum verò semper agros securos agere conueniat, vt corpore tantum, non etiam animo laborent, tum præcipue, vbi cibum sumpserunt. atque si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt, optimum est, * ea dum agrotant eorum * eadem notitiæ subtrahere. Si id fieri non potest, sustine- agrotant- re tamen post cibum vsque somni tempus, & tium notitiæ sub- cum experrecti sunt, tum exponere.

Quando potiones febricitantibus dari expediat.

CAP. VI.

Sed de cibo facilior quidem cum aegris ratio est, quorum sepe stomachus hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De potione verò in-

gens

gens pugna est, eoq; magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accedit, et tum maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est, ubi febris conquieuerit, protinus sitim quoq; quieturam, longioremq; accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. Ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necessè est tamen quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis ægris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoq; dari debeat. Secundo verò, cæterisq; etiam, quibus cibus non dabitur, tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret, ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet, expedire quoq; per medicas potiones misceri nouam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoq; : ubi sine illo datur, deligantur, aut cum ægrum dormire cupiemus. Quod ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus, nimius humor alienus sit, tum præcipue esse fœminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo potioniq; febris et remissionis ratio det, non est expeditissimū scire quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat. Sine quibus dispensari illa non possunt.

Venatum
pulsus.

Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei, quia sæpe istæ leniores, celeriores'ue sunt, et
atate

etate & sexus, & corporum natura. Et plerunq;
satis sano corpore, si stomachus infirmus est, non-
nunquam etiam incipiente febre subeunt et qui-
escunt, vt imbecillus is videri possit, cui facile
laturo grauis instat accessio. Contra saepe eas
concitatur, & resoluit sol, & balneum, & exerci-
tatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi
affectus, adeo, vt cum primum medicus venit,
solicitude egri dubitantis quomodo ille se habe-
re videatur, e. is moueat. Ob quam caussam peri-
ti medici est, non protinus vt venit apprehendere ^{Officium}
manu brachium, sed primum residere hilari uul- ^{medici.}
tu, percunctariq; quemadmodum se habeat, & si
quis eius metus est, eum probabili sermone leni-
re, tum deinde eius corpori manum admonere.
Quas venas autem conspectus medici mouet,
quam facile mille res turbant. Altera res est, cui
credimus calor, eque fallax. Nam hic quoq; ex-
citatur aestu, labore, somno, metu, solitudine.
Igitur intueri quidem etiam ista oportet. Sed his
non omnia credere, ac protinus quidem scire non
febricitare eum, cuius venae naturaliter ordinatae
sunt, teporq; talis est, qualis esse sanis solet. Non
protinus autē sub calore motuq; febrem sese con-
cipere, sed ita, si summa quoq; arida inaequaliter
cutis est, si calor et in fronte est, & ex*imis prae- *intimi
cordis oritur, si spiritus ex naribus cum feruore
prorumpit, si color aut rubore, aut pallore nouo
mutatus est, si oculi graues, & aut persicci, aut
subhumidi sunt, si sudor cum fit, inaequalis est, si

i 2 vena

venæ non æquis intervallis moventur. Ob quam
causam medicus neq; in tenebris, neq; à capite
egri debet residere, sed illustri loco aduersus eum,
vt omnes notas ex vultu quoq; cubantis perspi-
ciat. Vbi verò febris fuit, atq; decreuit, expectari
oportet, num tēpora, partes ue corporis alie pau-
lum madescant, quæ sudorem venturum esse te-
stentur. Ac si qua nota est, tunc demū dare potui
calidam aquam, cuius salubris effectus est, si su-
dorē per omnia membra diffundit. Huius autem
rei causa continere eger sub veste satis multa
manus debet, eademq; crura, pedesq; contegere,
qua male plerique egros in ipso impetu febris,
pessimeq; vbi ardens ea est, male habent. Si su-
dare corpus cœpit, lintē tepefacere oportet, pau-
latimq; singula membra detergere. At vbi su-
dor omnis finitus est, aut si is nō venit, vbi quàm
maxime potuit, idoneus esse cibo eger videtur,
sub veste leniter vngendus est, tum detergēdus,
deinde ei cibus dandus. Cibus autem febricitan-
tibus humidus est aptissimus, aut humori certe
quàm proximus, utiq; ex materia quàm leuissi-
ma, maximeq; sorbitio, eaq; si magnæ febres fue-
runt, quàm tenuissima esse debet. Mel quoq; de-
spumatum huic rectē adiicitur, quo corpus ma-
gis nutriatur: sed id, si stomachū offendit, super-
uacuum est, sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari verò
in vicem eius potest, vel intrita ex aqua calida,
vel alica elota, si firmus est stomachus: & com-
pressa alius ex aqua mulsa: si vel ille languet,
vel

vel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est: secundo verò aliquid adijci potest, ex eodẽ tamen genere materiae vel olus, vel conchylum, vel pomum. Et dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus est. Vbi verò aut desinunt, aut leuantur, semper quidem incipendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendum verò aliquid ex media, ratione habita subinde & virium hominis & morbi. Ponendi verò egro varij cibi (sicut Asclepiades præcepit) tum demum sunt, vbi fastidio vrgetur, neq; satis vires sufficiunt, vt paulum ex singulis degustando famem vitet. At si neq; vis, neq; cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus aeger est, ne plus assumat, quàm concoquat. Neq; verũ est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos varios: eduntur enim facilius, ad concoctionẽ autem materiae, genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, vt neq; crescente morbo tutũ est aegrũ cibo impleri, sed vbi inclinata iam in melius valetudo est. Sunt aliæ quoq; obseruationes in febribus necessariae, atque id quoq; videndum est, quod quidam solum præcipiunt, an astrictum corpus sit, an profluat: quorũ alterum strangulat quod continet, alterum digerit. Nam si astrictum est, ducenda aluus est, mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest.

dest. Vtile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaq; aqua fouere inguina, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenet, simplici, molli, calido, exiguo, maximeq; oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malua, vel iure etiam concharum, muscutorum ue, aut locustarum, neq; danda caro, nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quam sitis coget. Poteritq; a balneo etiam pinguis aut dulcius dari vinum, poterit semel aut bis interponi Græcum salsum. Contra verò si corpus profluet, sudor coërcendus, quies adhibenda erit, tenebris, somnoq; quandocunq; volet utendum, non nisi leui gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subueniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut uetus morbus est. Si vero sudor exercet, duranda cutis est vel nitro, vel sale, quæ cum oleo miscentur. At si lenius id vitium est, oleo corpus ungendum est: si vehementius, rosa vel melino, vel myrteo, cui vinum austeram sit adiectum. Quisquis autem fluore æger est, cum venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium demittendus est. Si incute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum ventum est, dari

dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quàm minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum asperum, vel certè subausterrum. Si venter profluit, calidum: si sudores nocent, vomitusq; sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

CAP. VII.

DEsiderat etiam propriam animaduersionem in febribus pestilentiae casus. In hanc minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere aluum. Si vires sunt, sanguinem mittere optimum est, præcipueq; si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut leuata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quàm in alijs morbis, ducere in balneum opus est, vinum calidum & meracius dare, & omnia glutinosa. Inter quæ quoque carnem generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate rapienda sunt. Quòd si puer est qui laborat, neq; tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit, siti ei utendum est, ducenda aluus, vel aqua, vel ptisanæ cremore, tum demum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto, non sic pueri, ut viri curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare vigilia, fame ue, aut nimia siti, non uino curare satis conuenit. Vomitus post febrem eliciendus est, deinde

dandus cibus ex leuissimis, tum is dormiat: postero quoque die si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibum redeat. Dandaq; opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosq; opportunos, obmissis ceteris nutriatur. Si verò ardens febris extorret, nulla medicamenti danda potio est, sed in ipsis accessionibus, oleo & aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt donec albescant, & conclauui tenendus, quò multum & purum aërem trahere possit, neq; multis vestimentis strangulandus, sed admodum leuibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia uitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est, alendus maturius est, id est, à die tertio, & ante cibum ipsdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata iam accessione, vomere cogendus est, & tunc dandum frigidum olus, aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum verò in summo incremento morbus est, utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem: & cum iam venter & præcordia ultra modum repleta, satisq; refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatē data pro medicamento vtuntur. Vbi utrumlibet factum est,

est, multa veste operiendus est, & collocandus ut dormiat. Fereq; post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur, idq; presentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non ulcus, non deiectio, non profluvium alui fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leuiter tussit, is neq; vehementi siti conflictatur, neq; bibere aquam frigidam debet, sed eo modo curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertianæ febris, quæ hemitritæos dicitur.

CAP. VIII.

A Trubi id genus tertianæ est, quod hemitritæon Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, decessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horas uigintiquatuor et triginta sex, ut quod idem est, non idem esse uideatur. Et magnopere necessarium est, neq; dari cibum, nisi in ea remissione, quæ uera est: & ubi ea uenit, protinus dari, plurimiq; sub alterutro curantis errore subito moriuntur: ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tum dari cibus, qui neq; incitet febre, & tamen longum eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium

CAP. IX.

Nonnumquam etiam lentæ febres sine ulla
i s remiss

remissione corpus tenent, ac neq; cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sape igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est, quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur, & fiat initium quoddam noui motus, ex q; eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoq; ex oleo & sale salubris uidetur. At si diu frigus est, & torpor, & iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim saepe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercules ista curatio noua est, qua nunc quidam traditos sibi egros (qui sub cautiore medicis trahebantur) interdum contrarijs remedijs sanant. Siquidem apud antiquos quoq; ante Herophilum & Erasistratum, maximeq; post Hippocratem fuit ^{* πέρπω} quidam, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis uestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimq; excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se egro iudicabat: si non mouerat, plus etiam aque frigida ingerebat, & tum uomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillam assam, & uinum homini dabat. Si non liberauerat, decoq

decoquebat aquam sale adiecto, eamq; bibere cogebat, vt mouendo ventrem purgaret. Et intra hæc omnis eius medicina erat. Ea; non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant, quam nunc est his quos Herophili, vel Erasistrati æmuli, diutracos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina, quia plures, si protinus à principijs exceperit, interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint, ferè quos ratio non restituit, temeritas adiuuat. Ideoq; eiusmodi medici melius alienos egros, quam suos nutriunt. Sed est circūstecti quoq; hominis, & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere, quia curationem vbi id quod est non recipit, potest recipere id quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & precordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem lingue.

C A P. X.

Considerandū etiam est febres ne sole sint, an alia his quoque mala accedant: id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intēta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & in id ingerere, deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis longitudinemq; æquent. Ex his inuicem alterum in aceto & rosa habere, alterū in fronte, aut intinctā iisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura rosa vtendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbo: si ista parū iuuant, teri potest
vel

vel iris arida, vel nuces amarae, vel quaelibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuuat etiam panis cum papauere iniectus, vel cum rosa, cerussa, spuma uel argenti. Olfacere quoque vel serpyllum, vel anethum non alienum est. At si in praecordiis inflammatio et dolor est, primo superimponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus eò materiae concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida et humida veniendum est, ut ea quae remanserint, discutiant. Notae verò inflammationis sunt quatuor, rubor et tumor, cum calore et dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum praecordiorum dolor est, protinus calidis et siccis fomentis uti licet. Si verò lingua sicca est, et scabra, detergenda primum penicillo est ex aqua calida. Deinde ungenda mistis inter se rosa et melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deteresa est, ungi rosa debet, cui cera sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem praecedat.

C A P. X I.

Solet etiā ante febres esse frigus, idque vel molestissimum morbi genus est. Vbi id expectatur,

tur, omni potione prohibendus ager est. Hæc enim paulo antè data multum mali adiicit. Item maturius veste multa tegendus est: admouenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta, sic, ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim increcant. Perfri-candæ quoq; eæ partes manibus vnctis ex vete-re oleo sunt, eiq; adiiciendum aliquid ex calefa-cientibus. Contentiq; medici quidã vna frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus, nonnulli tres aut quatuor sorbi-tionis cyathos, etiamnum vltra manente febre, dant. Deinde, ea bene finita, reficiunt stomachũ cibo frigido, & leni. Ego tum hoc puto tentan-dum, cum parum cibus semel, & post febrem datus prodest. Sed curiose perspiciendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis iam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remis-sioni credendũ est, quæ etiam immoratur, & ia-ctationem fætoresq; quendam oris (quem ὄστρον Græci vocant) minuit. Illud satis cõuenit, si quo-tidie pares accessiones sunt, quotidie paruum ci-bum dandum: si impares, post grauiorem ci-bum, post leuiorem, aquam mulsam.

Curatio horrois in febribus. C A P. XII.

Horror autẽ eas ferè febres antecedit, quæ certum habent circuitũ, & ex toto remit-tuntur. Ideoq; tutissimæ sunt* maximè quæ cu-* maxi-rationes admittunt. Nam vbi incerta tempora meq; cur sunt,

sunt, neq; alui ductio, neq; balneum, neq; vinum,
neq; medicamentum aliud recte datur. Incertum
est enim quando febris ventura sit: ita fieri po-
test, ut si subito venerit, summa in eo perniciēs
sit, quod auxilij causa sit inuētum. Nihilq; aliud
fieri potest, quā ut primis diebus bene absti-
neat ager, deinde sub decessu febris eius, quae gra-
uissima est, cibumumat. At ubi certus circui-
tus est, facilius omnia illa tentantur, quia faci-
lius proponere nobis & accessionum & deces-
sionum vices possumus. In his autem cum vete-
rauerunt, utilis fames non est. Primis tantūmo-
do diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda
curatio est, & ante horror, tum febris discuti-
enda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex
horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam

Vomitibus. aquam, subsalsam, & vomere eum cogere. Nam
ferè talis horror ab his oritur, quae biliosa in sto-
macho resederunt. Item faciendū est, si proximo
quoq; circuitu aequè cessit. Sape enim sic discu-
titur. Iamq; quod genus febris sit, scire licet.
Itaq; sub expectatione proximae accessionis, quae
instare tertia potest, deducendus in balneū est,
dandaq; opera est, ut per tempus horroris in so-
lio sit. Si ibi quoq; senserit, nihilominus idem sub
expectatione accessionis quartae faciat, siquidem
eo quoq; modo saepe id discutitur: si nec balneū
quidem profuit, ante accessionē allium edat, aut
bibat calidam aquam cum pipere, siquidem ea
quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem

non

non admittit. Deinde eo modo, quo in frigore præceptum est, antequàm inhorrescere possit, operiatur. Fomentisq; protinus validioribus totum corpus circumdare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis & titionibus. Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur, cui æquè ex calefacientibus aliquid sit adiectum, abhibeaturq; frictio, quantam is sustinere poterit, maximeq; in manibus & pedibus, & spiritum ipse contineat, neque desistendum est etiam si horror est. Sæpe enim pertinacia iuuantis, malum corporis vincit. Si quid euomuit, dāda aqua tepida, iterumq; vomere cogendus est, utendumq; eisdē est, donec horror finiatur. Sed præter hæc, ducenda aluus est, si tardius horror quiescet: siquidem id quoque exonerato corpore prodest. Ultima quoque post hæc auxilia sunt, gestatio & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet, caro glutinosa, vinum cum dabitur austerum.

Curatio quotidianæ febris. C A P. XIII.

Hæc ad omnes circuitus febrium pertinent, discernenda tamen singula sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet, tum cibus altero quoq; die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum & vinum, magisq; si horrore sublato hæc superest.

Curat

SI tertiana verò, quę ex toto intermittit, aut quartana est, medijs diebus & ambulationibus uti oportet, alijsq; exercitationibus & unctionibus. Quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus, in hoc genere morborum, multa ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod quamvis pleraq; eius viri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præterijt. Est enim anceps. Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit alium duci oportere, quinto post horrorem vomitum elicere, deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & vinum. Sexto die in lectulo detineri. Sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse verisimile est. Tutius tamē est ut ipso ordine utamur. Tria remedia, vomitus, alui ductio, vini potus per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare, nec vinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si verò primis diebus discussus morbus non est, inciditq; in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibat aquam: postero die, quo cibo vacat & ab exercitatione unctioneq; aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si verò imbecillitas urgebit, & post febrem vinum, & medio die paulum cibi debeat assumere.

Curat

EAdem in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaquæ desunt, eodem die, & postero tertioquæ continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die post febrē sumere, bi- duo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem. Si quarto die cum horrore febris reuertitur, vomere, sicut antè præceptum est: deinde post febrē modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioquæ die abstinere, aqua tantummodo calida (si sitiet) assumpta: septimo die balneo frigus præuenire, abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitiet: actum ita* septimo die balneo frigus præuenire: si febris *nono redierit, ducere aluum: ubi ex eo corpus coquieverit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, & vinum bi duo proximo se abstinere, frictione seruata: decimo die rursus balneum experiri: & si postea febris accessit, æquè perfricari, vinum copiosius bibere: ac si proximum est, quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrē tollant. Si verò nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus. Idquæ agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quominus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam aluum, k deinde

deinde abstinendum vsq; in septimum diem dixit. Quod vt sustinere aliquis possit, tamē etiam febre liberatus vix refectiōi valebit. Adeo si febris sepius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neq; ante febrem, neque post eam tentandum erit, nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem quae supra praescripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit vngi, & vehementer perfricari, cibum & validum & fortiter assumere, vino vti quantum libebit, postero die cum satis quieuerit, ambulare, exerceri, vngi, perfricari fortiter, cibum accipere sine vino. Tertio die abstinere. Quo die verō febrem expellabit, antē surgere, & exerceri: dareq; operam non oportet, vt in ipsam exercitationē tempus febris incurrat. Sic enim saepe illa discutitur. At si in opere occupauit, tum demum se recipere. In eiusmodi valetudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si vter astrictus est, soluendus est. Sed haec facile validiores faciunt, si imbecillitas occupauit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est: si hac quoque vehemens onerat, intra quietem, & vniōnē, & cibum si solum est, dandaq; opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem iugulat, sed si ex ea facta quotidiana est, in malis ager est. Quod tamē nisi

nunquā culpa vel agri vel curantis nonnunquam fit.

Curatio

Curatio duarum quartanarum. CAP. XVI.

A Tsi due quartanae sunt, neq; hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est, leuiter ambulare, considerare diligenter inuolutis pedibus & capite. Quoties febris accessit et desit, cibum modicum sumere & vinum: reliquo tempore nisi imbecillitas vrget, abstinere. Aut si due febres penè iunguntur, post utranq; cibum sumere. Deinde vacuo tempore & moueri aliquid, & post vñtionē cibo uti. Cum verò vetus quartana raro, nisi vere soluatur, utiq; eo tēpore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediatur. Prodest q; in vetere quartana mutare subinde victus genus, à vino ad aquam, ab aqua ad vinum, à lenibus cibis ad acres, ab acris ad lenes transire, esse radicē, deinde vomere, iurē ue pulli gallinacei ventrem resolvere, oleum ad frictiones adijcere, calefacientia ante accessionē sorbere, vel aceti cyathos duos, vel unum synapis, cum tribus Græci vini salsi, vel mista paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrrham. Per hæc enim similiaq; corpus agitando est: ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius diei conuenit, eoq; vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuertitur, nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

Curatio quotidianæ febris, quæ ex quartana facta sit.

CAP. XVII.

k 2

At

AT si ex quartana quotidiana facta est, cum id vitio inciderit, per biduum abstinere oportet, frictione uti, aquam tantummodo vesperi potui dare, tertio die sepe fit, ne febris accedat, sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus: at si manet, per biduum abstinencia, quanta maxime imperari corpori potest, frictione quotidie utendum est.

De tribus insaniae generibus, & primo de eius curatione, quae à Graecis φρενιτις dicitur.

C A P. XVIII.

ET febriū quidem ratio exposita est. Super sunt verò alij corporis affectus, qui huic superueniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, protinus iungam. Incipiam ab insania, primamq; huius ipsius partem aggrediar, quae & acuta, & in febre est, Graeci φρενιτις appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione egros desipere, & loqui aliena. Quod non quidē leue est, neq; incidere potest, nisi in febre vehemēti, non tamen aequē pestiferum est. Nam plerunq; breue esse consuevit, leuatoq; accessionis impetu, protinus mens redit. Neq; id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre praecceptum est. Phrenitis verò tum demum est, cum continua dementia esse incipit, aut cum aeger quamuis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit: perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt. Siquidē
ex

ex Phreneticis alij hilares, alij tristes sunt, alij
facilius continentur, & intra verba desipiunt,
alij consurgunt, & violenter quædam manu fa-
ciunt: atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu pec-
cant, alij etiam artes adhibent, summamq; spem
sanitatis in captandis maiorum operum occasio-
nibus præbent, sed exitu deprehenduntur. Ex
his autem eos qui intra verba desipiunt, aut le-
uiter etiam manu peccant, onerare asperioribus
coërcitionibus superuacuum est. Eos verò, qui
violentius se gerunt, vincire cōuenit, ne vel alte-
ri vel sibi noceant. Neq; credendum est, si vin-
ctus aliquis, dum leuari vinculis cupit, sanū iam
se fingat, quamuis prudēter & miserabiliter lo-
quatur, quoniam is dolus insauientis est. Ferè
verò antiqui tales ægros in tenebris habebant,
eò quòd eis contrarium esset exterreri, & ad
quietē animi tenebras ipsas conferre aliquid iu-
dicabant. At Asclepiades, tanquā tenebris ipsis
terrentibus, in lumine habendos esse dixit: neu-
trum tamen perpetuum est. Alium enim lux,
alium tenebræ magis turbant, reperiunturq; in
quibus nullum discriminē deprehendi vel hoc, vel
illo modo possit. Optimum itaq; est vtrunq; expe-
riri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce,
eum qui lucem, in tenebris. At vbi nullum tale
discrimen est, æger si vires habet, loco lucido, si
non habet, obscuro cōtinendus est. Remedia verò
adhibere, vbi maxime furor vrget, superuacuum
est: simul enim febris quoque increscit. Itaque

tum nihil nisi continendus ager est. Vbi verò res patitur, festinater subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinē mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quòd neq; insania esset, nisi febre intentā: neq; sanguis, nisi in remissione eius rectè mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictiōe quæ fuit, cum & intentio febris somnū impediāt, & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo rectè fiunt, aliās omittenda. Et cōtinuata quoq; febris habet tempora, quibus etsi non remittit, non tamen crescit. Est q; hoc, ut non optimum, sic tamen secundum remedium genus. Quod si vires ægri patientur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest, an alius ducenda sit, tum interposito die conuenit caput ad cutem tondere, deinde aqua fouere, in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint, vel ex reprimentibus: aut prius fouere, deinde tondere et iterum fouere, ac nouissime rosa caput naresq; implere, offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non desunt. Si verò imbecillitas est, rosa tantum caput, adiecto serpyllo, similiq; aliquo madefaciendum est. Vtiles etiam in quibuscunq; viribus herbe due sunt, Solanum & Iulialis, simul ex vtraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remisserit, frictiōe
 utendum

tempus

LIBER PRIMUS 151
utendum est, parcius tamen in his, qui nimis
hilares, quam in his qui nimis tristes sunt. Ad-
uersus omnium autem sic insanientium animos,
gerere se pro cuiusq; natura necessariū est. Quo-
rundam enim vani metus leuandi sunt, sicut in
homine prædiuite famem timente *accidit, cui *incidit
subinde falsæ hereditates nuntiabantur. Quo-
rundam audacia coercenda est, sicut in his fit, in
quibus continendis plagæ quoque adhibentur.
Quorundam etiam intempestiuus risus & ob-
iurgatione & minis prohibendus est. Quorun-
rundam discutiendæ tristes cogitatiōes, ad quod
symphonie, & cymbala, strepitusq; proficiunt.
Sæpius tamen assentiendum, quam repugnau-
dum est, paulatimq; & non euidenter ab his,
quæ stultè dicuntur, ad meliora mens eius abdu-
cenda est. Interdum etiam elicienda ipsius in-
tentio, ut fit in hominibus studiosis literarum,
quibus liber legitur, aut rectè, si delectantur, aut
perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando
enim, conuertere animum incipiunt. Quinetiam
recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad
cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxe-
runt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt.
Omnibus verò sic affectis, somnus & diffici-
lis, & præcipuè necessarius est. Sub hoc enim
pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad
mentem ipsam componendam, crocinum vi-
nguentum cum irino in caput datum. Si nihilomi-
nus vigilant hi, quidam somnū moliantur, potui

dando aquam, in qua papauer, aut hyoscyamos decocta sit: alij mandragoræ mala puluino subiiciunt, alij vel amomum, vel sycamini lacrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum Græci morum sycaminum appellant, mori nulla lacryma est. Sic verò significatur lacryma arboris in Aegypto nascentis, quam ibi morosycon appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in lethargum saepe * conuerterent. Præcipit autem ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur, vespere ei daretur potui aqua, tunc frictio admoueretur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio* ex aqua, rursusq; frictio adhiberetur. Per aqua hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidē adeo, ut illo confitente nimia frictio etiā lethargi periculū afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoq; necessaria est, ne quē obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnū * Silanus iuxta cadens, vel gestatio post cibum & noctu, maximeq; suspēsi lecti motus. Neq; alienum est, si neq; sanguis antè missus est, neq; mens constat, neq; somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam

* saliens
eorgius
al. Sila-
i pro ri-
expo-
t.

bitulam admouere. Quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda. Nam neq; implendus eger est, ne insaniat, neq; ieiunio utiq; vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeq; sorbitione, portione aquæ mulse, cuius ternos cyathos bis hyeme, quater æstate dedisse satis est. Alterum genus insanie est, quod spatium longius recipit, quia ferè sine febre incipit, leues deinde febriculas excitat, & consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia, secunda per album veratrum vomitumq; purgatio, post utrumlibet adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio. In ieiuno vomitus, cibus sine vino dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari posse, dum ne ea sola quis utatur, valentissima tantummodo esse remouenda. Præter hæc seruanda aliud est quam tenerrima, remouendi terrores, et potius bona spes afferenda, querenda delectatio ex fabulis ludisq;, quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda vana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitant, cur non potius letitiæ, quam sollicitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit, sicut aliæ febres curanda est.

k 5 Tert

Tertium insanie genus est ex his longissimum, adeo ut vitam ipsam non impediat, quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duae sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insanientem Aiacem vel Orestem poetarum fabulae ferunt: quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes an hilares sint. In tristitia nigrum veratrum deiectionis causa, in hilaritate album, ad vomitum excitandum dari debet. Idque si in potione non accepit, pani adijciendum est, quo facilius fallat. Nam si bene se purgauerit, ex magna parte morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum veratrum, parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leuiorem esse morbum cum risu, quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum in omnibus morbis, ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, venter eius ante solvendum esse: ubi a superiore, comprimendum. Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subito etiam terreri et expauescere, in hoc morbo prodest. Et fere quicquid animum vehementer perturbat. Potesť enim quaedam fieri mutatio, cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest

terest etiam si ipse sine caussa subinde rideat, an
mœstus, dimissusq; sit. Nam dementis hilaritas
terroribus his (de quibus supra dixi) melius cu-
ratur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed
multa bis die frictio. Item per caput aqua frigi-
da infusa, demissumq; corpus in aquam & o-
leum. Illa communia sunt, insanientes vellemen-
ter exerceri debere, multa frictioe uti, neq; pin-
guem carnem, neq; vinum assumere, cibis uti
post purgationem ex media materia quam le-
uissimis. Non oportere esse vel solos, vel inter
ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut
negligant, mutare debere regiones, & si mens
redit, annua peregrinatioe esse iactandos. Rarò,
sed aliquando tamen, ex metu delirium nasci-
tur. Quod genus insanientium specie similiq; vi-
ctus genere curandum est, præterquam quod in
hoc insanie genere solo rectè vinum datur.

Cardiaci morbi curatio.

CAP. XIX.

Hic morbo præcipuè contrarium est id ge-
nus, quod Cardiacum à Græcis nomina-
tur, quamvis sæpe ad eum phrenetici transeunt.
Siquidem mens in illis labat, in hoc constat. Id
autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas
corporis, quod stomacho læguente, immodico su-
dore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi
venarum exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor
autem supra consuetudinē, & modo & tempo-
re, ex toto thorace & cervicibus, atq; etiam ca-
pite prorumpit, pedibus tantummodo & cruri-
bus

bus siccioribus atq; frigentibus. At ubi id mor-
bi genus est, curatio prima est, supra præcordia
imponere quæ reprimant cataplasmata: secunda,
sudorem prohibere. Id præstat acerbum oleum
vel rosa, vel melinum aut myrteum. Quorum a-
liquo corpus leuiter perungendum, ceratumq; ex
aliquo horum tum imponendū est. Si sudor vin-
cit, delinendus homo est, vel gypso vel argenti
spuma, vel cimolia creta, vel etiam subinde ho-
rum puluere respergendus. Idem præstat puluis
ex contritis aridi myrti vel rubi folijs, aut ex
austeri, & boni vini arida fece. Pluraq; similia
sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex via
puluis iniectus. Super hæc verò quo minus cor-
pus insudet, leui veste debet esse contactus, loco
non calido, fenestris patentibus, sic, ut perflatus
quoq; aliquis accedat. Tertium auxilium est im-
becillitati iacentis, vino ciboq; succurrere. Cibus
non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die
dandus est, ut nutriat, neq; oneret. Is esse de-
bet ex infirmissima materia, et stomacho aptus.
Nisi autem necesse est, ad uinum festinare non
oportet. Si verendum est ne deficiat, tum & in-
trita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem,
sed tamen tenue meracum. Egelidum subinde et
liberaliter dandum est adiecta polenta, si modo
is æger parum cibi assumit. Idq; vinum esse de-
bet, neq; nullarum viriū, neq; ingentium: recteq;
tota die ac nocte, vel tres heminas æger bibet.
Si vastius corpus est, plus etiam. Si cibum non
accipit,

accipit, perunctum antè perfundere aqua frigida conuenit, & tum dare. Quòd si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum & post eum sponte vomere oportet, rursusq; post vomitum, cibum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaq; hora sumere alterum: si id quoq; stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est. Qui ubi inaruerunt, efficiunt, vt vinum in stomacho contineatur, exq; eo toti corpori calor, venisq; vis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus *indere, siquidem id quoq; vires tuetur. *inijcere. Neq; alienum est, naribus quoq; æstuantis ad-mouere, quod reficiat, id est rosam, & vinum. Et si qua in extremis partibus frigent, vinctis & calidis manibus fouere. Per quæ si consequi potuimus, vt & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse videtur, verendum est tamen, ne ad eandem imbecillitatem citò recidat. Itaq; vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat.

De Lethargo, & eius curatione. CAP. XX.

Alter quoq; morbus est, aliter phrenetico contrarius. In illo difficilis somnus, prompta ad omnem audaciã mens est: at in hoc marcor, & inexpugnabilis penè dormiendi necessitas, (ἡδ᾽ ἀγγος Græcè nominant) atq; id quoq;
 genus

genus acutum est, & nisi succurritur, celeriter
 ingulat. Hos egros quidam subinde excitare ni-
 tuntur, admotis his, per quæ sternutamenta euo-
 untur, & his, quæ odore fædo mouent, qualis est
 pix cruda, lana succida, piper, veratrum, casto-
 reum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galba-
 num incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. Si
 id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum com-
 buruntur, odorem fædum mouent. Tharrius ve-
 rò quidam accessionis esse id malum dixit, leua-
 tur, & cum ea decessit. Itaque eos qui subinde exci-
 tant sine usu, male habere. Interest autem in de-
cessione expergiscatur ager, an cum febris non
leuetur, aut leuata quoque ea somnus urgeat. Nā
 si expergiscitur, adhibere ei ut sopito superua-
 cuum est. Neque enim vigilando melior fit, sed per
se, si melior est, vigilat. Si verò continens ei so-
 mnus est, utique excitandus est, sed his tempori-
 bus quibus febris leuissima est, ut & excernat
 aliquid, & sumat. Excitat autem validissime
 repente aqua frigida infusa post remissionem.
 Itaque perunctum oleo multo corpus tribus aut
 quatuor amphoris totum per caput perfunden-
 dum est. Sed hoc vtemur, si aequalis agro spiri-
 tuserit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt,
 ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod
 ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc
 ratio est. Molendini autem caussa caput raden-
dum, deinde postea fouendum est aqua, in qua
laurus aut ruta decocta sit. Altero die imponen-
 dum

dum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri bacca, aut hederæ cum rosa & aceto. Precipueq; proficit & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti fronti'ue impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; opportune cibus datus, id est in remissione, quanta maxime inueniri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic, ut si quotidie grauis accessio est, hæc quotidie detur. Si alternis, post grauiorem sorbitio, post leuiorem, mulsæ aqua. Vinum quoq; cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. Quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit, cetera eadem seruanda sunt. Ante accessionem autem tribus quatuor'ue horis castoreum (si venter astrictus est) mixtum cum scamonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt, cibus vtendum est plenioribus. Si dura, in iisdem sorbitionibus subsistendum, imponendumq; est præcordijs, quod simul & reprimat, & emolliat.

De Aqua inter cutem, hoc est Hydropico morbo.

C A P. XXI.

SEd hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri potest eorū, quos aqua inter cutem male habet, nisi primis diebus discussus est, ὕδρωρ Græci vocāt. Atq; eius tres species sunt. Nam modò ventre vehementer intento, creber intus ex motu spiritus sonus est. Modò corpus
inequa

inæquale est, tumoribus aliter aliterq; per totum
 id orientibus. Modò intus in vni aqua contra-
 hitur, & moto corpore ita mouetur, vt impetus
 eius conspici possit. Primum τυμπανίτην, se-
 cundū λονοφλεγματίαν vel ὑποσάρκα, ter-
 tium ἀσκήτην Græci nominant. Cōmunis tamen
 omnium est humoris nimia abūdantia, ob quam
 ne vlcera quidē in his ægris facillè sanescunt. Sæ-
 pe verò hoc malū per se incipit. Sæpe alteri ve-
 tusto morbo, maximeq; quartanæ superuenit.
 Facilius in seruis, quàm in liberis tollitur, quia
 cūm desideret famem, sitim, mille alia tædia, lon-
 gamq; patiētiam, promptius his succurritur, qui
 facillè cogūtur, quàm quibus inutilis libertas est.
 Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto si-
 bi temperare non possunt, ad salutem perducun-
 tur. Ideoq; non ignobilis medicus, Chrysippi di-
 scipulus, apud Antigonū regem, amicum quen-
 dam eius notæ intemperantiæ, mediocriter eo
 morbo implicitum negauit posse sanari. Cumq;
 alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum
 polliceretur, respondit illum ad morbum ægri re-
 spicere, se ad animum. Neq; eum res fefellit. Ille
 enim cūm summa diligentia nō medici tantum-
 modo, sed etiam regis custodiretur, tamen ma-
 lagmata sua deuorando, bibendoq; suam vrinam
 in exitium se precipitauit. Inter initia tamen
 non difficilima curatio est, si imperata sunt cor-
 pori, quies, sitis, inedia. At si malum inueteraue-
 rit, non sine magna molestia discutitur. Metro-
 dorum

dorum tamen Epicuri discipulum referunt, cum hoc morbo tentaretur, neque equo animo ferret necessariam sitim, ubi diu abstinerat, bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur quicquid receptum est, multum tadio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoque est, hæc in primis submouenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre aeger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque quæcunque species est, si nondum nimis occupauit, iisdem auxilijs opus est. Multum ambulandum, currendum*aliquando est. Superiores maxime partes sic perfricandæ, ut spiritum ipse contineat, euocandus est sudor non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusq; alijs, maximeq; utiles naturales & sicca sudationes sunt, quales super Baias habemus in myrtetis: balneum atq; omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapotia dantur facta ex absinthij duabus, myrrhæ tertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat, optimaq; est, quæ urinam mouet. Sed id ipsum tamen molliri cibo, quam medicamento melius est. Si tamē res coget,*ex his aliquid, quæ id præstent, erit decoquendum, eaq; aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere iris, nardum, l
crocum,

*aliquid

*ut ex his aliquid detur, præstiter id decoquendum

crocum, cinamum, amomum, cassia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, ænanthe, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, vua tyminia, quàm τὰ φάρμακα ἄγρια Græci nomināt: abrotanum, rosæ folia, acorum, amaræ nuces, tragoriganum, styrax, costum, iunci quadrati, & rotundi semen, illud cyperon, χοῖρον hoc Græci vocant. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen quæ leuissima ex his sunt, id est rosæ folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque vtile est & austerum, sed quàm tenuissimum. Commodum est etiam lino quotidie ventrē metiri, & qua comprehendit alium, notam imponere, postero die videre, si plenius corruptus sit, an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est metiri & potionem eius & urinam. Nam si plus humoris excernitur, quàm assumitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinentia bidui & frictione vsum, tertio die iam & febre & aqua liberato, cibum & vinum dedisse, merita prodidit. Hactenus communiter de omni specie dici potest. Si vehementius malum est, deducenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio & ex ea dolor creber est, vtilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum vomitus est. Fomentis siccis, calidisq; vtendum est. Si per hæc dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitæ.

cucurbitula. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum his utendum. Vltimum auxilium est, si cucurbitula nihil profuerunt, per alium infundere copiose aquam calidam, eamque recipere. Quinetiam quotidie ter quaterue opus est uti frictione vehementi, cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum verò in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat, ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, & seruanda vlcera diutius. Vtiliter etiam scilla cocta delinitur cutis, sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus instantibus. At si id vitium est, cui leucophlegmatias nomen est, eas partes que tumant, subicere soli oportet, sed non nimium, ne febricula incidat: si is vehementior est, caput velandum est, utendumque frictione madefactis tantum manibus aqua, cui sal & nitrum & olei paulum sit adiectum, sic ut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem tota hora, post meridiem semihora fieri oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata, quae reprimunt, maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quatuor fere digitis ex parte interiore, qua per aliquot dies frequens humor feratur, atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque multa gestatione corpus est: atque ubi inducta vulneribus cicatric

catrices sunt, adiiciendum & exercitationibus
est, & cibis, donec corpus ad pristinum habi-
tum reuertatur. Cibus valens esse debet, & glu-
tinofus, maximeq; caro. Vinum (si per stoma-
chum licet) dulcius. Sed ita, vt inuicem biduo
triduo'ue, modò aqua, modò id bibatur. Prodest
etiam lactuca marinæ (quæ grandis iuxta mare
nascitur) semen, cum aqua potui datum. Si va-
lens est qui id accipit, ei scilla cocta (sicut supra
dixi) delinitur. Autoresq; multi sunt inflatis
vesicis pulsandos tumores esse. Si vero id morbi
genus est, quo in vterum multa aqua contrahi-
tur, ambulare, sed magis modicè oportet, ma-
lagma quod digerat impositum habere, idq; ipsum
super imposito triplici panno, fascia non nimium
tamen vehementer astringere. Quod à Tharria
profectum, seruatum esse à pluribus video. Si ie-
cur aut lienem affectum esse manifestum est,
ficum pinguem contusam adiecto melle superpo-
nere. Si per talia auxilia venter non siccatur, sed
humor nihilominus abundat, celeriore via suc-
currere, vt is per uentrem ipsum emittatur. Ne-
que ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi
viam. Morbum enim hunc iocineris putauit.
Ideoq; ita illum esse sanandum, frustra q; aquam
emitti, quæ vitiato illo subinde nascatur. Sed
primū non huius visceris vnus hoc vitium est.
Nam splene affecto, & in totius corporis malo
habitu fit: deinde, vt inde cœperit, tamen aqua
nisi emittitur, quæ contra naturam ibi subsistit,

C

& iocineri & ceteris* interioribus partibus no- * inferi-
cet. Conuenitq; corpus nihilominus esse curandū. ribus
Neque enim sanat emissus humor, sed medicina
locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac
ne illud quidem in controuersiam uenit, quin non
omnes in hoc morbo sic curari possint, sed iuue-
nes robusti, qui vel ex toto carent febre, uel certè
satis liberales intermissione habent. Nam quo-
rum stomachus corruptus est, qui'ne ex atra bile
huc deciderunt, quiq; malum corporis habitū ha-
bent, idonei huic curationi non sunt. Cibus au-
tem quo die primum humor emissus est, superua-
cuus est, nisi si uires desunt. Insequentibus die-
bus & his uinum meracius quidem, sed non ita
multum dari debet, paulatimq; euocandus aeger
est ad exercitationes, frictiones, solem, sudatio-
nes, nauigationes, & idoneos cibos, donec ex to-
to conualeseat. Balneum rarum res amat, fre-
quentiorem in ieiunio vomitum. Si aestas est, in
mare natare commodum est. Vbi conualuit ali-
quis, diu tamen alienus ei ueneris usus est.

De Tabes, & eius speciebus, & curatio-
nibus.

C A P. XXII.

Dutius saepe et periculosius Tabes eos ma-
le habet, quos inuasit. Atq; huius quoque
plures species sunt. Vna est, qua corpus non ali-
tur, & naturaliter semper aliquibus decedenti-
bus, nullis verò in eorū locū subeuntibus, summa
macies oritur, & nisi occurritur, tollit: ἀρπο-
πίαρ hanc Graeci vocant. Ea duabus fere de
l 3 causis

causis incidere consuevit. Aut enim nimio timore aliquis minus, aut auaritia nimia plus quam debet, assumit: ita vel quod deest, infirmat: vel quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam Græci *καχεξία* appellant, ubi malus corporis habitus est, ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Quod serè fit, cum longo morbo vitata corpora, etiam si illo vacant, refectioem tamen non accipiunt, aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu necessaria desuerunt, aut cum inusitados et inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidue simile incidit. Huic præter tabem illud quoque nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas aut vlcera summa cutis exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longeque periculosissima species, quam Græci *φθίσις* nominauerunt. Oritur serè a capite, inde in pulmonem destillat: huic exulceratio accedit, ex hac febricula leuis fit, quæ etiam cum quieuit, tamen et repetit. Frequens tussis est, pus excreatur, interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaque qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hæc genera tabis sint, animaduertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantummodo non ali corpus apparet, causam eius attendere: et si cibi minus aliquis quam debet, assumit, adyccere, sed paulatim, ne si corpus insuetum, subita multitudine onerauerit, concoctionem impediat. Si verò
plus

plus iusto quis assumere solitus est, abstinere vno die, deinde ab exiguo cibo incipere, quotidie ad-
iungere, donec ad iustum modum perueniat. Præter
hæc conuenit ambulare locis quàm minime frigi-
dis, sole vitato, per manus quoq; exerceri. Si in-
firmior est, gestari, vngi, perfricari, si potest, ma-
ximè per seipsum, sæpius eodem die, & ante ci-
bum & post eum sic, vt interdum oleo quedam
adijciantur calefaciētia, donec insudet. Prodestq;
ieiuno prehendere per multas partes cutem, &
attrahere, vt relaxetur, aut imposita resina &
abducta subinde idem facere. Vtile est etiam in-
terdum balneum, sed post cibum exiguum. Atq;
in ipso solio recte cibi aliquid assumitur, aut si
sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi verò
esse debent ex his, qui facile concoquuntur, qui
maxime alunt. Ergo vini quoq;, sed austeri ne-
cessarius vsus est, mouenda vrina. At si malus
corporis habitus est, primū abstinendum est, de-
inde aluus ducēda, tum paulatim cibi dandi, ad-
iectis exercitationibus, vnctionibus, frictioni-
bus. Vtilius his frequens balneum est, sed ieiunis
etiam vsq; ad sudorē. Cibus verò opus est copio-
sis, varijs, boni succi, quiq; etiam minus facile
corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua pro-
ficiunt, sanguis mittendus est, sed paulatim quo-
tidieq; pluribus diebus, cum eo, vt cætera quoq;
eodem modo seruentur. Quod si mali plus est, &
vera phthisis est, inter initia protinus occurrere
necessarium est. Neq; enim facile is morbus cum

inueterauerit, euincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa nauigatione, cœli mutatione, sic, ut densius quam id est, ex quo discedit aeger, petatur. Ideoq; aptissimè Alexandriam ex Italia itur. Fereq; id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus etate firmissima maximè oriatur, id est ab anno duodecimo ad annū quintum & trigessimum. Si id imbecillitas non finit, naue tamen non longe gestari commodissimum est. Si nauigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus dimouendum est, tum à negotijs abstinentum est, omnibusq; rebus, quæ sollicitare animum possunt, somno indulgendum, cauendæ destillationes, ne si quid cura leuaret, exasperent, & ob id vitanda cruditas, simulq; sol & frigus. Os obtegendum, fauces velandæ, tussicula suis remedijs finienda, et quàm diu quidem febricula incurSAT, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuus cibus medendum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcordia tument, siue biliosa vrina est, siue sanguis fluxit, pro veneno est, in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusq; febribus, rectè dari potest. Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit, recurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idq; ipsum ex aceto, vel
ex

ex eodem intubus, ocymum, lactuca. Dein lenis, ut sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adiecto. Idem oryza quoque, & si nihil aliud est, far præstat. Tum inuicem, modò his cibis, modò illis vtendum est. Adijciendaq; quedam ex media materia, præcipueq; vel ex aprugna, cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum seuo ouillo, caprino'ue mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet lene, austerum. Hactenus non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neq; febricula neq; tussis quiescit, tenuariq; corpus apparet, validioribus auxilijs opus est. Exulcerandus est ferro candenti, vno loco sub mēto, altero in gutture, duobus ad mammam vtranq;, itē sub imis ossibus scapulari (qui *ὠμοπλάτας* Græci vocant) sic, ne sanescere vlcera sinamus, nisi tussis finita. Cui per se quoque mendendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterq; die vehementer extremæ partes perfricandæ, thorax leui manu pertractandus, post cibum intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est eger in solium, in quo sit aqua calida, & oleum: cæteris diebus bibenda aqua, tum & vinum: si tussis non est potui frigidum dandum: si æstas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus quotidie dari, frictiones, gestationesq; similiter adhiberi: itemq; acria quarto aut quin-^{*}cadeno die sumere, interdum herbam sanguinalē acria

l 5 ex

ex aceto vel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, vel plantaginis succus per se, vel mar-
rubium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus
sorbeatur, huius cochleare plenum paulatim de-
lingatur, uel inter se mista & incocta resina te-
rebinthina pars dimidia, butyri & mellis pars
altera. Precipua tamen ex his omnibus sunt vi-
etus, vehiculum, & naus, & sorbitio. Aluus
cita utique vitanda est. Vomitus in hoc morbo
si frequens est, perniciosus est, maximeq; san-
guinis. Qui meliusculus esse coepit, adijcere de-
bet exercitationes, frictiones, cibos deinde, ipse
se, suppresso spiritu, perfricare, diu abstinere a
vino, balneo, venere.

De Comitialis morbi curationibus. C. A. XXIII.

INter notissimos morbos est etiam is, qui Co-
mitialis, vel maior nominatur. Homo subito
concidit, ex ore spuma mouentur, deinde inter-
posito tempore ad se redit, & per seipsum con-
surgit. Id genus saepius viros quam faeminas
occupat, ac solet quidem etiam longum esse, usq;
ad mortis diem, & vita non periculosum. Inter-
dum tamen cum recens est, hominem consumit,
& sepe eum, si remedia non sustulerunt, in pue-
ris veneris, in puellis menstruorum initium tollit:
modo cum distentione membrorum aut neruo-
rum prolabitur aliquis, modo sine illa quidem.
Hos quoque iisdem, quibus lethargicos excitare
conantur, quod admodum superuacuum est, &
quia ne lethargicus quidem his sanatur, & quia
cum

cum possit iste nunquam expurgisci, atq; ita fame interire, hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique sanguis mitti debet. Si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium autem est ducere aluum, vel nigro veratro purgare, vel utrunq; facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoq; & aceto perungere, cibum post diem tertium, simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neque sorbitiones autem his, alijq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit, sed medicamentis. Nam & viribus opus est, & cruditates cauenda sunt, cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaq; calefacientia: item, frigus, vinum, venerem, loci præcipitis conspectum, omniumq; terrentium, vomitum, lassitudinem, solitudines, negotia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quæque eadem hora cibi seruata, donec quatuordecim dies transeant. Quos ubi morbus excessit, acuti vim deposuit. At si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is qui cadere consuevit, ei traditus est, protinus eo genere victus*habito, qui supra comprehensus est, expectandus est dies, quo prolabor, utendumq; tum vel sanguinis missione, vel ductione alui, vel nigro veratro, sicut præceptum est. Insequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui, vita-

*dabitur

tia

tis omnibus, quæ cauenda dixi, nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit, cōfugiendum erit ad album veratrum, ac ter quoq; aut quater eo vtendum, non ita multis interpositis diebus: sic tamen, ne iterum unquā sumat, nisi conciderit. Medijs autē diebus vires eius erūt nutriendæ, quibusdam, præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi manē expectatus est, corpus eius leuiter ex oleo vetere, cum capite (excepto ventre) permulceatur, tum ambulatione quā maxime longa & recta vtatur: post ambulationem loco tepido vehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur, paulum cibi assumat, conquiescat, rursus ante noctem ambulatione vtatur, iterum vehementer perfricetur, sic vt neque venter, neque caput contingatur, post hæc cænet, interpositisq; tribus aut quatuor diebus, vno aut altero acria assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radatur, vngatur oleo vetere, adiecto aceto & nitro, perfundatur aqua salsa, bibat ieiunus ex aqua castoreum, nulla aqua nisi decocta potionis causa vtatur.* Quidam iugulati gladiatoris calido sanguine epoto, tali morbo sese liberarunt. Apud quos miserum auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicum verò pertinet, vltimum est iuxtatalum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere, occipitium incidere, & cucurbitulas admonere, ferro candēte
in

in occipitio quoq; & infrà, quâ summa verte-
bra cum capite committitur, adurere duobus lo-
cis, vt per ea perniciosus humor euadat. Quibus
si finitum malum non fuerit, propè est, vt perpe-
tuum sit. Ad leuandum id tantummodo vtendum
erit exercitatione multa, frictione, cibisq; his, qui
suprà comprehensi sunt, præcipueq; vitanda o-
mnia, quæ ne fierent, excepimus.

De Regii morbi curatione. CAP. XXIIII.

AEquè notus est morbus, quem interdum
Arquatum, interdum Regium nominant,
Quem Hippocrates ait, si post septimum diem fe-
bricitante ægro superuenit, tutum esse, mollibus
tantummodo præcordijs substatibus. Diocles ex
toto, si post febrem oritur etiam prodesse: si post
hunc febris, occidere. Color autem eum morbum
detegit maxime oculorum, in quibus quod al-
bum esse debet, fit luteum. Soletq; accedere &
sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, &
præcordiorum dextra parte durities et vbi cor-
poris vehemens motus est, spiritus difficultas,
membrorumq; resolutio, atq; vbi diutius manet
morbus, totum corpus cum pallore quodâ inal-
bescit. Primo die abstinere ægrum oportet, secun-
do ducere aluum, tum si febris est, eam victus ge-
nere discutere. Si non est, scamoneam potui dare,
vel cum aqua betam albam contritam, vel cum
aqua mulsa nuces amaras, absynthium, anisum,
sic, vt pars huius minima sit. Asclepiades aquâ
quoq; salsam, & quidem per biduum purgatio-

nis

nis caussa bibere cogebat, ijs quæ urinā mouent reiectis. Quidā superioribus omiſſis, per hæc & per eos cibos, qui extenuant, idem ſe conſequi dicunt. Ego ubiq; ſi ſatis virium eſt, validiora, ſi parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, poſt eam triduo, primo modicè cibum oportet aſſumere ex media materia, & vinum bibere græcum, ſaluſum, vt reſolutio ventris maneat, tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoq; aliquid eſſe, intra aquā manere, deinde ad ſuperius genus victus reuerti, cum eo, vt magis ſatietur, omiſſo græco vino, bibere integrū aſterum: atq; ita per hæc variare, vt interdum acres quoq; cibos interponat, interdum ad ſaluſum vinum redeat. Per omne verò tempus vt edum eſt exercitatione, frictione, ſi hyems eſt, balneo, ſi æſtas, frigidis nationibus, lecto etiam & conclau cultiore clauſo loco vti, ludis, laſciuiis, per quæ mens exhilaretur. Ob quæ regius morbus dictus videtur. Malagma quoque quod digerat, ſuper præcordia datum prodeſt, vel arida ibi ſicus impoſita, ſi iecur aut lienis affectus eſt.

De Elephantia curatione. C A P. XXV.

Innotus autem penè in Italia, frequentiſſimus in quibuſdā regionibus iſ morbus eſt, quem *ελεφαντία* Græci vocant, iſq; longis annumeratur. Totum corpus afficitur, ita vt oſſa quoq; vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebroſq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa
cutis

175
cutis inequaliter crassa, tenuis, dura, mollisq;
quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus
emacrescit, os, surae, pedes intumescunt. Vbi ve-
tus morbus est, digiti in manibus pedibusq; sub
tumore conduntur, febricula oritur, quae facile
tot malis obrutum hominem consumit. Protinus
ergo inter initia sanguis per biduum mitti de-
bet, aut nigro veratro venter solui, adhibenda
tum quanta sustineri potest, inedia est, paulum
deinde vires reficienda, & ducenda aluus: post
haec, ubi corpus leuatum est, vtendum est exer-
citatione, praecipueq; cursu, sudor primum labore
ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus
euocandus, frictio adhibenda, moderandumq;
inter haec, vt vires conseruentur, balneum ra-
rum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine gluti-
nosis, sine inflantibus. Vinum praeter quam pri-
mis diebus, recte datur. Corpus contrita planta-
go, & illita, tueri optime videtur.

De Attonitis, & eorum curatione. C A P. XXVI.

Attonitos quoq; raro videmus, quorum &
corpus & mens stupet. Fit interdum ictu
fulminis, interdum morbo, ἀποπληξία hunc
Graeci appellant. His sanguis mittendus est. Ve-
ratro quoque albo, vel alui ductione vtendum.
Tum adhibenda frictiones, & ex media mate-
ria minime pingues cibi, quidam etiam acres,
& à vino abstinentium.

De resolutione neruorum, quae Apoplexia vel
παραλυσις dicitur.

C A P. XXVII.

At

AT resolutio neruorum, frequens ubiq; mor-
 bus est. Sed interdum tota corpora, inter-
 dum partes infestat. Veteres autores illud Ἀπο-
 πλεξίαρ, hoc Paralyfin nominauerunt. Nunc
 utrūq; Paralyfin appellari video. Solent autem
 qui per omnia membra vehemēter resoluti sunt,
 celeriter rapi, ac si correcti non sunt, diutius qui-
 dem viuunt, sed rarò tamen ad sanitatem perue-
 niunt, & plerunq; miserum spiritum trahunt,
 memoria quoq; amissa. In partibus verò nunquā
 acutus, saepe longus, ferè sanabilis morbus est. Si
 omnia membra vehemēter resoluta sunt, sangui-
 nis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud cu-
 rationis genus, vix vnquam sanitatem restituit,
 saepe mortem tantum differt, vitam interim in-
 festat. Post sanguinis missionē, si non redit, &
 motus & mens, nihil spei superest. Si redit, sa-
 nitas quoque prospicitur. At vbi pars resoluta
 prouidet est, *proderit malo corporis, vel sanguis missus,
 vel alius ducta. Cetera eadem in utroq; casu fa-
 cienda sunt. Siquidem vitare praecipue conuenit
 frigus, paulatimq; ad exercitationes reuertendū
 est, sic, vt ingrediatur ipse protinus, si potest. Si
 id crurum imbecillitas prohibet, vel gestetur,
 vel motu lecti concutiatur, tum id membrum,
 quod deficiet, si potest, per se: si minus, per
 alium moueatur, et vi quadam ad consuetudinē
 torpenti suam redeat. Prodest etiam *torpenti membrū
 ius mem summam cutem exasperasse, vel vrticis casam,
 ris vel imposito sinapi, sic vt vbi rubere cæperit
 corpus,

corpus, hæc remoueantur. Scilla quoq; contrita, bulbiq; contriti cum thure rectè imponuntur. Neq; alienum est, resina cutem tertio quoque die diutius vellere, pluribus etiam locis, aliquando sine ferro cucurbitulas admouere. Vnctioni verò aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto & oleo mistum. Quinetiam fouere aqua calida marina, vel si ea non est, tamen salsa magnopere necessarium est. At si quo loco vel naturales, vel etiam manu factæ tales natationes sunt, ijs potissimū vtendum est, præcipueq; in his agitando membra, quæ maxime deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeq; ex venatione: potio sine vino aquæ calidæ. Si tamen vetus morbus est, interponi, quarto vel quinto die purgationis causa vinum Græcū, salsum prodest. Post cœnā utilis vomitus est. Interdum verò etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet vomere, non medicamentis vrinā mouere, non sine exercitatione sudores, vt quidā præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento spiritu, ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ, balneo raro vtendam, mutandum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est, deinde inuoluenda, & subiicienda pruna lenis, & sulphur, atq; ita id suffumigandum, idq; aliquandiu faciendum. Sed ieiuno, cum bene

*impedi-
tur

iam concoxerit, cucurbitula quoque sepe dolenti
parti admouenda sunt, pulsandusq; leuiter infla-
tis vesicis bubulis is locus est. Vtile est etiam se-
uum miscere cum hyoscyami & vrtica contri-
tis seminibus, sic, ut omnium par modus sit, idq;
imponere, fouere aqua, in qua sulphur decoctum
sit. Vtriculi quoque recte imponuntur aqua ca-
lida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina
mixtum, atque in ipso potissimum dolore uten-
dum gestatione vehementi est, quod in alijs do-
loribus pessimum est. Tremor autem nervorum
aque vomitu, medicamentisq; urinam mouen-
tibus * intenditur. Inimica etiam habet balnea,
assasq; sudationes. Bibenda aqua est, acri am-
bulatione utendum, item vntionibus, frictioni-
busq; maxime per seipsum, pila, similibusq; su-
periores partes dimouende, cibo quolibet uten-
dum, dummodo concoctioni utique studeatur.
Secundum cibum curis abstinendum. Rarissima
venere utendum est. Si quando quis in eam pro-
lapsus est, tum oleo leuiter diuq; in lectulo per-
fricari manibus puerilibus potius, quam viri-
libus debet. Suppurationes autem, quae in ali-
qua interiori parte oriuntur, ubi notae fuerint,
primum id agere oportet per ea cataplasmata
quae reprimunt, ne coitus inutilis materiae fiat.
Deinde, si haec victa sunt, per ea malagmata
quae digerunt, dissipentur. Quod si consecuti non
sumus, sequitur ut euocetur, deinde ut mature-
scat, omnis tunc vomicae finis est, ut rumpatur.
Indic

Indiciūq; est, pus vel aluo, vel ore redditum: sed nihil facere oportet, quominus quicquid est puris excedat. Utendum maxime sorbitionibus est & aqua calida. Vbi pus fieri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores et frigidos cibos, frigidamq; aquam, sic ut ab egelidis tamē initium fiat, primoq; cum melle quædam edenda, ut nuclei pinei, vel Græcæ nuges, vel auellane. Postea submouendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore vlceri est succus assumptus, vel porri, vel marrubij, & omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus, quæ non afficiuntur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandūq; erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescantia. Vlcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo cauendus sanguinis vomitus est.

LIBER IIII.

De humani corporis interioribus sedibus.

CAP. I.



ACTENVS reperiantur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut q̄s certæ sedes assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi curationesq; in noti-

m 2

tiam

tiam venient, si prius eorum sedes breuiter ostendero. Caput igitur eaq; quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, palatoq; terminantur, sed etiã quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraq; circa guttur venæ grandes, quæ opharyngiales nominantur, itemq; arteriæ (quæ parotidas vocant) sursum procedentes ultra aures feruntur. Atq; in ipsis cervicibus glandula posita sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt. Alterum asperam arteriam nominant, alterum stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: Stomachus interior ad ventriculi fertur. Illa spiritum, hic cibum recipit: à quibus cum diuersæ viæ sint, quæ coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est, quæ cum spiramus attollitur, cum cibum potioneq; assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura, & cartilaginosa in gutture assurgit, cæteris partibus residet. Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem earum vertebrarum, quæ in spina sunt: ita tamen, ut ex parte exteriori aspera, ex interiori stomachi modo leuis sit, eaq; descendens ad præcordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoq; spiritus capax & à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras ungule bubulæ modo, diuiditur. Huic cor annexum est, natura musculosum in pectore, sub sinistro mamma situm, duosq; quasi ventriculos habet. At sub corde atq; pulmone transversum ex valida membrana septum est, quod à præ-

Stomach⁹
hic pro
sa gula ac
ipitur, ut
& infra li
ro 4. cap.
quamuis
liquando
e pro ven
riculi par
e inferio
i stoma
hivocabu
o vratur
cellus, ut
um ait,
tomach⁹
erò inte
linorū præ
ipau est.

à præcordijs vterum diducit equò neruosum,
 multis etiam venis per id discurrentibus à su-
 periore parte, non solum intestina, sed iecur quo-
 que lienemq; discernit. Hæc viscera proxima,
 sed infrà tamen posita dextra sinistraq; sunt. Ie-
 cur à dextra parte sub præcordijs ab ipso septo
 ortum, intrinsecus cauum, extrinsecus gibbum,
 quod prominens leuiter ventriculo insidet, &
 in quatuor fibras diuiditur. Ex inferiore ve-
 ro parte ei fel inhaeret, at lienis sinistra non ei-
 dem septo, sed intestino innexus est, natura
 mollis & rarus, longitudinis, crassitudinisq;
 modicæ, isq; paulum à costarum regione in vte-
 rum excedens ex maxima parte sub his condi-
 tur, atque hæc quidem iuncta sunt. Renes. Renes verò
 diuersi, qui lumbis sub imis coxis inhaerent à par-
 te earum resimi, ab altera rotundi, qui & venosi
 sunt, & vetriculos habent, & tunicis super con-
 teguntur. Ac viscerum quidem hæc sedes sunt.
 Stomachus verò, qui intestinorum principium Stoma-
chus. est, neruosus a septima spinæ vertebra incipit,
 ac circa præcordia, cum ventriculo committi-
 tur. Ventricu-
lus. Ventriculus autem, qui receptaculum ci-
 bi est, constat ex duobus tergoribus, isq; inter
 lienem & iecur positus est, utroque ex his pau-
 lum super eum ingrediente. Suntq; etiam mem-
 branula tenues, per quas inter se tria ista con-
 nectuntur, iungunturq; ei septo, quod transuersum
 esse supra posui. Inde ima ventriculi pars pau-
 lum in dexteriore partem conuersa, in summum

intestinum coarctatur. Hanc iuncturam πυλῶγον
Græci vocant, quoniam portæ modo in inferio-
res partes, ea quæ excreturi sumus, emittit. Ab
iejunū in- *ea iejunum intestinum incipit, non ita impli-*
testinum. *citum: cui tale vocabulum est, quia nunquam*
quod accipit, continet: sed protinus in inferiores
partes transmittit. Inde tenue intestinum est, in
tenue in- *sinus vehementer implicitum. Orbes verò eius*
ostinum. *per membranulas singuli cum inferioribus con-*
nectuntur, qui in dexteriores partē conuersi, et
è regione dexteroris coxæ finiti, superiores ta-
men partes magis complent. Deinde id intesti-
num cum crassiore altero transuerso cōmittitur,
quod à dextra parte incipiens, in sinisteriore
peruium & longum est, in dexteriores non est,
cæcum in- *ideoq; cæcum nominatur. Ad id quod peruium*
estinum. *est, late fūsum atq; sinuatum, minusq; quàm su-*
priora intestina nervosum, ab vtraq; parte huc
atq; illuc volutū, magis tamen sinisteriores infe-
riorēsq; partes tenens, contingit iecur atq; ven-
triculum. Deinde cū quibusdam membranulis à
sinistro rene venientibus iungitur, atq; hinc de-
xtra recurvatum in imo dirigitur quā excernit,
reētū in- *ideoq; id ibi rectum intestinū nominatur. Con-*
estinum. *tegit verò vniuersa hæc omentum ex *interiore*
omentū. *parte leue & stricturn, ex superiore mollius. Cui*
**inferiore* *adeps quoq; innascitur, quæ sensu, sicut cerebrū*
quoq; & medulla, caret. At à rebus singulæ
venæ colore albæ ad vesicam feruntur, & guttū x̄s
Græci vocant, quod per eas inde descendentem
vrinam

urinam in vesicam destillare concipiunt. Vesica
 autem in ipso sinu nervosa & duplex, ceruice
 plena atq; carnosae, iungitur per venas cum in-
 testino, eoq; osse, quod pubi subest. Ipsa soluta
 atq; liberior est, aliter in viris atq; in foeminis
 posita. Nam in viris iuxta rectum intestinum est
 potius in sinistram partem inclinata. In foemi-
 nis super genitale earum posita est, superq; elapsa
 ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis iter
 urinae spatiosius, & compressius à ceruice hu-
 ius descendit ad colem. In foeminis brevius &
 plenius super vulvae ceruicem se ostendit. Vulva
 autem in virginibus quidem admodum exigua
 est. In mulieribus vero, nisi ubi grauidae sunt,
 non multo maior, quam ut manu comprehenda-
 tur. Ea recta continuataq; ceruice (quem cana-
 lem vocant) contra mediam aluum orsa, inde
 paulum ad dexteriores coxas conuertitur, de-
 inde super rectum intestinum progressa illius
 foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia in-
 ter coxas & pubem imo ventre posita sunt, à
 quibus ac pube abdomen sursum versus ad pre-
 cordia pervenit, ab exteriori parte evidenti cu-
 te, ab interiori levi membrana inclusum, quae
 omento iungitur, *περιτόναι* & autem à Grae-
 cis nominatur.

Canalis.

De curationibus morborum, qui nascuntur à
 capite: & primò de eius dolore, deinde de mor-
 bo, qui circa faciem nascitur, tum de linguae re-
 solutione, postremò de destillatione, ac graue-
 dine.

CAP. II.

m 4

His

HIs veluti in conspectum quendam (quatenus scire curanti necessarium est) adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite: sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentiū dolor, & si quis similis est, aliās erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quem νεφελία Greci vocant. Cuius notæ sunt horror calidus, nervorum resolutio, oculorū caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur, vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maximè circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neq; grauis, neq; periculosa, per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed brevis, neq; tamen mortiferus, qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole cōtrahitur. Hiq; omnes dolores modò in febre, modò sine hac sunt, modò in toto capite, modò in parte, interdū sic, ut oris quoq; proximam partē excrucient. Præter hæc etiam unū inuenitur genus, quod potest longum esse, ubi humor cutem inflat, eaq; intumescit, & prementi digito cedit, ὀδονέφαλον Greci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum dixi, cum persequerer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberēt. Quæ verò auxilia sint capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco
 explici

explicitum est, quo februm curatio exposita est.
Nunc de ceteris dicendum: Ex quibus id quod
acutum est, & id quod supra consuetudinem in-
tenditur, idq; quod ex subita causa, etsi non pe-
stiferum, tamen vehemens est, primam curatio-
nem habet qua sanguis mittatur. Sed id, nisi in-
tolerabilis est dolor, superuacuum est. Satiusq; est
abstinere à cibo, si fieri potest, etiam à potione.
Si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor
remanet, aluum ducere, sternutamenta euocare,
nihil assumere, nisi aquam. Sæpe enim dies unus
aut alter totum dolorem hac ratione discutit,
vtiq; si ex vino vel cruditate origo est. Si verò
in his auxilij parum est, tonderi oportet ad cu-
tem: deinde considerandum est, quæ causa dolo-
rem excitarit: si calor, aqua frigida multa per-
fundere caput expedit, spongiam concavam im-
ponere subinde in aqua frigida expressam, vn-
gere rosa & aceto, vel potius his tinctam lanam
succidam imponere, aliaq; refrigerantia cata-
plasmata. Ac si frigus nocuit, caput oportet per-
fundere aqua calida maritima, vel certè salsa,
aut in qua laurus decocta sit, tum caput vehe-
menter perfricare, deinde calido oleo implere,
veste velare. Quidam etiam id deuinciunt. Alij
cervicalibus vestimentisq; onerant, & sic leuan-
tur, alios calida cataplasmata adiuuant. Ergo e-
tiam vbi causa incognita est, videre oportet,
refrigerantia magis, an calefacientia leniant,
& his vti, quæ experimentum approbarit. At si

Aqua fri-
gida.

m s parum

parum caussa discernitur, perfundere caput pri-
mum aqua calida, sicut supra præceptum est, vel
falsa, vel ex lauro decocta, tñ frigida posca. Illa
in omni vetusto capitis dolore communia sunt,
sternutamenta excitare, inferiores partes vehe-
menter perfricare, gargari & are his, quæ salinã
mouent, cucurbitulis temporibus & occipitio
admouere, sanguinem ex naribus detrahare, re-
sina subinde tempora peruellere, & imposito si-
napi exulcerare ea quæ male habent, antè lin-
teolo subiecto, ne vehementer arrodant: candenti-
bus ferramentis ubi dolor est, vlcera excitare,
cibum per modicum cum aqua sumere: ubi leua-
tus est dolor in balneũ ire, ibi multa aqua prius
calida, deinde frigida per caput perfundi. Si
discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum re-
uerti, sed postea semper antequam quicquam a-
liud, aquam bibere. Dissimile est id genus quod
humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad
cutem necessarium est. Deinde imponere sinapi,
profluit sic vt exulceret. Si id parum *profluit, scalpello
vtendum est. Illa cñ hydropicis communia sunt,
vt exerceatur, insudet, vehementer perfricetur,
cibis, potionibusq; vtatur, vrinam præcipue mo-
uentibus.

De morbo qui circa faciem nascitur, quem
Græci κυνικόν σπασμόν vocant.

Circa faciem verò morbus innascitur, quem
Græci κυνικόν σπασμόν nominant. Is cñ
acuta ferè febre oritur. Os cñ motu quodam per-
uertitur,

uertitur, ideoq; nihil aliud est, quam distentio
oris. Accedit crebra coloris in facie totoq; corpo-
re mutatio. Somnus in proptu est. In hoc sangui-
nem mittere, optimum est. Si finitum eo malum
non est, ducere alium: si ne sic quidem discussum
est, albo veratro vomitum mouere: præter hæc
necessarium est vitare solem, lassitudinem, vi-
num. Sed si discussum his non est, vtendum est
cursu, frictione, in eo quod læsum est, leni &
multa, in reliquis partibus breuiore, sed vehe-
menti: prodest etiam mouere sternutamenta, ca-
put radere, idq; perfundere aqua calida, vel ma-
rina, vel certè salsa, sic vt ei quoq; sulphur adij-
ciatur. post perfusionem iterum perfricari, sina-
pi māducare, eodemq; tempore affectis oris par-
tibus ceratum, integris idem sinapi, donec ar-
rodat, imponere. Cibus aptissimus ex media ma-
teria est.

De resolutione linguæ.

AT si lingua resoluta est, quòd interdum per-
se, interdū ex morbo aliquo fit, sic vt ser-
mo hominis non explicetur, oportet gargari & are
ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel
nepeta decocta sit, aquam bibere, caput & os et
ea quæ sub mento sunt, & ceruicem vehemen-
ter perfricare, lasere linguā ipsam linere, man-
ducare quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium,
cepam, magna vi luctari, vt verba exprimantur,
exerceri retento spiritu, caput sape aqua fri-
gida perfundere, nonnunquam multam esse ra-
diculam,

diculam, deinde vomere.

De Destillatione ac Grauedine.

Destillat autē humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdū etiam in pulmonem quod pessimum est. Si in nares destillat, tenuis per has pituita profluit, caput leuiter dolet, grauitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet. Si in pulmonem, prater sternutamenta & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, aestus, biliosa vrina. Aliud autem (quamuis non multum distans malum) Grauedo est. Hac nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam mouet, sub eadem salsa est salina, sonant aures: venae mouentur in capite, turbida vrina est. Hac omnia nos ὀφθαλμοὶ Hippocrates nominat. Nunc video apud Grecos in grauedine hoc nomen seruari, destillationes νᾶταρ ἀγυρᾶς appellari. Hac autem & breuia, & si neglecta sunt, longa esse consueuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonē exulcerauit. Vbi aliquid eiusmodi sensimus, protinus abstinere à sole, balneo, vino, venere debemus. Inter quae vinctioe, & assueto cibo nihilominus vti licet, ambulatione tantum accri, sed tecta vtendū est, & post eam caput atq; os supra quinquagies perfricandū. Raroq; fit, vt si biduo, vel certe triduo nobis temperauimus, id vitium non leuetur. Quo leuato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in grauedine nares
magis

magis patent, balneo vtendum est, multaq; aqua prius calida, post egelida fouendum os, caputq; deinde cū cibo pleniore vinum bibendum. At si aequè tenuis die quarto pituita est, vel nares aequè clausae videntur, assumendum est, vinum amineum, austerum, deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum & ad cōsuetudinem reuertendum est. Neq; tamē illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tanquā egros agere, sed cetera omnia quasi sanis facienda sunt, praterquam si diutius aliquē & vehementius ista sollicitare cōsueuerunt. Huic enim quædā curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillauit, prater ea quæ supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricanda vehementer inferiores partes, leuior frictio adhibenda thoraci erit, leuior capiti, demēda assueto cibo pars dimidia, sumenda oua, amyllum, similiaq; quæ pituitā faciunt crassiorē. Siti quanta maxime sustineri potest, pugnandum est. Vbi per hæc idaneus aliquis balneo factus, eoq; usus est, adyiciendus est cibo pisciculus, aut caro, sic tamen ne protinus iustus modus cibi sumatur. Vino meraco copiosius vtendum est. At si in pulmone quoq; destillat, multoq; magis & ambulatione, & frictione opus est, eademq; adhibita ratione in cibo, si nō satis illi proficiunt, acrioribus vtendum est, magis somno indulgendū, abstinentūq; a negotijs omnibus aliquādo, sed serius, & balneū tentandum.

dum. In grauedine autem primo die quiescere, neq; esse, neq; bibere, caput relare, fauces lana circumdare, postero die surgere, diu abstinere à potione, aut si res coegerit, non ultra heminam * tam aquæ assumere. Tertio die panis non* ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel leni carne sumere, aquam bibere. Si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, vomere. Vbi in balneum ventus est, multa aqua calida caput & os fouere vsq; ad sudorē, tum ad vinū redire: post quæ vix fieri potest, ut idem incōmodum maneat. Sed si manserit, utendū erit cibis frigidis, aridis, lenibus, humore quā minimo, seruatis frictionibus, exercitationibusq; quæ in omni tali genere valetudinis necessarie sunt.

De cervicis morbis, curationibusq; CAP. III.

A Capite transitus ad cervicē est, quæ grauius admodum morbis obnoxia est. Neq; tamen alius importunior, acutiorq; morbus est, quā is qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori annectit, modo rectam & immobilem cervicem intendit. Priorem Græci ὀπιοδόσσορον, insequentem ἐμπεδοδόσσορον, ultimū τέτανον appellant, quamuis minus subtiliter, quidā indiscretis his nominibus utuntur. Ea sæpe intra quartum diem tollunt. Si hunc euaserunt sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur, idq; conuenit. Sed Asclepiades utiq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam vitandum esse dixerunt, eò quod maxime
tum

tum corpus calore egeret, isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat, sed ex his, quæ in homine sunt, is celerrime vel calefcit, vel refrigescit. Mitti verò nec ne debeat, ex his intelligi potest quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtiq; autè recte datur castoreum, & cum hoc piper vel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa ceruices subinde persundunt. Id in præsentia leuat, sed opportuniore nervos frigore reddit. Quod utiq; vitandum est. Utilius igitur est cerato liquido primum ceruicem perungere, deinde admoovere vesicas bubulas, vel utriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum fico contusum. Utilissimum tamè est humido sale fouere. Quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, admoovere ad ignem, vel si æstus est, in sole, ægrum oportet, maximeq; oleo vetere, si id non est, syriaco, si ne id quidem est, adipe quàm vetustissima ceruicem, & scapulas, & spinas perfricare. Frictio cum omnibus in homine vertebis utilis sit, tum ijs præcipuè, quæ in collo sunt. Ergo die nocteq; interpositis tamè quibusdam temporibus, hoc remedio vtendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cauendū verò præcipuè frigus. Ideoq; in eo conclavi, in quo cubabit æger, ignis continuus esse debet, maximeq; tempore

tempore antelucano, quo præcipue frigus intenditur. Neq; inutile erit, caput attonsum habere, idq; irino vel cyprino calido madefacere, & superimposito pileo velare, nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam, in qua fœnum græcum decoctum sit, et adiecta olei pars tertia. Alius quoq; ducta sæpe superiores partes resoluit. Si verò etiam vehementius dolor creuit, admoenda ceruicibus cucurbitule sunt, sic, vt cutis incidatur, eadem aut ferramentis, aut sinapi adurenda. Vbi leuatus est dolor, moueriq; ceruix cœpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus vtendum, itemq; ouis sorbilibus, aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamq; ex toto recte se habere ceruices videbuntur, incipiendum erit à pulticula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quàm vinum gustandum. Siquidem huius vsus præcipue periculosus, ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus, & primum de Angina, deinde de Difficultate spirandi, vltimo de Tussi. CAP. IIII.

VT hoc autem morbi genus circa totam ceruicem, sic alteru æquè pestiferu acutumq; in faucibus esse consuevit. Nostri Anginam vocant, apud Græcos nomen prout species est. Interdum enim neq; rubor, neq; tumor vllus apparet,

ret, sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra soluuntur, id σωμα ὄχλω vocant. Interdum lingua faucesq; cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusq; est, id ὤς σωμα ὄχλω vocatur. Illa communia sunt, aeger non cibum deuorare, non potionem potest, spiritus eius includitur. Lenius est, ubi tumor tantummodo, & rubor est, cetera non sequuntur, id παρασωμα ὄχλω appellant. Quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est, si non abundat, secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; rectè sub mento, & circa fauces admouetur, vt id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. Nam sicca spiritum elidunt. Ergo admouere spongias oportet, quæ melius in calidum oleum, quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, vel nepeta, vel thymum, vel absinthium, vel etiam fursures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere, eaq; gargarizare: post hæc, palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est, polline etiam piperis id rectè respergitur. Si per hæc parum proficitur, vltimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato citra vnam, vel eas venas, quæ sub lingua sunt, vt per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non fuerit aeger adiutus, scire licet, malo victum esse. Si verò his morbus lenatus est, iamq; fauces, &

n cibum

cibum et spiritum capiunt, facilis ad bonam va-
letudinē recursus est. At interdum natura quoq;
adiuuat, si ex angustiore sede vitium transit in
latiorē. Itaq; rubore & tumore in praeordijs or-
to, scire licet fauces liberari. Quicquid autē eas
leuauit, incipiendum est ab humidis, maximeq;
aqua mulsa decocta, deinde assumēdi molles &
non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum
habitum reuertantur. Vulgò audio, si quis pullum
hirundinis ederit, angina toto anno non pericli-
tari, seruatumq; eum ex sale, cum is morbus vr-
get, comburi, carbonemq; eius contritū in aquam
mulsam (quae potui datur) infricari, & pro-
desse. Id cum idoneos autores ex populo habeat,
neq; habere quicquam periculi possit, quamuis in
monumentis medicorum non legerim, tamen in-
serendum huic operi meo credidi.

De difficultate spirandi.

Est etiam circa fauces malum, quod apud
Graecos aliud atq; aliud nomē habet, prout
se intendit. Omne in difficultate spirandi con-
sistit. Sed haec dum modica est, neq; ex toto stran-
gulat, *διωστροία* appellatur. Cum vehementior
est, ut spirare ager sine sono & anhelatione non
possit, *ἀσθμα*. Cum accessit id quoq;, ne nisi re-
cta cervice spiritus trahatur, *ὀρθόστροία*. Ex qui-
bus id, quod primum est, potest diutius trahi.
Duo in sequentia acuta esse consuevit. His com-
munia sunt, quod propter angustias, per quas
spiritus euadit, sibilum elidit, dolor in pectore
praeord

præcordijsq; est, interdum etiam in scapulis, isq;
 modò decidit, modò reuertitur, ad hæc tussicula
 accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet in
 sanguinis detractiōe. Neq; id satis est, sed lacte
 quoq; venter soluendus est. Liquanda alius, in-
 terdum etiam ducenda, quibus extenuatum cor-
 pus incipit spiritum trahere commodius. Caput
 autē etiam in lecto sublime habēdum est, thorax
 fomentis, cataplasmatissq; calidis, aut siccis, aut
 etiam humidis adiuuandus est, et postea vel ma-
 lagma superimponendum, vel certe ceratum ex
 cyprino vel irino vnguento. Sumenda deinde ie-
 iuno potui malsa aqua, cum qua uel hyssopus co-
 cta, vel contrita capparis radix sit. Datur etiam
 vtiliter, aut nitrum, aut nasturtium, allium fri-
 ctum, deinde contritū & cum melle mistum, si-
 mulq; coquantur mel, galbanum, resina terebin-
 thina, & vbi coierunt, ex his quod fabæ magni-
 tudinem habet, quotidie sub lingua liquatur, aut
 sulphuris ignem non experti *pondo et quadrās, * pond
 abrotani pondo in vini cyatho teruntur, idq; te- denarij
 pefactum sorbetur. Est etiam non vana opinio quadrans
 vulpinum iecur, vbi siccum & aridum factum abrotani
 est, contundi oportere, polentamq; ex eo potioni pōdo den-
 aspergi, vel eiusdem pulmonem quā recentissi- rij in vin
 mum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse.
 Præter hæc sorbitionibus, & lenibus cibis vten-
 dum est, interdum vino tenui austero, nonnun-
 quam vomitu. Prosunt etiam quacunq; urinam
 augent, sed nihil magis quā ambulatio lenta
 n 2 penò

penè vsq; ad lassitudinem, frictio multa, præcipue inferiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, & per seipsum, & per alios, vsq; ad sudorē. In interiore verò faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis vtuntur. Volunt etiam vaporem calidum ore recipi, per quem molliores alij partes eas fieri dicunt, opportunioreq; vitio iam hærenti. Sed si bene sic vitari morbus potest, tanta illa præsidia. Si metus eius est, superuacua sunt. Vtiq; autē perfricare fauces periculosum est: exulcerat enim, neq; vtilia sunt, quæ vrinae mouendæ sunt apta, quia possunt dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare, quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoq; secuti sumus, auctor bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorbendū: hoc enim sine ulla noxa comprimere ulcera. Sed id suppressere sanguinem potest, vlcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei lycium est, quod idem quoq; æquè probat, uel porri, uel marubij succus, vel nuces Græcæ cum tragacantho contrite, & cum passo mistæ, vel lini semē contritum, & cum dulci vino mistum. Exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi verò esse debent, neq; nimium acres, neq; asperi, mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis quoq; caro, præcipueq; porrum, & quicquid cum hoc mistum est. Potionis quammini-

mum

num esse conuenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua mala cydoneum, palmulaeue decoctae sunt. Gargarizationes quoque lenes: sin ha parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum, curationem tamen maturam, ne vehementer & diu laedat, desiderat.

De Tussi.

Tussis verò ferè propter faucium exulcerationem molestà est, quae multis modis contrahitur. Itaque illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere, & vix cum vetus facta est eliditur, ac modò arida est, modò pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoq; die bibere, spiritu retento currere, sed minime in puluere, ac lectione uti vehementi, quae primo impeditur à tussi, post eam vincit, tum ambulare, deinde per manus quoq; exerceri, & pectus diu perfricare. Post hæc quàm pinguis-
sima ficus uncias tres supra prunas incoctas, esse. Præter hæc si humida est, prosunt frictiones validæ, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoq; siccum vehementer perfricetur. Item cucurbitulae pectori admotæ, sinapi ex parte exteriori faucibus impositum, donec leuiter exulceret, potio ex menta, nucibusq; Græcis & amylo, primoq; assumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea vehementissime vrget, adiuvat vini austeri cyathus assumptus, dum ne amplius id interposito
n 3 temp

tempore aliquo, quàm ter aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum deuorare opus est, porri vel marrubij succum assumere, scillam delingere, acetum ex ea, vel certe acre sorbere, aut cum spica allij contriti duos vini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, vt malua, vt vrtica: interdum acer, vt lac cum allio coctum, sorbitiones quibus laser sit adiectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit, ouum sorbile sulphure adiecto, potus primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hæc, alijs vinum. Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem expuit. Sed id modò minus, modò plus periculi habet. Exit enim modò ex gingiuis, modò ex ore, & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine vlcere, sine gingiuarum vllò vitio, ita vt nihil excreetur. Verum vt ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Numquam autem is à summis faucibus fertur, modò exulcerata ea parte, modò non exulcerata, sed aut ore venæ alicuius adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex his sanguine erumpente. Quod vbi incidit, neque ledit potio aut cibus, neq; quicquam aut ex vlcere excreatur. Aliquando gutture & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, vt aut ex pulmone, aut

LIBER XI. 199
ex pectore, aut ex latere, aut iocinore feratur.
Sæpe scæminæ, quibus sanguis per menstrua non
respondet, hunc expuunt, autoresq; medici fue-
runt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire,
vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacto. Pri-
mam ἀιχρόρροιν, secundam ἐρυθρόρροιν, ter-
tiam αἰματόμικτον appellant. Ultima minimè no-
cet, prima grauissimè. Ac sæpe quidem euenit,
vti sanguinem pus sequatur: interdum autem
qui sanguinem ipsam suppressit, satis ad valetu-
dinem profuit. Sed si secuta vlcera sunt, si pus,
si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & pe-
riculosa genera morborum sunt. Si verò sanguis
tantum fluit, expeditius & remedium & finis
est. Neq; ignorari oportet, eis quibus fluere san-
guis solet, aut quibus spina dolet, coxæ'ue, aut
post cursum vehementem vel ambulationem,
dum febris absit, non esse inutile sanguinis me-
diocre profluuium, idq; per vrinam redditum,
ipsam quoque lassitudinem soluere. Ac ne in eo
quidem terribile esse, qui ex superiore loco deci-
dit: si tamen in eius vrina nihil nouabit. Neq;
vomitum huius asferre periculum, etiam cum re-
petit, si antè confirmare & implere corpus li-
cuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore
robusto, neque nimius est, neque tussim aut ca-
lorem mouet. Hæc pertinent ad vniuersum. Nunc
ad ea loca quæ proposui veniam. Si ex gingi-
ui exit, portulacam manducasse satis est: si ex
ore, continuasse eo merum vinum: si id parum
n 4 profic

proficit, acetum: si inter hæc quoque graviter erumpit (quia consumere hominem potest) commodissimum est, impetum eius admota occipitio cucurbitula, sic ut cutis quoque incidatur, auertere. Si id mulieri, cui menstrua non feruntur, euenit, eandem cucurbitulam incisus inguinibus eius admouere. At si ex faucibus, interioribusue partibus processit, & metus maior est, & cura maior adhibenda: sanguis mittendus est, & si nihilominus ex ore processit, iterum tertioq; & quotidie paulum aliquid, protinus autem debet sorbere vel acetum, vel etiam cum thure plantaginis aut porri succum, imponendaq; extrinsecus supra id quod dolet lanna succida ex aceto est, & id sponsia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque & femora, brachiaq; pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe commode respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est, sed sat est infra inguina & super talos, summosq; humeros, etiam brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio, & potui aqua, in qua aliquid ex his quæ aluum astringunt, decoctum sit: ac si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ouum dari potest potui vel idem quod supra scriptum est, vel vinum dulce, vel aqua frigida, sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo sitim prodesse: præter hæc
necessar

necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublime esse debet, re-
 cleq; tondetur. Facies saepe aqua frigida fouen-
 da est. At inimica sunt vinum, balneum, ve-
 nus, in cibo oleum, acriora omnia, item calida
 fomenta, conclaue calidum & inclusum, multa
 vestimenta corpori iniecta, etiam fricationes,
 ubi bene etiam sanguis conquieuit. Tum verò in-
 cipiendum est à brachijs, cruribusq; à thorace
 abstinentum. In hoc casu per hyemem locis ma-
 ritimis, per astatem mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus.

C A P. V.

Faucibus subest stomachus, in quo plura
 longa vitia incidere consuerunt. Nam mo-
 dō ingens calor, modō inflatio hunc, modō in-
 flammatio, modō exulceratio afficit. Interdum
 pituita, interdum bilis oritur, frequentissimumq;
 est eius malum, quo resoluitur, neq; vlla re ma-
 gis aut afficitur, aut corpus afficit. Vt diuersa
 autem vitia eius, sic etiam remedia sunt. Vbi
 exaestuatur, aceto cum rosa extrinsecus subinde fo-
 uendus est, imponendusq; pulvis cum oleo, &
 ea cataplasmata, quae simul & reprimunt, &
 molliunt. Potui (nisi quid obstat) gelida aqua
 praestanda. Si inflatio est, prosunt admotae cu-
 curbitulae: neq; incidere cutem necesse est: pro-
 sunt sicca & calida fomenta, sed non vehemen-
 tissima. Interponenda abstinentia est. Vtilis in
 ieiunio potio est absinthij aut hyssopi aut rutae.

Exercitatio primò lenis, deinde maior adhibenda est, maximeq; quæ superiores partes moueat. Quod genus in omnibus stomachi vitijs aptissimum est. Post exercitationem opus est vñctione, frictione, balneo quoque nonnunquam, sed rarius, interdum alui ductione. Cibis deinde calidis, neque instantibus, eodemq; modo calidis portionibus, primò aquæ, post, vbi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitijs præcipiendum est, vt quo modo se quisque ager refecerit, eo vt sanus vtatur. Nam reddit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defendatur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam ferè tumor & dolor sequitur, prima sunt quies & abstinencia, lana sulphurata circumdata, in ieiunio absinthium. Si ardor stomachum vrget, aceto cum rosa subinde fouendus est, deinde cibis quidem vtendum est modicis. Imponenda verò extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde his detractis, vtendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ reliquias digerant. Interdum aluius ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acria atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci: aut si id inflat, certe leni vtendum, sed neq; præfrig

præfrigido, neque nimis calido. Si verò pituita stomachus impletur, necessarius modò in ieiunio, modò post cibum vomitus est. Vtilis exercitatio, gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumq; nisi calidum, vitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consuerunt. Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus hanc (& quidem quod pessimum est) atram vomere. His rectè aluus ducitur, potiones ex absinthio dantur: necessaria gestatio, nauigatio, & (si fieri potest) ex nausea vomitus, vitanda cruditas, sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austerum. Vulgatissimum verò pessimumq; stomachi vitium est resolutio, id est cum cibi non tenax est, soletq; desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones exercitationesq; superioris partis necessariae. Item vnctiones, frictionesq; hinc perfundi frigida, atque in eadem natare, canalibus eiusdem subijcere etiam stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis, id quod contra stomachum est. Consistere in frigidis, medicatisq; fontibus, quales cutiliarum *subcutiliarumq; sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquuntur, quàm facile vitiantur. Ergo plebrique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neque auem, neq; venationem, neque piscem dari debere, nisi gen

*Symbria

narumq;

De aqua

cutilijs, Pl

nius lib. 2

cap 25. ite

lib. 31 ca. 2

& 6. de iſc

dem & Vi

truu^o lib

8 cap. 1.

si generis durioris. Potui quidem aptissimum est
vinum frigidum, vel certè bene calidum mera-
cum, potissimum rheticum, vel allobrogicum,
aliud'ue, quod & austerum & resina conditum
est: si id non est, quàm asperrimum, maximeq;
signinum. Si cibus non continetur, danda aqua,
& eliciendus plenior vomitus est, iterumq;
dandus cibus, & tum admouendæ duobus in-
tra stomachum digitis cucurbitula, ibiq; duabus
aut tribus horis continendæ sunt. Si simul &
vomitibus & dolor est, imponenda supra stoma-
chum est lana succida, vel spongia ex aceto, vel
cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda verò
non diu, sed vehementer brachia, & crura, &
calescienda. Si plus doloris est, infra praeor-
dia quatuor digitis cucurbitula vtendum est,
protinus dandus panis ex posca frigida. Si non
continuit, post vomitum lene aliquid ex his,
quæ non aliena stomacho sint. Si ne id quidẽ te-
nuit, singuli cyathi vini singulis interpositis ho-
ris, donec stomachus consistat. Valens etiam me-
dicamentum est radiculæ succus, valentius aci-
di punici mali, cum pari modo succi, qui ex dul-
ci punico malo est, adiecto etiam intubi succo &
menta, sed huius minima parte, quibus tantun-
dem, quantum in his omnibus est, aquæ frigida
quamoptime miscetur. Id enim plus quàm vi-
num ad comprimendum stomachum potest, sup-
primendus autem vomitus est, qui per se venit,
sic, si nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut
comp

computruit, quorum vtrumlibet ructus ostendit, eijciendus est, protinusq; cibis assumptis iisdem quos proxime posui, stomachus restituendus. Vbi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est, quae supra praecepta sunt.

De laterum doloribus.

CAP. VI.

Stomachus lateribus cingitur, atque in his quoq; vehementes dolores esse consuerunt, & initium vel ex frigore, vel ex ictu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est. Sed interdum id malum intra dolorem est, isq; modo tardè, modo celeriter soluitur: interdum ad perniciem quoq; procedit, oriturq; acutus morbus, qui pleuriticus à Gracis nominatur. Huic dolori lateris febris, & tussis accedit, & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est, pituita: si grauis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quae nihil emollitur. Idq; primo vitio grauius, secundo tolerabilius est. Remedium verò est magni & recentis doloris, sanguis missus. At siue lenior, siue vetustior casus est, vel superuacuum, vel serum id auxilium est, confugiendumq; ad cucurbitulas est, antè summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec vlcera pustulasq; excitet, & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circumdare primum oportet latus ipsum lana sulphurata: deinde cum paulum, inflammatio se remittit, siccis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet, nouissimè
resina

resina imposita discutitur. Utendum cibis, potio-
nibusq; calidis, vitandū frigus. Inter hæc tamen
non alienum, & extremas partes oleo & sul-
phure perfricare. Sileuata tussis est, leni lectione
vti, iamq; & acres cibos, & vinum meracius
assumere. Quæ à medicis precipiuntur, vt tamē
sine his, rusticos nostros epota ex aqua herba tri-
xago satis adiuuet. Hæc in omni lateris dolore
communia sunt, plus negotij est, si acutus quo-
que morbus is factus est. In hoc præter ea quæ
suprà posita sunt, hæc animaduertenda sunt, vt
cibus sit quammaxime tenuis & lenis, præci-
pueq; sorbitio, eaq; ex ptisana potissimum, aut
ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus
sit. Idq; non nisi tertio quoq; die detur, si tamen
per vires licebit: potio verò aqua mulsa, in qua
hyssopum aut ruta decocta sit. Quæ quibus tem-
poribus danda sint, ex ratione vel adiecta, vel
leuata febris apparebit, sic, vt in remissione
quàm maxima dent, cum eo tamen, vt sciamus
non esse eius generis tussi aridas fauces commit-
tendas. Sæpe enim, vbi nihil est quod excrea-
tur, cōtinuatur, & strangulat. Ob quam causam
dixi etiam peius id genus esse tussis, quod nihil,
quàm quod pituitam moueret. Sed hic vinum
forbere, vt suprà præcepimus, morbus ipse non
patitur, in vicem eius cremor ptisanæ sumendus
est. Vt his autē in ipso morbi feruore sustinendus
eger est, sic vbi paulū is se remisit, alimenta ple-
niora & vini quoq; aliquid dari potest, dum
nihil

nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione quoque manserit tussis, intermittere oportebit vno die, posteroque, cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum (ut supra quoque positum est) vini cyathos sorbere. Sed in hoc genere valetudinis dulce, vel certe lene commodius est. Si malum inueteravit, athletico victu corpus firmandum est.

De viscerum morbis, & primo de Pulmone,
deinde de Iocinore, tum de Liene, postremo de Renibus.

CAP. VII.

A Compagine verò corporis ad viscera trans-
eundum est, & in primis ad pulmonem
veniendum, ex quo vehemens & acutus mor-
bus oritur, quem peripneumonicon Græci vo-
cant. Eius hæc conditio est. Pulmo totus affici-
tur, hunc eius casum subsequetur tussis, bilem vel
pus trahens, precordiorum, totiusque pectoris
grauitas, spiritus difficultas, magnæ febres,
continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id ge-
nus morbi plus periculi, quam doloris habet.
Oportet, si satis validæ vires sunt, sanguinem
mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro præ-
cordiis admouere. Tum si satis valet, gestando
agrum, digerere: si parum, intra domum ta-
men dimouere. Potionem autem hyssopi dare,
cui ficus arida sit decocta, aut aquam mulsam,
in qua vel hyssopum vel ruta decocta sit. Fri-
ctione uti diutissima in scapulis, proximè ab his
in brach

in brachijs, & pedibus, & cruribus, leuiter contra pulmonem, idq; bis quotidie facere. Quod ad cibum verò pertinet, huic nec salsis opus est, neq; acribus, neq; amaris, neq; aluum astringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac sorbile ouum, nuclei pinei ex melle, panis, vel elota alicæ, ex aqua mulsa: potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida: aut si æstas est, etiam frigida, nisi quid obstat. Hæc autem altero quoq; die incrementum morbo dare satis est. Vbi in incremento constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires defunt, adiuuandæ sunt aqua mulsa, prosuntq; aduersus dolores imposita calida fomenta, vel quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mistus, quia leuiter cutem erodit, eoq; impetum materiæ, quo pulmo vexatur, euocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex his quæ materiam trahunt. Neque alienum est dum premit morbus, clausis fenestris agrum continere. Vbi paulum leuatus est, ter aut quater die, fenestris aliquanto apertis, paruum aërem recipere. Deinde in refectione pluribus diebus à vino abstinere, gestatione, frictioe uti, oris: uel, sorbitionibus, & prioribus cibis adycere, ex yruunc- oleribus porrum, ex carne ungulas, & summa* trunculorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil

nihil molle & lene sumatur.

De iocinoris morbo, & curatione. CAP. VIII.

Alterius quoque visceris morbus, id est, iocinoris æquè modò longus, modò acutus esse consuevit, ἰππατίνδου Græci vocāt. Dextra parte sub præcordijs vehemens dolor est, idemque ad latus dextrum, et ad iugulum, humerumque partis eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoque dextra torquetur, horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur, interdum singultus propè strangulat. Et hæc quidem acuti morbi signa sunt: longioris verò, vbi suppuratio in iocinore est, dolorque modo finitur, modò intenditur: dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quedam resolutio, vbi inueterauit malum, venter & crura pedesque intumescunt, pectus atque humeri, circaque iugulum vtrunque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est, tum venter soluendus est: si non potest aliter, per nigrum veratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant, deinde calida quæ deducant, quibus rectè iris vel absinthium adijcitur, post hæc malagma. Dandæ verò sorbitiones sunt, omnesque cibi & calidi, & qui non multum alant, & ferè qui pulmonis quoque dolori conueniunt, præterque eos qui vrinam mouent, potionesque ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satireia, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri bacca, pini flos, herba

o sanguin

sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columba iecur recens & crudum. Ex quibus quaedam per se esse, quaedam adyccere vel sorbitioni, vel potioni licet, sic tamen ut parca assumentur. Neq; alienum est absynthium cōtritum ex melle, & pipere, eiusq; catapotium quotidie deuorare: abstinendum utiq; est ab omnibus frigidis: neq; enim res vlla magis iecur lēdit. Frictionibus vtendum in extremis partibus, vitandus omnis labor, omnis vehementior motus, ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ictus, cursus, inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida: si aestas, tepida. Item liberalis vnctio, & in balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quae in ceteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id scalpello aperiunt, ipsam uomicam adurunt.

De lienis morbo, & curatione. C A P. I X.

AT lienis ubi affectus est, intumescit, simulq; cum eo pars sinistra, eaq; dura est, & prementi renititur, uenter intentus est, aliquis etiam cruribus est tumor. Ulcera aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem uix recipiunt. In intenta ambulatione, cursuq; dolor, & quaedam difficultas est. Hoc uitium quies auget. Itaque exercitatione & labore opus est, habita tamen ratione, ne febre mista, si nimium processerit, excitetur. Vnctiones, frictionesq;, & sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt.

sunt. Item lac & caseus. Acida autem maxime
conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, &
magis etiam, quod scilla conditum est, expedit.
Edenda sunt falsamenta: uel olea ex muria dura
tincta in aceto lactuca, intubiq; & beta ex eo-
dem, ex sinapi asparagus, armoracia, pastina-
ca, ungula, rostra, aues macra, eiusdem generis
uenatio. Potui uero ieiuno dari debet absynthii
incoctum, at post cibum aqua à ferrario fabro,
in qua candens ferrum subinde tintum sit.
Hæc enim uel præcipue lienem coërcet: quod
animaduersum est in his animalibus, quæ apud
hos fabros educata, exiguos lienes habent. Po-
test etiam dari uinum tenue, austerum, omniaq;
in cibis & potionibus quibus urinx mouendæ
sunt, præcipueq; ad id ualet, uel trifolij semen,
uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel cythusus
uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hys-
sopum, uel satureia. Hæc enim inde commodis-
simè uidentur humorem deducere. Lienis quo-
que bubulus utiliter esui datur: præcipueq; eru-
ca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda
quoq; extrinsecus sunt, quæ leuēt. Fit ex unguen-
to & palmulis, quod $\mu\upsilon\gamma\omicron\beta\acute{\alpha}\lambda\alpha\upsilon\omicron\upsilon$ Græci uo-
cant. Fit ex lini & nasturtij semine, quo uinum
& oleum adijcitur. Fit ex cupresso uiridi, &
arida ficu. Fit ex sinapi, cui semi hircini à reni-
bus quarta pars ponderis adijcitur, teriturq; in
sale, et protinus imponitur. Multisq; modis huic
rei capparum aptum est. Nam & ipsum cum ci-

bo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum fursuribus, aut ipsum cappari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

De renum morbis, & curationibus. C A P. X.

AT renes ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquiescere, cubare molliter, solvere aluum, si aliter non respondet, etiam ducere: saepe desiderare in aqua calida, neque cibum, neque potionem frigidam assumere, abstinere ab omnibus salsis, acris, acidis pomis, bibere liberaliter, adijcere modò cibo, modò potioni piper, porrum, ferulam, album papauer. Quae maxime inde urinam mouere consuerunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc vlcera purganda sunt, cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinu syluestri duodecim, anisi, quod tribus digitis sumi possit, croci paulum, contrita, & in duas mulsi potiones diuisa. Si verò dolor tantum leuandus est, eiusdem cucumeris semina triginta, ydem nuclei viginti, nuges Graecae quinque, croci paululum, contrita & cum lacte super Ele potui data, * ac insuper quoque recte quaedam malagmata iniiciuntur, maximeque ea, quae humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de Cholera.

C A P. XI.

A visc

A Visceribus ad intestina veniendum est, quæ sunt & acutis, & longis morbis obnoxia. Primò aquæ faciendæ mentio est cholera, quia commune id stomachi, atq; intestinorum vitium videri potest. Nam simul & deiectio, & vomitus est, præterq; hæc inflatio est, intestina torquentur, bilis suprà infraq; erumpit, primum aquæ similis, deinde vt in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquã nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc χολέρα Græci nominarunt. Præter ea verò quæ suprà cōprehensa sunt, sæpe etiam crura manusq; contrahuntur, vrget sitis, anima deficit: quibus concurrentibus non mirum est, si subito quis moritur. Neq; tamen vlli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo vbi ista cæperunt, aquæ tepidæ quàm plurimum bibere oportet, & vomere. Vix vnquam sine vomitu sequitur, sed etiam si non incidit, miscuisse tamen nouam materiam corruptæ prodest, parsq; sanitatis est vomitum esse suppressum: si id incidit, protinus ab omni potione abstinentum est. Si verò tormina sunt, oportet frigidis, & humidis fomentis stomachum fouere: sed si venter dolet, iisdem egelidis, sic vt venter ipse mediocriter calentibus inuenitur. Quòd si vehementer & vomitus, & deiectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt quæ vomuntur, nondum vino maturum tempus est, aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est, admoendumq; naribus est

pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel menta, si nondum matura est. At cum discussa cruditas est, tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, cum aqua frigida mistum, vel polenta adiecta, vel melle quoque assumere expedit, quotiesq; aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per hac vires restituere. Erasistratus primo tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem esse dixit, deinde paulatim merum adijciendum. Is si & ab initio vinum dedit, & metum cruditatis secutus est, non sine causa fecit. Si vehementem infirmitatem adiuuari posse tribus guttis putavit, erravit. At si inanis est homo, & crura eius contrahuntur, interponenda potio absynthij est. Si extremae partes corporis frigent, ungenda sunt calido oleo, cui cere paulum sit adiectum, calidisq; fomentis nutrienda. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admouenda est, aut sinapi super imponendum. Vbi his constitit, dormire oportet, postero die utique a potione abstinere, die tertio in balneum ire, paulatim se cibo reficere: somno, quisquis facile acquiescit, itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est, tum cibus, vinoq; utendum est, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachumq;

chumq; versatur, sic vt cuius potissimum partis sit, non facile dici possit.

De Cœliaco ventriculi morbo. CAP. XII.

IN ipsius verò ventriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit, nōdixāds à Græcis nominatur. Sub hoc venter indurefcit, dolorq; eius est. Alius nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Extremæ partes frigesunt. Difficulus spiritus redditur. Cōmodissimum est inter initia calida cataplasmata toto ventri imponere, vt dolorem leniant, post cibum vomere, atq; ita ventrē exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ventri, & coxis ad-mouere. Ventrē ipsum liquare dato lacte, & vino salso frigido. Si tēpus anni patitur, etiam viridibus ficis, sic tamen, ne quis aut cibus aut humor vniuersus detur, sed paulatim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos ternos'ue sumere, & cibum pro portione huius: commodeq; facit cyatho lactis cyathus aquæ mistus, & sic datus. Cibiq; instantes, et acres vtiores sunt, adeo vt lacti quoq; rectè contritum allium adiiciatur. Procedente verò tempore opus est gestari, maximeq; nauigare, perfricari ter aut quater die, sic vt nitrum oleo misceatur, per-fundi aqua calida post cibum, deinde sinapi imponere per omnia membra, excepto capite, donec arrodatur & rubeat, maximeq; si corpus durum & virile est, paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ ventrē comprimunt.

Assa caro danda, valens & quæ non facile cor-
rumpatur: potui verò pluuiæ aqua decocta, sed
quæ per binos ternos' ve cyathos bibatur. Si ve-
tus vitium est, oportet laser quàm optimum ad
piperis magnitudinem deuorare, altero quoq; die
vinum, vel aquam bibere, interdum interposito
cibo singulos vini cyathos sorbere, ex inferiori
parte infundere pluuiæ ægelidâ aquam, ma-
ximeq; si dolor in imis partibus remanet.

De tenuioris intestini morbo. CAP. XIII.

INter ipsa verò intestina cōsistunt duo mor-
bi, quorum alter in tenuiore, alter in pleniore
intestino est. Prior acutus est. Insequens esse lon-
gus potest. Diocles Carystius tenuioris intesti-
ni morbum $\chi\omicron\gamma\delta\alpha\psi\omicron\nu$, plenioris $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\nu$ nomina-
uit. A plerisq; video nunc illum priorem $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\nu$,
hunc $\chi\omicron\gamma\delta\epsilon\omicron\nu$ nominari. Sed prior modò supra
umbilicum, modò sub umbilico dolorem mouet.
Fit ex alterutro loco inflammatio, nec aluus, nec
spiritus infrâ transmittitur. Si superior pars af-
fecta est, cibus: si inferior, stercus per os reddi-
tur: si vtrumlibet vetus est, adiicitur periculo
vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut ni-
ger. Remedium est sanguinem mittere, vel cu-
curbitulas pluribus locis admouere, nō ubiq; cu-
te incisa. Id enim duobus aut tribus locis satis
est. Ex ceteris spiritū euocare, abunde est. Tum
animaduertere oportet, quo loco malum sit. Solet
enim contra id tumere. Et si supra umbilicum
est, alui ductio utilis nō est. Si infrâ est, aluum
ducere

* $\chi\omega\lambda\iota$ -
 $\mu\omicron\nu$

ducere (vt Erasistrato placuit) optimum est, & saepe id auxiliij satis est. Ducitur autem percolato ptisana cremore cum oleo & melle, sic vt præter ea nihil adiiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet, supra summum ventrem, paulatimq; deducere. Inuenietur enim mali locus qui necesse est reinitatur, & ex eodem deliberari poterit, ducenda nec'ne aliud sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata ad mouere, eaq; imponere à mammis vsq; ad inguina, & spinam, ac saepe mutare: brachia, cruraq; perfricare, demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quatuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus, vt iam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsum tepidum non multum. Nam antè magna cura vitandum est, ne quid bibat. Si id commodè cessit, adijcere sorbitionem. Vbi dolor & febricula quierunt, tum demum vti cibo pleniore, sed neq; inflante, neq; duro, neq; valido, ne intestina adhuc imbecilla lædantur, potui verò nihil præterquam puram aquam. Nam siue quid vinolentum, siue acidum est, id huic morbo alienum est. Ac postea quoq; vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosq; corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit, & siue cum frigus subit, siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

De morbo intestini plenioris. CAP. XIII.

IS autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea maxime parte est, quam cecam esse proposui. Vehemens inflatio, vehementes dolores dextra magis parte, intestinum quod verti videtur, prope spiritum elidit. In plerisque post frigora, cruditatesque oritur, deinde quiescit, et per atatem saepe repetens, sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat. Vbi is dolor cæpit, ad mouere sicca et calida fomenta oportet, sed primo lenta, deinde validiora, simulque frictiones, ad extremas partes, id est, crura, brachiaque materiam reuocare. Si discussum non est, qua dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum, quod νολινδρ nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum, sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem leuat. Nisi finito verò tormento, recte neque cibis neque potio assumitur. Quo victu sit utendum, qui hoc genere tentantur, iam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod νολινδρ nominatur, ex his constat: Costi, anesi, castorei, singulorum P. denariorum III. ✱. petroselini P. denariorum III. piperis longi, et rotundi, singulorum P. ✱. II. papaueris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum P. VI. ✱. quæ melle excipiuntur, id autem et deuorari potest, et ex aqua calida sumi.

De

De Torminibus, id est, δυσεντερίæ. CAP. XV.

Proxima his inter intestinorum mala, tormina esse consueuerunt, δυσεντερίæ Græce vocatur, intus intestina exulcerantur. Ex his cruor manat. Isq; modò cū stercore aliquo semper liquido, modò cum quibusdam quasi mucosis excernitur, interdum simul quedam carnosæ descendunt. Frequens deijciendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur. Atq; eo quoq; tormentum intenditur. Idq; post tēpus aliquod leuatur, exiguaq; requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoq; tempore id malum cum inueterauerit, aut tollit hominem, aut etiam (si finitur) excruciat. Oportet in primis cōquiescere. Siquidem omnis agitatio exulcerat, deinde ieiunium sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquæfolij sit adiecta, imponere cataplasmata super ventrem, quæ reprimunt, quod in superioribus ventris morbis nō expedit, quotiesq; desidit, subluere aqua calida, in qua decoctæ verbenæ sint, portulacam vel coctam, vel ex dura muria edisse, cibos, potionesq; eas, quæ astringunt aluum. Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere, vel ptisanæ cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam ceruinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album crudū ex ouis, vel aquam, in qua lini semen decoctum sit: vel si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta

cocta sint. Leuant enim dolorem hæc, & mitiora vlcera efficiunt, maximeq; vtilia sunt, si cibi quoq; secutum fastidium est. Themison muria dura quàm asperissima sic vtendum memoriae prodidit. Cibi verò esse debent, qui leniter ventrem dstringant, & ea quæ vrimam moueant. Si ea consecuta sunt, in aliam partem humorem auertendo, prosunt: si non sunt consecuta, noxam augent. Itaq; nisi in quibus promptè id facere consueuerunt, non sunt adhibenda. Potui si febricula est, aqua pura calida, vel ea quæ ipsa quoq; astringat, dari debet: si non est, vinum lene, austereum. Si pluribus diebus nihil remedia alia inuerunt, vetusq; iam vitium est, aquæ bene frigida potio assumpta vlcera astringit, & initium secundæ valetudinis facit. Sed vbi venter suppressus est, protinus ad calidâ potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies pessimiq; odoris descendere, solet purus sanguis profluere. Si superius vitium est, aluus aqua mulsa duci debet, tunc deinde eodem infundi, quæ suprâ comprehensa sunt. Valensq; est etiam aduersus vlcera intestinorum minij gleba, cum salis hemina contrita. Si minus, mista his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluit, cibi potionesq; esse debent, quæ astringant.

De læuitate intestinorum.

CAP. XVI.

EX torminibus interdum intestinorum læuitas oritur, quæ continere nihil possunt, et quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt.

reddunt. Id interdum ægros trahit, interdum precipitat. In hoc utiq; adhibere oportet comprimantia, quò facilius tenendi aliquid intestinis vis sit. Ergo & super pectus ponetur sinapi, exulcerataq; cute, malagma, quod humore euocet, & ex verbenis decoctis aqua. desidet, & cibos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt, & frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere, ne simul his omnibus admotis vitium contrarium per immodicas inflationes oriatur. Paulatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus quotidie adiectis. Et cum in omni fluore ventris, tum in hoc præcipuè necessarium est, non quoties libet desiderare, sed quoties necesse est, ut hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoq; quod æquè ad omnes similes affectus pertinet, in hoc maxime seruandum est, ut cum pleraq; utilia insuauia sint, qualis est plantago, & rubi, et quicquid mali corio mistum est, ea potissimum ex his dentur, quæ maxime æger volet. Deinde si omnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupiditatem interponatur aliquid minus utile, sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoq; morbo necessariae sunt, & cum his sol, ignis, balneum, vomitus (ut Hippocrati visum est) etiam albo veratro. (si cætera parum proficient) euocatus.

Desidet,
subaudi æ-
ger: sic in-
frà cap.
proxi.

De Lumbricis aluum occupantibus.

C A P.

XVII.

Nonnulli

Nonnunquam autem Lumbrici quoq; occupant aluum, hiq; modò ex inferioribus partibus, modò sædius ore redduntur. Atq; interdum latos eos, qui peiores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit, contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scamoneæ paulum. Veletiam pridie cum multum allium ederit, vomat. Posteroq; die mali punici tenues radiculos colligat, quantum manu comprehendet, easq; contusas in aquæ tribus sextarijs decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adijciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat, aut aquæ, vel muriæ duræ sic adiectæ, tum desidet subiecta calida aqua in pelue. Si vero teretes sunt, qui pueros maxime exercent, & eadem dari possunt, & quedam leuiores, vt contritum semen vrticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel menta cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nasturtij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium
 *in alijs prodest, vel *maluæ oleum subter dedisse.

De τρυφεῶν ἰντεστίνων morbo.

CAP. XVIII.

Est autem aliud leuius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod τρυφεῶν ἰντεστίνων Greci vocant, id neq; acutis, neq; longis morbis annumerari debet, cum & facile tollatur, neq; vnquam

unquam per se iugulet, in hoc æquè atq; in torminibus frequens desidendi cupiditas est, æquè dolor ubi aliquid excernitur. Descendunt autem pituita, nucisq; similia, interdum etiam leuiter subcruenta: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoq; recte coacta: desiderare oportet in aqua calida, sæpiusq; ipsum manu nutrire, cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, acacia ex aceto liquata, emplastrum id, quod τετραφάρμακον Græci vocant, rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum, eademq; ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem verbenæ decoctæ, & inferiores partes foueantur, alternis verò diebus aqua, alternis leue & austerum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigida: prior ratio victus talis, qualem in tormina supra præcepimus.

De ventris fluxu, & curatione. CAP. XIX.

Leuior etiam diu recens deiectio est, ubi & liquida aluus, & sæpius quàm ex consuetudine fertur: atque interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idq; peius est: sed vno die fluere aluum sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, et quod intus lasurum erat, vtiliter effunditur, verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat, viresq; consumit: primo die quiescere satis est, neq; impetum

impetum ventris prohibere: si per se desūt, balneo vti, paulum cibi capere: si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die si nihilominus liquida aluus est, æquè conquiescere, paulum astringentis cibi sumere, tertio die in balneum ire, vehementer omnia præter ventrem perfricare, ad ignem lumbos, scapulas que admouere, cibis vti, sed ventrem contrahentibus, vino non multum meraco. Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed vomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, vt post hanc animaduersionem aluus non contrahatur. Alia via est vbi velis suppressere, cœnare, deinde vomere, postero die in lecto conquiescere, vesperi vngi, sed leniter, deinde panis circa selibram, ex vino amineo mero sumere, tum assum aliquid, maximeq; auem, et postea vinum idem bibere aqua pluuiali mistum, idq; vsq; ad quintum diem facere, iterumq; vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores autores Asclepiades affirmavit, & quidem quàm frigidissimam. Ego experimentis quæq; in se credere debere existimo, calida potius an frigida vtatur. Interdum autem euenit, vt id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere, deinde postero die vesperi, tepido* loco vngi, cibum modicum assumere, vinum meracum quàm asperrimum, impositam super vètre[m] habere cum cerato rutam.

tam. In hoc autem affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est, uehiculo sedisse, vel magis etiam equo prodest. Neque enim vlla res magis intestina confirmat. Si verò etiam medicamentis vtendum est, aptissimum est id quod ex pomis fit. Vndemia tempore in grande vas coniicienda sunt pira, atq; mala syluestria: si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana vel amerina, myrrhappia, hisq; adiicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba, & quibus magis vtimur, etiam torminalia, sic vt hæc tertiam olla partem teneant, tum deinde ea musto implenda est, coquendumq; id, donec omnia quæ indita sunt, liquata in vnitatem quandam coeant. Id gustui non insuaue est, & quandocunque opus est, assumptum leuiter, sine vlla stomachi noxa ventrem tenet: duo aut tria cochlearia vno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus est, myrti baccas legere, ex his vinum exprimere, id decoquere, vt decima pars remaneat, eiusq; cyathum sorbere. Tertium quod quandoque fieri potest, malum punicum excavare, exemptisq; omnibus seminibus, membranas quæ inter ea fuerunt, iterum coniungere, tum infundere cruda oua, rudiculaq; miscere, deinde malum ipsum super prunam imponere, quod dum humor intus est, non adurit. Vbi siccum esse cœpit, remouere oportet, extrahumq; cochleari, quod intus est, edisse. Aliquibus adiectis maius momenti habet. Itaq; etiam

Myrrhappia Pliniu
ab odore
dicta esse
dicit, li. 15
cap. 15.

p

in

Potio quæ
stringat.

in piperatum conijcitur, misceturq; cum sale, & pipere: est quid ex his edendum, est pulticula etiam, cum qua paulum ex fauo vetere coctum sit, & lenticula cum malo corio cocta, rubiq; cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt, atque ea aqua, in qua vel palmule, vel malum cotoneum, uel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. Quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ astringat. Tritici quoque hemina in vino amineo austero decoquitur, idq; triticum ieiuno, ac sitienti datur, superq; id vinum id sorbetur, quod iure valentissimis medicamentis annumerari potest, atque etiam potui datur vinum signinum, vel resinatum austereum, vel quodlibet austereum. Contunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicum malum, vinoq; tali miscetur, idq; vel merum sorbet aliquis, vel bibit mustum. Sed medicamentis uti, nisi in uehementibus malis superuacuum est.

De vuluæ morbo, & curationibus. CAP. XX.

EX vulua quoque scæminis uehemens malum nascitur, proximeq; ab stomacho vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur, sopor tantum est, idq; quibusdam scæminis crebro reuertens, perpetuum est. Vbi incidit, si satis virium est, sanguis missus adiuvat.

Si

Si parum est, cucurbitula tamen defigenda sunt
in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut aliqui
iacere consuevit, admouere oportet naribus ex-
tinctum ex lucerna linamentum, uel aliud ex his
quæ fœdioris esse odoris retuli, quod mulierẽ ex-
citet. Idemq; aquæ frigida perfusio efficit, ad-
iuuatq; ruta contrita cum melle, uel ex cyprino
ceratum, uel quodlibet calidum, & humidum ca-
taplasma, naturalibus pubetenus impositũ. In-
tra hæc etiam perfricare coxas, & poplites
oportet. Deinde ubi ad se redit, circumcidendum
uinum est in totum annum, etiam si casus idem
non reuertitur. Frictione quotidie utendum to-
tius quidem corporis, præcipuè uerò uentris &
poplitũ. Cibus ex media materia dandus. Sina-
pi super inum uentrem, tertio quoque, aut quar-
to die imponendum, donec corpus rubeat. Si du-
rities manet, mollire commodè uidetur solanum
in lac demissum, deinde contritum, & cera al-
ba, atque medulla ceruina cum irino, aut seuum
taurinum, uel caprinum cum rosa mistum. Dan-
dum potui etiam uel castoreum est, uel git, uel
anethum. Si parũ pura est, purgatur iunco qua-
drato: si uerò uulua exulcerata est, ceratum ex
rosa fiet, & recens suilla adeps, & ex ouis al-
bum misceatur, idq; apponatur, uel album ex ouo
cum resâ mistum, adiecto quo facilius consistat,
contrita rosæ puluere. Dolens uerò ea sulphure
suffumigari debet. At si purgatio nimia mulie-
ri nocet, remedio sunt cucurbitula cute incisa

p. 2 inguin

inguinibus, vel etiam sub mammis admota: si
 ientia maligna purgatio est, subiicienda sunt, *co-
 ercentia. Id faciunt etiam albae oliuae, & ni-
 grum papauer cum melle assumptum, & gum-
 mi cum trito semine apij liquatum, & cum cya-
 tho passi datum. Præter hæc in omnibus vesicæ
 doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus
 fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia,
 similibusq; Idemq; etiam decocta lentiscus præ-
 stat. Si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis
 profluit, etiam sanguinis detractio apta est, aut
 certè coxis admota cucurbitulæ cute incisa. At
 cum vrina super potionum modum etiam sine
 dolore profluens, maciem, & periculum facit, si
 tenuis est, opus est exercitatione & frictione,
 maximeq; in sole vel ad ignem. Balneum rarum
 esse debet, neque longa in eo mora, cibis compri-
 mens. Vinum austerum meracum, per æstatem
 frigidum, per hyemē egelidum, sed tantū, quan-
 tum minimum sit. Infima aluus quoque vel du-
 cenda, vel lacte purganda est. Si crassa vrina
 est, vehementior esse debet & exercitatio, &
 frictio, longior in balneo mora cibis opus est te-
 neris, vinum idem. In utroq; morbo vitanda o-
 mnia sunt, quæ vrinam mouere consuerunt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus

C A P. XXI.

Est etiam circa naturalia vitium, nimia
 profusio seminis, quod sine venere, sine no-
 cturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spa-
 tio

tio tabe hominem consumat. In hoc affectu salu-
tares sunt vehemētes frīctiones, perfusiones, na-
tationesq; quā frigidissimae, neq; cibi, nec po-
tio, nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet
cruditates, omnia infantia, nihil ex his assume-
re, quae contrahere semen videntur, qualia sunt,
siligo, simila, oua, alica, amyllum, omnis caro glu-
tinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neq; alie-
num est fouere inferiores partes, aqua decocta
ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua
cataplasmata imo ventri inguinibusq; circun-
dare, praecipueq; ex aceto rutam vitare, etiam
ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, & curationibus.

C A P. XXII.

Superest vt ad extremas partes corporis ue-
niam, quae articulis inter se conseruntur, ini-
tium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse
consuevit. Isq; hominem saepe debilitat, & quos-
dam non dimittit. Eoq; id genus difficilime cu-
ratur, quod ferè post longos morbos vis pestife-
ra huc se inclinat, quae vt illas partes liberat, sic
hanc ipsam quoque affectam prehendit. Fouen-
dum primum aqua calida est, deinde vtendum
calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse vide-
tur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex
aqua decocta mistus. capparis cortex concisus,
vel lolij farina ex vino diluto cocta, & mista
cum acida fece: * quae, quia refrigescunt, impone- * quae
re noctu malagmata commodius est. Inula quoq; frigescit

p 3 radix

radix contusa, & ex vino austero postea co-
cta, & late super coxam imposita, inter valen-
tissima auxilia est. Si ista non soluerunt, sale
calido & humido utendum est. Si ne sic quidem
finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute
admouenda sunt cucurbitulae, mouenda vrina.
Aluus si compressa est, ducenda. Vltimum est,
& in veteribus quoque morbis efficacissimum,
tribus aut quatuor locis super coxam, cutem can-
dentibus ferramentis exulcerare. Sed frictione
quoque utendum est, maximè in sole, & eodem
die sapius: quò facilius ea, quae coeundo nocue-
runt, dirigantur. Eaquae si nulla exulceratio est,
etiam ipsis coxis, sicut & ceteris partibus adhi-
benda est. Cum verò saepe aliquid exulcerandum
candenti ferramento sit, ut materia inutilis euoce-
tur, illud perpetuum est, non ut primum fieri potest,
huius generis ulcera sanare, sed ea trahere, donec
id vitium, cui per hac opitulantur, conquiescat.

De genuum doloribus, & cura. CAP. XXIII.

COxis proxima genua sunt, in quibus ipsis
nonnunquam dolor esse consuevit. In eisdem
autem cataplasmatibus, cucurbitulisque praesidium
est, sicut etiam cum in humeris, alijsue commissu-
ris dolor aliquis exortus est. Equitare ei cui
genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes
autem eiusmodi dolores, ubi inueterauerunt,
vix citra uestionem finiuntur.

De articulorum doloribus, in manibus,
pedibusque. CAP. XXIII.

In

IN manibus pedibusq; articularum vitia frequentiora, longioraq; sunt, quæ in podagris, chiragris'ue esse consuerunt. Ea raro vel castratos, vel pueros ante scæminæ coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant. Vbi sentiri cœperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam valetudinē totam præstat. Quidam etiam cum asinino * lotio epoto se * lacte eluissent, in perpetuū hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno à vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vitæ consecuti sunt. Idq; utiq; post primū dolorem seruandum est, etiam si quiescit. Quod si iam consuetudo eius facta est, potest quidem aliquis esse securior his temporibus, quibus dolor se remisit. Maiorem verò curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. Quod fere vere, autumno'ue fieri solet. Cum verò dolor non vrget, manu gestari debet, deinde ferri, inambulatione leui se dimouere: & si podagra est, interpositis temporibus exiguis inuicē modò sedere, modò ingredi, tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida, deinde cibum sumere ex media materia interpositis rebus urinam mouentibus, quotiesq; plenior est, euomere. Vbi dolor vehemens vrget, interest sine tumore i sit, an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel mu-

riam durā feruefacere oportet, deinde in peluem
 coniungere, & cum iam homo pati potest, pedes
 demittere, superq; pallam dare, & vestimento
 tegere, paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex
 eadem aqua leuiter infundere, ne calor intus
 destituat, ac deinde noctu cataplasmata calefa-
 cientia imponere, maximeq; hibisci radicem ex
 vino coctam. Sin verò tumor calorq; est, utilio-
 ra sunt refrigerantia, recteq; in aqua quā fri-
 gidiſſima articuli continentur: sed neque quoti-
 die, neque diu fit, ne nerui^{*} ledantur. Imponen-
 dum verò est cataplasma quod refrigeret. Neque
 in hoc tamen^{*} in hoc ipso permanendū, sed ad ea trans-
 uotidie eundum, quæ sic reprimunt, vt emolliant. Si
 erm. maior est dolor, papaueris cortices in vino co-
 quendi, miscendiq; cum cerato sunt, quod ex ro-
 ſa factum sit. Vel cera, & adipis ſuillæ tantun-
 dem vnā liquandum, deinde his vinum miscen-
 dum, atque vbi quod ex eo impositum est, inca-
 luit, detrahendum, & subinde imponendū aliud
 est. Si verò tumores etiam obcaluerunt, & do-
 lent, leuat ſpongia, quæ imposita subinde ex oleo,
 vel aceto, vel aqua frigida exprimitur, aut pari
 portione inter ſe miſta, pix, cera, alumen. Sunt
 etiam plura idonea manibus, pedibusq; malag-
 mata. Quod ſi nihil ſuperimponi patitur, id
 quod ſine tumore est, fouere oportet ſpongia, quæ
 in aquam calidam demittatur, in qua vel papa-
 ueris cortex, vel cucumeris ſylueſtris radix de-
 cocta ſit, tum inducere articulis crocum cum ſuc-

eo papaueris, & ouillo lacte. At si tumor est, fouere quidem debet aqua* calida, in qua lenti-^{*egelid} scus, alia'ue verbenae ex reprimentibus decocta sint: induci uero medicamentū ex nucibus amaris cum aceto tritis, aut ex cerussa, cui contrita herba muralis succus sit adiectus. Lapis etiam qui carnem exedit, quem σαρκοφάγος Græci vocant, excisus, sic ut pedes capiat, demissos eos cum dolent, retentosq; ibi leuare consuevit. Ex quo in Asia lapidi* Asio gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserūt, quod intra dies quadraginta fit, nisi vitium hominis accessit, modicis exercitationibus, abstinentia, vntionibus lenibus vtendum est: sic, ut etiam aco-
po, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus uero articulorum dolor certis temporibus reuertitur, hos antè & curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, & crebriore vomitu, & si quis ex corpore metus est, vel alui ductione uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in inferiores partes factus cursus pedes replet, cum euident sit omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunque autem morbo quis inualescit, si tardè confirmatur, vigilare prima luce debet, nihilominus in lecto conquirere, circa tertiam horam leuiter vinctis manibus corpus permulcere. Deinde delectationis causa

(quantum iuuat) ambulare, circuncisa omni negotiosa cogitatione uel actione, tum gestari diu, multa fricatione uti, loca, caelum, cibos saepe mutare. Vbi triduo, quatruiduo'ue vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per haec enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut maturè vires suas recipiat. Cum ex toto verò conualuerit, periculosè vitæ genus subito mutabit, & inordinatè aget. Paulatim ergo debet omiſſis his legibus, eò transire, ut arbitrio suo viuat.

LIBER V.



DIXI de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subuenit. Nunc transeundum est ad eam medicine partem, quæ magis *pugnat* *dicamentis* *purgat*. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se Empiricos nominauerunt, præcipue tamen Herophilus, deductiq; ab illo viri, adeo ut nullum morbi genus, sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorū memoriæ prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andrae, vel Apollonij, qui Dols cognominatus est. Horum autē usum ex magna parte Asclepiades, non sine causa sustulit: & cum omnia ferè medicamenta stomachum ledant, maliq; succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam tranſt

translulit. Verum ut illud in plerisque morbis uti-
lius est, sic multa admodum corporibus nostris in-
cidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sa-
nitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia
scire conuenit, quod omnes medicinae partes ita
innexæ sunt, ut ex toto separari non possint, sed
ab eo nomen trahant, à quo plurimum petunt.
Ergo ut illa quæ victu curat, aliquando medi-
camentum adhibet, & illa quæ præcipue medi-
camentis* purgat, adhibere etiam rationem vi-
ctus debet, quæ multum admodum in omnibus ma-
lis corporis proficit. Sed cum omnia medicamen-
ta proprias facultates habeant, ac sæpe simpli-
cia opitulentur, sæpe mixta, non alienum vide-
tur ante proponere & nomina, & vires, &
mixturas eorum, quo minor ipsius curationis ex-
sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarūcūq; rerum,
ex quibus medicamenta fiunt, & primo de
his quæ sanguinem supprimunt. CAP. I.

Sanguinem supprimunt, atramentum suto-
rium, quod Græci χάλναρδον appellant,
chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë,
gummi, plumbum combustum, porrum, herba
sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, mi-
sy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melini, <sup>Vel figi-
latia.</sup>
squama & ferri, & æris, atq; huius quoq; duæ
species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

Quæ vultus glutinent.

CAP. II.

Glutius

Glutinant vulnus, myrrha, thus, gummi, præcipueq; acanthinum psilleum, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturtium, oui album, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusa cum testis suis cochlea, mel coctum, spongia, vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa, ex iisdem lana succida, si levis pla-
ga est, etiam aranea: reprimunt alumen & scissile (quod σκιστόν vocatur) & liquidum, melinum, auripigmentum, erugo, chalcitis, atramentum sutorium.

Quæ concoquant, & moueant pus. C A P. III.

Concoquant & mouent pus, nardum, myrrha, coctus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Quæ aperiant vulnera. C A P. IIII.

Vulnera aperiunt tanquam ora in corporibus, quod στόμα Græce dicitur, cinnamomum, balsamum, panaces, iuncus quadratus, pu-
*bdella legium, flos albæ violæ, *bdellium, galbanum, re-
sina terebinthina, & pinea, propolis, oleum ve-
*aminia tus, piper, pyrethrum, chamæpitys, rua *tami-
nia, sulphur, alumen, rutæ semen.

Quæ purgant. C A P. V.

Purgant, erugo, auripigmentum, quod ἀργε-
vινόν à Græcis nominatur. Huic autem et
sandaracæ in omnia, eadem vis, sed validior est
squama aris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus,
thuris cortex, resina & pinea, & terebinthina
liquida

liquida, ænanthe, lacerti stercus, sanguis columbæ, et palumbi, et hirundinis, ammoniacum bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacum potest, sed valentius est, abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinum, cui eadem quæ cæteris coagulis facultas, sed ubique validior est, fel, vitellus crudus, cornu ceruinum, gluten taurinum, mel crudum, misyos chalcitis, crocum, rui* taminia, abrotanum, spuma *aminia argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, eruum.

Quæ rodant.

C A P. VI.

ROdunt, alumen, liquidum, sed magis rotundum, erugo, chalcitis, misy, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaraca, minium Synopicum, galla, balsamum, myrrha, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina humida, piper utrunque, sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, et spuma eius, apij semen, narcissi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, rui taminia, cinnamomum, styrax, cicutæ semen, resina, narcissi semen, fel, nuces amaræ, oleumq; earum, at ramentum sutorium, chrysocola, vetratrum, cinis.

Quæ exedant corpus.

C A P. VII.

Exed

EXedunt corpus, acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris, chrysocolle, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, sandaraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marine, quæ tithymallos à Græcis nominatur, alcyonium, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hamatites, & Phrygius, & Asiæ, & scissilis, misy, vinum, acetum.

Quæ adurant.

C A P. VIII.

ADurant, auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama æris, fex combusta, myrrha, stercus & lacerti & columbe, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum Gnidium, allium, diphryges, lac utrumque (quod proximo capite supra comprehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaraca, rutaminia, chrysocolle, ochra, alumen scissile, ouilum sterchus, ænanthe.

Quæ crustas vlceribus inducant, C A P. IX.

EAdem fere crustas vlceribus tanquam igne adustis inducunt, sed præcipue chalcitis, utique si cocta est, flos æris, ærugo, auripigmentum, misy, & id, quò magis coctum.

Quæ crustas vlceribus resoluant, C A P. X.

Crust

Crustas verò has, resoluit farina triticea cum ruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discentiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt.

CAP. XI.

Ad discutienda verò ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt, maxime possunt, abrotanum, helenium, amaracus, alba viola, mel, lilium, *sanfucus, cyperus, lac, fertula campana, *sampsu-
serpillum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea, *cus Cy-
narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadra- prias
tus, nardum, cinnamomum, casia, ammoniacum,
cera, resina, vua taminia, spuma argenti, sty-
rax, ficus arida, tragoriganus, lini & narcissi
semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites la-
pis, aut molaris, crudus vitellus, amara nuges,
sulphur.

Quæ euocent, & educant.

CAP. XII.

EVocat & educit, ladanum, alumen rotun-
dum, hebenus, lini semen, omphacium, fel,
chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea,
propolis, ficus arida decocta, stercus columbæ,
pumex, farina lolij, grossi in aqua cocti, elaterium,
lauri bacca, nitrum, sal.

Quæ exasperata leuent.

CAP. XIII.

Leuat id quod exasperatum est, spodium, hebe-
nus, gummi, oui album, lac, tragacanthum,

Quæ carnem nutriant, & vlcus impleant.

CAP. XIII.

Carnem alunt, et vlcus implent, resina pinea, etica, ve
*ochra, actice, mel, asteriace, cera, butyrum, asterica

Quæ

Quæ molliant.

CAP. XV.

rythria

Mollunt, æs combustū, terra* ereτρια, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdelliū, cera, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamū, sertula Campana, narcissi et radix & semen, rosa folia, coagulū, vitellus crudus, amara nuces, medulla omnis, stibi, pix, cochlea cocta, cicuta semen, plumbi retrimentum, σνογίαρ μολύβδῳ Græci vocant, panaces, cardamomū, galbanū, resina, rua taminia, styrax, iri, balsamū, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ cutem purgent.

CAP. XVI.

Cutem purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel eruo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel ærugine.

De misturis simplicium rerum, & de ratione penderum, & quid Malagma, & Emplastrum, & Pastillus inter se differant. CAP. XVII.

Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem varie, neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur, alia adijciatur, iisdemq; seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt, quæ comprehendi si possent, tamen esset superuacuum. Nam & ydem effectus inter paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet (cognitis facultatibus) facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo,

eabo, quæ vel desiderari in prioribus potuerunt,
 vel ad eas curationes pertinent, quas protinus
 hic comprehendam, sic ut tamen quæ magis com-
 munia sunt, simul iungam. Si qua singulis, vel
 etiam paruis accommodata sunt, in ipsorum lo-
 cum differam. Sed & antea sciri volo, in vncia
 pondus denariorum septem esse. Vnius deinde Vncia.
Denarius.
 denarij pondus diuidi à me in sex partes, id est
 sex vncias, ut idem in vncia denarij habeam,
 quod Græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellāt.
 Id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimi-
 dio scrupulo facit. Malagmata verò, atq; Empla-
 stra Pastilliq; (quos τροχίσκους Græci vocant)
 cum plurima eadem habeant, differunt eo, quòd
 Malagmata maximè ex floribus, earumq; etiā
 surculis: Emplastra Pastilliq; magis ex quibus-
 dam metallicis fiunt: deinde malagmata contusa
 abunde mollescunt: nam super integram cutem
 iniiciuntur. Laboriose verò conteruntur ea, ex
 quibus emplastra pastilliq; fiunt, ne ledant vul-
 nera cum imposita sunt. Inter Emplastrum au-
 tem, & Pastillum hoc interest, quòd Emplastrū
 utiq; liquati aliquid accipit, in Pastillo tantum
 arida medicamenta aliquo humore iunguntur.
 Tum Emplastrū hoc modo fit, arida medicamen-
 ta per se teruntur, deinde mistis his instillatur
 aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor
 accessurus est, & ea rursus ex eo teruntur. Ea
 verò quæ liquari possunt, ad ignem simul liquan-
 tur, & si quid olei misceri debet, tum infundi-
 tur.

tur. Interdū etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt, in vnum omnia miscentur. At Pastilli hæc ratio est: Arida medicamenta contrita humore non pingui, aut vino, vel aceto coquuntur, & rursus cocta, inarescunt. Atque vbi vtendum est, eiusdem generis humore diluuntur, tum ^{pastillis} Emplastrum imponitur, * pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

DE MALAGMATIS.

CAP. XVIII.

Malagma aduersus calidas podagras.

His cognitis, primum malagmata subijciā, quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immaturæ et alterius, coriandri seminis, cicutæ lacrymæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod πεπλυμῆνός Græci vocant, selibram. Reliqua ferè calefaciunt. Sed quedam digerunt materiam, quedam extrahūt, quæ ἐπισπαστική vocatur, pleraq; certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

Si materia extrahenda est, vt in hydropico, sin lateris dolore, in incipiēte abscessu, in supuratione quoq; mediocri, aptum est id, quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pondo *. ceræ pondo *. Aut in quod hæc sunt, eruginis rase, thuris, singulorū P. I I. *. ammoniaci salis P. V I. *. squamæ aris, ceræ, singulorum

gulorum p. viii. *. resinae aridae p. *. xii. *. *. vii.
 aceti cyathus. Idem praestatur cumini farina cum
 struthio, & melle p. i. *.

Malagma ad iecur dolens.

S Iecur dolet, id in quo est balsami lacrymae
 p. xi. *. costi, cinamomi, casiae, corticis
 myrrhae, croci, iunci rotundi, balsami seminis, iri-
 dis illyricae, cardamomi, amomi, nardi, singulorum
 p. xvi. *. Quibus adijcitur nardinum unguen-
 tum, donec cerati crassitudo sit, & huius qui-
 dem recentis usus est. Si vero seruandum est,
 resinae terebinthinae p. xvi. *. cere p. x. *. ex
 vino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Malagma ad lienem.

A T si lienis torquet, glandis (quam βαλανου
 Graeci vocant) cortex & nitrum paribus
 portionibus contunduntur, respergunturque aceto
 quam acerrimo. Vbi cerati crassitudinem habet,
 linteo antea in aqua frigida madefacto illinitur,
 & sic imponitur, supraque farina ordeacea inij-
 citur, sed manere ibi non amplius sex horis de-
 bet, ne lienem consumat. Satiusque est id bis, aut
 ter fieri. Communem autem & iocineri, & lie-
 ni, & abscessibus, & strumae, parotidibus, ar-
 ticulis, calcibus quoque suppurantibus, aut ali-
 ter dolentibus, etiam concoctioni ventris, Lysias
 composuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani,
 resinae, singulorum p. ii. *. ammoniaci, bdellij,
 cere, seu taurini, iridis aridae p. iii. *. ca-
 chryos acetabulo, piperis granis quadraginta.

Quae contrita, irino vnguento temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

Ad laterum autem dolores compositio est Apollopheanis, in qua sunt resinae terebinthinae, thuris fuliginis, singulorum p. i i i i. *. bdellij, ammoniaci, iridis, seu vitulini, aut caprini ad renibus sicci, singulorum p. i i i i. *. Hec autem eadem omnem dolorem leuant, dura emolliunt, mediocriter calefaciunt. Ad idem latus Andrea quoque malagma est, quod etiam resoluit, educit humorem, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit, prodest impositum minutis maioribusque abscessibus, item articulis, ideoque et coxis, et pedibus dolentibus: item si quid in corpore collisum est, reficit, praecordia quoque dura et inflata emollit, ossa extrahit, ad omnia denique valet, quae adiuuare calor potest. Id habet cerae p. *. x i. *. visci sycamini, quam alias sycorum vocant, lacrymae, singulorum p. *. i. *. piperis et rotundi, et longi, ammoniaci, thymiamatis, bdellij, iridis illiricae, cardamomi, amomi, xylobalсами, thuris masculi, myrrhae, resinae aridae, singulorum p. x. *. pyrethri, cocci Gnidij, spuma nitri, salis ammoniaci, aristolochiae Creticae, radicis ex cucumere agresti, resinae terebinthinae liquidae, singulorum p. x x v. *. Quibus adijcitur vnguenti irini, quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

Malagmata ad resoluenda quae astricta sunt, & mollienda quae dura sunt, & digerenda quae coeunt.

Pracip

PRecipitū verò est ad resoluenda quæ astricta sunt, mollienda quæ dura sunt, digerenda quæ coeunt, id quod ad Polyarchum autorem refertur. Habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, amomi, cere, resinae liquidæ, pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Aliud ad eadē Nilei, crocomagmatis (quod quasi recrementum eius est) P. I I I I. *. ammoniaci, thymiamatis, cere, singulorum P. X X. *. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, et tum omnia iunguntur.

Malagma Moschi ad molliendum.

Propriè etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis P. *. 3. cere, ammoniaci, thymiamatis trientes, picis aridæ P. I I. *. aceti heminas tres.

Malagma Medi ad digerenda quæ coeunt.

Fertur etiam ad digerenda quæ coeunt sub autore Medo, quod habet cere P. *. 3. pannacis P. *. semis, squamæ aris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum P. I. *. plumbi combusti P. I. *. & semis.

Malagma Panthemi ad eadem.

Ad eadē Panthemus utebatur, calcis P. *. semis, sinapis contriti, item fœni Græci, aluminis, singulorum P. I. *. seu bubuli P. I I. *. & semis.

Malagma ad strumas.

Ad strumâ multa malagmata inuenio. Credo autē quo peius id malū est, minusq; sc-

cile discutitur, eo plura esse tentata, quæ in personis varie responderunt. Andreas autor est, ut hæc misceantur, vrticæ seminis p. i. *. piperis rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, resinæ aridæ, singulorum p. iiii. *. resinæ liquidæ, ceræ, pyrethri, piperis logi, lactucæ marinæ seminis, sulphuris ignem non experti (quod ἀπυρον vocatur) fecis aridæ, aceti, spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex
 *P. v. cucumeris sylvestri, resinæ, singulorum p. *. viii.
 *. Quæ ex leni vino contunduntur.

Aliud malagma ad idem valens.

aliàs: feline, ster-
 oris. Legē
 um fortal
 vel capri
 i, vel bo
 illi ex Ga
 no de
 rumis.

EXpeditius ad idem fit, quod habet visci, *felini stercoris, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris. p. i. *. lapidis, quem pyriten vocant p. iiii. *. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eiusdem pars vna, sulphuris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

Malagma ad strumam, & phymata.

ARabis autem cuiusdam est ad strumam, et orientia tubercula, quæ φυμαξ vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum p. i. *. lapidis eius, quem πυρίτην vocant, p. iiii. *. quibus quidam adiiciunt, sulphuris p. ii. *.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

Est etiam proficiens in struma, et in his tuberculis, quæ difficiliter concoquuntur, & in his

in his quæ carcinodæ vocantur, quod ex his constat: Sulphuris P. II. *. nitri P. IIII. *. myrrhæ P. VI. *. fuliginis, thuris P. *. semis, salis ammoniaci P. *. I I I. cere P. I. *.

Malagma Protarchi ad parotidas, & faunm,
& mala vlcera.

Protarchus autē ad parotidas, eaq; tubercula, quæ meliceria, id est, faui, vel phymata nominantur, item mala vlcera, punicis, resinæ pineæ liquide, thuris, fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum P. VIII. *. cum cere P. IX. *. miscebat, hisq; olei cyathum, & dimidium adijciebat.

Malagma, aduersus panum & phymata.

Ad aduersus panum, tum primum orientem (quod φύγεδλον Græci vocant) & omne tuberculum, quod phyma nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum duabus partibus simile, hisq; contunditur, subinde mel instillatur, donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Discutit etiam omne tuberculū (quod phyma vocatur) id quod habet calcis, nitri spumæ, piperis rotundi, singulorum P. I. *. galbani P. II. *. salis P. IIII. *. quæ excipiuntur cerato ex rosa factō.

Malagma ad suppressendum omne quod abscedit.

Supprimitq; omne quod abscedit id, in quo est galbani, subæ* fresæ, singulorum P. I. *. *frixæ myrrhæ, thuris, ex radice capparis corticis, singulorum P. IIII. *. Satisq; omnia abscedentia q 4 digerit,

digerit, murex combustus, & bene contritus,
aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem suppressendum,
& phymata.

AT si satis sanguis subit, rectè imponitur
quod aduersus phymata quoq; potest. Con-
stat ex his, bdellij, styracis, ammoniaci, galbani,
resinae & aridae & liquidae pineae. Item ex len-
tisci, thuris, iridis, singulorum P. II. *.

Malagma ad carcinodas, & & phyma-
ta lenienda.

Carcinodae verò & phymata commodè his
leniuntur: Galbani, visci, ammoniaci, resi-
nae terebinthinae in singulis P. I. *. seu taurini
P. *. semis, fecis combustae quàm maxima por-
tione, dum id siccius non faciat, quàm esse ma-
lagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusae.

Quod si facie cõtusa liuor subcruentus est,
haec cõpositio nocte & die imposita tol-
lit: Aristolochiae, thapsiae, singulorum P. II. *.
bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galba-
ni, resinae aridae, & ex lentisco liquidae, thuris
masculi, iridis illyricae, cera, singulorum P. IIII.
*. Item faba quoq; imposita proficit.

Malagmata stomachica ad aperiendum.

Sunt etiam quaedam malagmata, quae soma-
tica Græci vocant, quoniam aperiendi vim
habent. Quale est quod ex his constat, piperis
longi, spumae nitri, singulorum P. II. *. erisimi
P. *. IIII. quae cum melle miscentur. Idoneaq;
etiam

etiam struma aperienda sunt eius generis. *Vehe-*
mentiusq; ex his est id quod habet calcis p.iiii.
 * piperis grana sex, nitri, cere, singulorum p.
 x. * mellis p. * .3. olei heminam.

Miconis malagma, ad resoluendum aperi-
 dumq; ac purgandum.

MIconis quoq; est quod resoluit, aperit,
 purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitru,
 pumicem, paribus portionibus, quibus tantum
 picis, & cere adijcitur, ut fiat cerati crassi-
 tudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

AD ossa autem Aristogenis, fit ex his, sul-
 phuris p. i. * . resinae terebinthinae, nitri
 spuma, & ex scilla partis interioris, plumbi elo-
 ti, singulorum p. ii. * . thuris, fuliginis p. viii. * .
 ficus arida quam pinguisima, seu taurini, sin-
 gulorum p. viii. * . cere p. xi. * . iridis Mace-
 donica p. vi. * . sesami fricti acetabulum, ma-
 ximeq; nervis, & articulis malagma conuenit.

Malagma Euticlei ad articulos, & ad
 omnem dolorem.

Igitur Euticlei est, & ad articulos, & ad o-
 mnem dolorem, & ad vesicae, & ad recenti
 cicatrice contractos articulos, quas αγκύλας
 Graci nominant, quod habet fuliginis, thuris ace-
 tabulum, resinae tantundem, galbani sine surculis
 fescunciam, ammoniaci, bdellij, singulorum p. * .3.
 cere p. * . semis. Aliud item fit, quod habet iri-
 dis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum p. xiiii.
 * . resina liquida p. vi. * . cere p. xvi. * .

Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.

Ad dolores articulorum Sofagoræ: Plumbi combusti, papaueris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seui, resine, cæra, partes portiones.

Chrysippi malagma, ad idem valens.

Chrysippi, resine liquidæ, sandaracæ, piperis, singulorum P. XII. *. quibus cæra paulum adijcitur.

Ctesiphon
is

*Ctesiphontis malagma ad idem valens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.

Ctesiphontis, cæra Creticæ, resine terebinthine, nitri quàm ruberrimi, singulorum P. *. semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum antè per triduum instillata aqua teritur, et cum sextario eius incoquitur, donec omnis humor consumatur. Potest verò ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemq; coitum humoris emolliendum.

Malagma ad articulos.

Ad articulos fici quoq; aridi, partem nepetæ mistam vel vuam taminiam sine seminibus cum pulegio rectè aliquis imponit.

Malagma Aristonis, aduersus podagras, & recentia phymata, & omnes dolores.

Eadem podagræ presidio sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoq; quod habet nardi, cinnamomi, castiæ, chamaeleontis, iunci rotundi, singulorum P. VIII. *. seui caprini ex irino liquidati P. XX. *. iridis P. I. *. quæ in aceto quàm acerrimo iacere per xx. dies debet. Idem autem etiam

tiam recētia phymata doloresq; omnes discutit.

*Theofeni malagma, ad pedum dolores.

*Theoni

AT Theofenus ad pedum dolores, seui à renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisq; membranulam illitam imponebat, tum superinijciebat ammoniacum, thymia-
ma in aceto liquatum.

Numenij malagma, ad podagram, cæte-
rosq; articulos induratos.

AT Numenius podagram, cæterosq; articu-
los induratos hoc mollebat: abrotani, rosæ
aride, papaveris lacrymæ, singulorum P. III. *.
resinæ terebinthine P. IIII. *. thuris, spuma ni-
tri, singulorum P. VIII. *. iridis, aristolochiæ, sin-
gulorum P. XII. *. cæræ P. III. *. quibus adijci-
tur cedri cyathus unus, olei laurini cyathi tres,
olei acerbi sextarius.

Dexij malagma, si quando callus in
articulis increvit.

SI quando autem in articulis callus increvit,
Dexius docuit imponere, calcis P. IIII. *.
ceruse P. VIII. *. resinæ pineæ P. XX. *. piperis
grana P. XX. cæræ P. II. *. Quibus dum contur-
duntur, hemina vini lenis instillatur.

DE E M P L A S T R I S.

C A P. XIX.

EX emplastris autem nulla maiorem usum
præstat, quàm quæ cruentis protinus vul-
neribus injiciuntur, ἐναιμα Greci vocant. Hæc
enim reprimunt inflammationem (nisi magna
vis eam cogit) atq; illius quoque impetum mi-
nuunt,

nunt, cum glutinant vulnera, quæ id patiuntur, cicatricem iisdem inducunt. Constant autem ex *aliparæ medicamentis non pinguibus, ideoq; *alipenæ nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus iniscitur.

Optimum ex his est, quod Barbarum vocatur. Habet æruginis rase p. XII. *. spumæ argenti p. XX. *. aluminis, picis aride, resine pineæ, aride, singulorum p. I. *. quibus adiungitur olei & aceti singule hemine.

Choacon emplastrum nigrum, ad idem valens.

Alterum ad idem, quod χόανον vocant, habet spumæ argenti p. C. *. resine aride tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est, qui fere talis fit ex pice atq; resina. At ex bitumine nigerrimus: ex ærugine, aut æris squama, viridis: ex minoruber, ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Pauce admodum cōpositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ varietas novat. Ergo id quoq; nigrum est, quod Basilicon nominatur. Habet panacis p. I. *. galbani p. II. *. picis, & resine singulorū p. X. *. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum nigrum ad idem.

At quod peruiride est, smaragdinum appellatur, in quo sunt resine pineæ p. III. *. cere p. I. *. æruginis p. *. semi, thuris fuliginis p. II. *. olei tantundem, & aceti, quo fuligo

go & erugo in vnum cogantur.

Emplastrum rufum ad idem.

Est etiam coloris fere ruffi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris P. I. *. resinae P. II. *. squamae aris P. III. *. spuma argenti P. XX. *. cere P. C. *. olei heminam.

παρεκολλητικόν emplastrum ad idem.

Preterea est, quod παρεκολλητικόν glutinando vocant. Constat ex his: Bituminis, aluminis scissilis P. IIII. *. spuma argenti * P. * P. XL. IIII. *. & olei veteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.

Preterea sunt quedam generis eiusdem, quae quia capitibus fractis maxime conueniunt, Cephalica à Grecis nominantur. Philotæ compositio habet: Terræ * eretrie, chalcitidis, singulo- * Ery- rum P. IIII. *. myrrhae, aris combusti P. X. *. thrae ichthyocollae singulorum P. VI. *. aeruginis rase, aluminis rotundi, misyos crudi, aristolochiae, singulorum P. VIII. *. squamae aris P. XX. *. thuris masculi P. II. *. cere P. I. *. rose, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

Emplastrum viride ad idem valens.

Aliud ad idem viride, aris combusti, squamae aris, myrrhae, ichthyochellae, singulorum P. VI. *. misyos crudi, aeruginis rase, aristolochiae, aluminis rotundi, singulorum P. VIII. *. cere * P. VII. *. olei hemina, aceti quod satis sit. * P. I.

Tetra

Tetrapharmacum emplastrum, ad pus mouendum.

Puri autē mouendo non aliud melius, quā
quod expeditissimum est, Tetrapharmacum
à Græcis nominatur. Habet pares portiones cera,
pici, resinae, seu taurini, si id non est, vitulini.

Enneapharmacum emplastrum ad pus mo-
uendum, & ad purgandum valens.

Alium ad idem Enneapharmacum no-
minatur, quod magis purgat. Constat ex
nouem rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha,
rosa, medulla vel ceruina, vel vitulina, vel bu-
bula, hyssopo, butyro. Quorū ipsorum quoq; pon-
dera paria miscentur. Sunt autem quaedam em-
plastra, quibus vtriusq; rei facultas est, quæ si
singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia
reijcienda sunt, his potius adhibitis, quæ proprie
id, quod eo tempore opus est, consequuntur. E-
xempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad vulnera.

Est igitur ad vulnera Attalum, quod habet
* P. VI. squamæ eris * P. xvi. * fuliginis P. xv. *.
ammoniacy tantundem, resinae terebinthinae li-
quide P. xxv. *. seu taurini tantundem, aceti
heminas tres, olei sextarium.

Iudæi emplastrum, fracto capiti accommodatum.

At inter ea quæ fracto capiti accommo-
dantur, habent quidam id quod ad au-
torem Iudæum refertur. Constat ex his, salis
P. *. iiii. squamæ eris rubri, eris combusti, sin-
gulorum P. xii. *. ammoniaci, thymiamatis,
thuris, fuliginis, resinae aridae, singulorum P. vi.

*. res.

*.resinae Colophoniace, cerae, seui vitulini curati, singulorum P. XX. *. aceti sesquicyathum, olei minus cyathum, τελεγαπσυμείν Græci appellant, quæ curata vocant, cum ex seuo, puta o- Curata.
mnes membranula diligenter exemptæ sunt aut ex alio medicamento.

Dia daphnidon emplastrum, ad extrahendum.
Sunt etiam quedam emplastra nobilia ad extrahendum. Quæ ipsa quoq; ἐπισπαστικά nominantur. Quale est, quod quia lauri baccas habet, dia daphnidon appellatur. In eo est, resinæ terebinthinae P. X. *. nitri, cerae, picis aride, baccarum lauri, singulorum P. XX. *. olei paulum. Quoties aut baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.

Aliud dia daphnidon ad extrahendum,
& pus mouendum.

Aliud eo nomine, quod puri quoq; mouendo est: Seui vitulini, ammoniaci, thymiamatis, picis, cerae, nitri, baccarum lauri, resinæ aride, aristolochiæ, pyrethri, pares portiones.

Philocratis emplastrum ad extrahendum,
& pus mouendum.

Preter has, est Philocratis, quod habet salis ammoniaci P. VII. *. aristolochiæ P. VIII. *. cerae, resinæ terebinthinae, fuliginis, thuris, singulorum P. XV. *. spumæ argenti. *P. LII. *P. XXXI
*. Quibus ut pus quoq; moueant, iridis P. IIII.
*. & galbani P. VI. *. adijciuntur.

Rhypodes emplastrum, ad extrahendum.

Optimum

Optimum tamen ad extrahendum est id quod à similitudine sordium $\pi\alpha\pi\omega\delta\epsilon\varsigma$ Graeci appellant. Habet myrrhae, croci, iridis, propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis & rotundi, misyos, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis ammoniaci, visci, singulorum P. IIII. *. aristolochiae P. VIII. *. squamae aris P. XVI. *. resinae terebinthinae P. LXXV. *. cerae, & seui vel taurini, vel hircini P. C. *.

Emplastrum Hecarçi, ad extrahendum.

Hecatæo quoq; autore emplastrum generis eiusdem fit ex his, galbani P. II. *. fuliginis thuris P. IIII. *. picis P. VI. *. cerae, & resinae terebinthinae, singulorum P. VIII. *. quibus paulum irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum viride, ad extrahendum.

Valensq; ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis P. VIII. *. salis ammoniaci P. *. VIII. 3. squamae aris P. XVI. *. myrrhae, thuris, singul. P. XVIII. *. cerae P. CL. *. resinae Colophoniaceae, aut pineae

* P. C. C. * P. CXC. *. olei heminam, aceti sextarium.

De emplastris exedentibus.

Quædam autem sunt emplastra exedentia, quæ $\sigma\alpha\pi\sigma\iota\eta\alpha$ Graeci vocant, quale est id quod habet resinae terebinthinae, fuliginis thuris, singulorum P. *. 3. squamae aris P. I. *. ladani P. II. *. aluminis tantundem, spumæ argenti P. IIII. *.

Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit, & supererescentem carnem coërect.

Exest

EXest etiam vehementer corpus, atque ossa quoque; resoluit, & supercrescentem carnem coercet, id quod habet spumæ argenti, squamæ aris, uncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis Asij, aristolochiæ p. sextantes, cera, resina terebinthina, thuris, olei veteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci p. semis, eruginis rasæ p. bessem, aceti stillitici heminam, uini aminei tantundem.

Emplastra aduersus morsus, & alia recentiora vulnera.

Sunt etiam aduersus morbus quædam accommodata, quale est Diogenis nigrum, quod habet bituminis, cera, resina pineæ aridæ singulorum p. xx. *. spumæ argenti p. c. *. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ aris p. iiii. *. cerussæ, & eruginis rasæ, singulorum p. viii. *. ammoniaci p. xii. *. cera, resina pineæ, singulorum, p. xxv. *. spumæ argenti p. c. *. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ aris p. xiiii. *. galbani p. vi. *. cerussæ, & eruginis rasæ, singulorum p. viii. *. ammoniaci p. xii. *. cera, resina pineæ, singulorum p. lv. *. p. xl v. ex quibus spuma argenti concoquitur.

Ephesium emplastrum rubrum, ad idem valens.

Rubrum quoque emplastrum quod Ephesum vocatur huc aptum est. Habet resina terebinthina p. ii. *. galbani p. *. iiii. minij sinopici p. vi. *. thuris fuliginis p. vi. *. cera p. viii. *. spumæ argenti p. lvi. *. olei veteris heminam.

Aliud

Aliud emplastrum ad idem valens.

Item id quod ex his constat, squamae eris, thuris fuliginis, singulorum P. I I I I. *. galbani P. VI. *. salis ammoniaci P. *. X I I. .3 cere P. X X V. *. olei tribus heminis. Hæc autem alijs quoq; recetioribus vulneribus recte imponuntur.

Αὐτὰ ἐμπλάστρα non grauib; vulneribus accommodata, & maxime senilibus.

Sunt enim alba lenia, λευκὰ Græci vocant, serè non grauib; vulneribus accommodata, præcipueq; senilibus. Quale est quod habet P. X X X cerussæ * P. L I I. *. seu vitulini curati, & cere, singulorum P. L V I I I. *. olei heminas tres, ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Aliud quod habet cerussæ P. X X. *. cere P. XXXV. *. P. L V. *. olei heminam, aquæ sextarium. Quæ quoties adiiciuntur cerussæ, vel spumæ argenti, scire licet illa ex his coquenda esse. Est autem ea percandida compositio, quæ suprâ posita est, ideoq; elephantina nominatur.

Lenia emplastra.

Lenia quoq; quedam emplastra sunt, quas λευκὰ serè Græci nominant, ut id quod habet minij P. I I I I. *. spumæ argenti P. X X V. *. cere, & adipis suillæ, singulorum P. X X V I I. vitellos quatuor.

Emplastrum leno.

Alia compositio generis eiusdem, cere, resine terebinthinae, singulorum P. VI. *. P. VII I. cerussæ * P. V I. *. spumæ argenti, plumbi recrementi,

menti, scoriam molybdi Græci vocant, singulorū
P. XX. cicini olei, & myrti, singulorum hemina.

Archaghati emplastrum lene.

Tertia quæ ad autorem Archaghatum re-
fertur, Misysos cocti, aris combusti, sin-
gulorum, P. IIII. *. cerussæ coctæ P. VII. *.
resinæ terebinth. P. X. *. spumæ argenti P. VI. *.

Emplastra eiusdem generis ad lenien-
dum apta.

Etiamnum generis eiusdem, spumæ argen-
ti, cæra, adipis suillæ, singulorū P. XXVII.
*. vitelli cocti, rosæ hemina. Aut cerati ex oleo
myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quar-
ta, paulum ex plumbi recremento. Aut spumæ
argenti selibra, ex olei hemina, & aquæ marinæ
altera cocta donec bullire desierit, cui paulum
cæra sit adiectum, aut pares portiones cæra, se-
ui, stibi, spumæ argenti, cerussæ.

De pastillis, & primo de his qui ad recētia vulnera
glutinanda, sanandāq; apti sunt. CAP. XX.

Pastilli quoq; facultates diuersas habent.
Sunt enim ad recentia vulnera glutinan-
da, sanandāq; apti. Qualis est qui habet chalcitis,
misysos, spumæ nitri, floris aris, gallæ, aluminis
scissilis modice cocti, sing. P. I. *. aris combusti,
capitulorum mali punici, singulorum P. III. *.
Hunc oportet diluere aceto, sic ubi vulnus glu-
tinandus est, illinere. At si neruosus aut muscu-
losus is locus est, commodius est cerato miscere,
sic ut illius octo partes, nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

7 3

Alius

Alius ad idem constat ex his, bituminis, aluminis scissilis, singulorum p. i. *. aeris combusti p. i i i i. *. spume argenti p. x i. *. olei sextario.

De sphragide pastillo, quem Polybus confecit ad glutinandum vulnus.

Sed longe Polybi celeberrimus est, Sphragidis autem nominatur, qui habet aluminis scissilis p. *. i. 3. atramenti sutorij p. i i. *. myrrhe p. v. *. aloës tantundem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum p. v i. *. Quæ contrita vino austero excipiuntur.

Pastillus ad vlcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscænis partibus, inflammationesq; eorum.

Ad vlcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscænis partibus, inflammationesq; eorum: Chrysocollæ p. i. *. atramenti sutorij, aluminis scissilis, sing. p. i i. *. halicacabi corticis p. i i i i. *. minij p. v i. *. spume argenti p. x i i. *. cerussæ p. x v i. *. Quæ ex aceto & coguntur, & ubi vtendum est, diluuntur.

Pastillus Andronis ad vuam inflammata, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.

Andronis verò est ad vuam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia: Gallæ atramenti sutorij, myrrhe, singulorum* p. i. *. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum p. i i. *. capitulorum punici mali p. x x v. *. ex passò coactorum, & (cum vsus exigit) aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut lenius

lenius vitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum funden-
tia sanguineam vel cancrum.

Propriè autem ad ani fissa, vel ora venarum
fundentia sanguineam, vel cancrum: Aeru-
ginis P. I I. ✱. myrrhæ P. X I I. ✱. stibis, lacrymæ
papaveris, acaciæ singulorum. P. X V I. ✱. Quæ ex
vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum
cum vrina.

Expellere autem ex vesica cum vrina cal-
culum videtur hæc compositio: Casiæ, cro-
ci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radi-
cis, balsami, hyperici pares portiones conterun-
tur, deinde vinum lene instillatur, & pastilli
fiunt, qui singuli habeant P. ✱. 3. hiq; singuli
quotidie mane ieiuno dantur.

De pefsis.

C A P. XXI.

Hæc tria compositionum genera, id est,
quæ in malagmatis, pastillis, emplastrisq;
sunt, maximum, præcipueq; varium usum præ-
stant. Sed alia quoq; utilia sunt, ut ea quæ sæmi-
nis subiiciuntur (πέσας Græci vocant.) Eorum hæc
proprietas est: Medicamenta composita molli lana
excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandum, cauneis
duabus adijcitur nitri* P. I. ✱. aut allij se- * P.
men conteritur, adijcitur myrrhæ paululum, &
unguento susino miscetur, aut cucumeris sylue-
stris pars interior, ex lacte muliebri diluitur.

r 3

Ad

Ad vuluam molliendam.

AD vuluam molliendam, oui vitellus, & fœnum Gracum, & rosa & crocum temperantur. Aut elaterij p. x. 3. salis tantundem ruae taminie p. v. i. x. melle excipiuntur.

Alia pessii compositio ad idem valens.

AUtem Boëtho autore, croci, resinæ terebinthinae, singulorum p. x. i. i. i. i. myrrhæ p. x. 3. rosa 8. i. x. seu vitulini p. x. 3. cera p. i. i. x. miscentur.

Ad inflammationes vuluæ Numenij pessus.

Optima autem aduersus inflammationes vuluæ, Numenij compositio est, quæ habet croci p. x. 3. cera p. i. x. butyri p. v. i. i. i. x. adipis anserini p. x. i. i. x. vitellos coctos duos, rosa minus cyatho.

Ad eijciendum è vulua infantem mortuum.

SI verò infans intus decessit, quo facilius seijciatur, malicorium ex aqua terendum, eoq; vtendum est.

Si mulier vitio locorum concidit, qua curatione vtendum sit.

SI concidere vitio locorum mulier solet, co-
schleæ cum testis suis comburenda, contere-
ndaq; deinde his mel adijciendū est. Si non com-
prehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis vtimur.

C A P. XXII.

Ad carnem supercrescentem exedendam.

QUædam autem misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neq; coactis vtimur, sic vt inspergamus, aut cum aliquo liquido mista

mixta illinamus, quale est ad carnem supercre-
scentem exedendam, quod habet squamæ, fuligi-
nis thuris, singulorum p. i. *. æruginis p. i. i. *.
Hæc autē eadem cum melle purgant vlcera, cum
cera implēt. Misy quoq; et galla, si paribus por-
tionib. misceatur, corpus consumūt, eaq; vel ari-
da inspergere licet, uel excepta cadmia, illinire.

Ad putrem carnem continendam, ne vltra serpat,
eāq; leniter exedendam plures compositiones.

Putrem vero carnē continet, neq; vltra ser-
pere patitur, & leniter exest, mel, vel cum
lenticula, vel cum marrubio, vel cum oleæ folijs,
antē ex vino decoctis. Item sertula campana in
mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cera-
to, aut amara nuces cum allio, sic vt huius pars
tertia sit, paulumq; his croci adijciatur. Aut
quod habet spumæ argenti p. v. i. *. cornu bubuli
combusti p. x. i. i. *. olei myrtei, & vini cyathos
ternos. Aut quod ex his constat: Floris punici
mali, atramenti sutorij, aloës, singulorū p. i. i. *.
aluminis scissilis, thuris singul. p. i. i. i. i. *. gallæ
p. v. i. i. i. *. aristolochiæ p. x. *. Vehementius
idem facit etiam adurendo auripigmentum cum
chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta
combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio
quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali,
aloës, singulorum p. i. i. *. aluminis scissilis, thu-
ris, singulorū p. i. i. i. i. *. gallæ p. v. i. i. i. *. ari-
stolochiæ p. x. *. mellis quantū satis sit ad ea co-
genda. Vel cantharides p. i. *. sulphuris p. i. *.
r 4 lolij

loliij p. i i i. *. Quibus adijcitur picis liquida quantum satis est, adiungendum mel, chalcitis quoq; cum resina & ruta mista, aut cum eadem resina diphryges, aut vna taminia, cum pice liquida. Idem verò possunt feces vini combustæ, & calcis, & nitri pares portiones, vel aluminis scissilis p. *. 33. thuris, sandaracæ, nitri, singulorum p. *. i. gallæ p. v i i i. *. aristolochiæ p. x. *. mellis quantum satis est.

Hieræ compositio.

Est etiam Hieræ compositio quæ habet myrrha, chalcitidis, singulorū p. i i. *. aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum p. i i i i. *. aristolochiæ, gallæ immaturæ, singul. p. v i i i. *.
p. x. mali corij contriti p. x x. *.

Iudei compositio.

Est & Iudei, in qua sunt calcis partes due, nitri quàm ruberrimi pars tertia, quæ urina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madesaciendus est.

Iollæ compositio.

At Iollas, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum p. i. *. calcis p. i i. *. auripigmenti tantundem miscebat.

Ad sanguinis profluvia vel ex mēbrana cerebri, vel alijs locis, & ad cancrū, & ad inducendam cicatricē, & ad coërcendam carnē crescentem.

Si verò ex membrana, quæ super cerebrū est, profluit sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet, si alio loco sanguinis profluvium

fluuium est, auripigmenti, squamæ aris, singulorum P. I. *. sandaracæ P. II. *. marmoris cocti P. I I I I. *. inspergi debet. Eadem cancro quoq; obsistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ aris, thuris fuliginis, sing P. I I. *. calcis P. I I I I. *. Eadem incrementem quoq; carnem coërcent.

Timæi compositio ad ignem sacrum
vel cancrum.

Timæus autem ad ignem sacrum, vel ad cancrum his utebatur, myrrhæ P. I I. *. thuris, atramenti sutorij, singulorum P. I I I. *. sandaracæ, auripigmenti, squamæ aris, singulorum P. I I I I. *. gallæ P. V I. *. cerussæ combustæ P. V I I I. *. Eadē vel arida inspersa, vel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta verò vel albo veratro, vel struthio coniecto in nares excitantur, vel his mistis, piperis, veratri albi, singulorum P. *. 3. castorei pondo I. *. spumæ, nitri P. I I. *. struthij P. I I I. *.

Gargarizationes quibus fieri
debeant.

Gargarizationes autem aut leuandi causa sunt, aut reprimendi, aut euocandi. Leuant lac, cremor, vel ptisane, vel furfurum. Reprimunt aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulæ decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

r 5 De

De antidotis, & quibus malis opitulentur.

C A P. XXIII.

Antidota raro, sed precipue interdum necessaria sunt, quia grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorumq; partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus uenena, uel per morsus, vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

VNum est quod habet lacrymæ papaueris p. .x. 3. acori malobatri p. v. .x. iridis illyricæ, gummi, singulorum p. i i .x. anisi p. i i i .x. nardi gallici, foliorum rosæ aridorum, cardamomi, singulorum p. i i i i .x. petroselini p. .x. i i i i .3. trifolij p. v. .x. casie nigre, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, sing. p. .x. 3. styracis p. .x. v. 3. myrrhæ, opoponacis, nardi syri, thuris masculi, hypocistidis succi, sing. p. v i .x. castorei p. v i .x. costi, piperis albi, galbani, resine terebinthinæ, croci, floris iunci rotundi, singulorum p. .x. v i .3. dulcis radicis p. v i i i .x. 3. Quæ vel melle vel passo excipiuntur.

Aliud antidotum Ambrosia nominatū, quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.

Alterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse, atq; Ambrosiam nominasse, ex his constat: Costi, thuris masculi, singulorum p. v. .x. piperis albi p. .x. 3. floris iunci rotundi p. i i .x. cinamomi p. i i i .x. casie nigre

R.

P. I I I I. *. croci Cilicij P. *. I I I I. 3. myrrhæ
quam staeten nominat P. V. *. nardi indici P. *.
V. 3. Quæ singula cōtrita melle cocto excipiuntur.
Deinde ubi utendū est, id quod Aegyptiæ faba
magnitudinē impleat in portione vini diluitur.

Antidotum Mithridatis.

Nobilissimum autem est Mithridatis, quod
quotidie sumendo rex ille dicitur aduer-
sus uenenorum pericula tutum corpus suum red-
didisse. In quo hæc sunt, costi P. *. S. 3. acori
P. V. *. hyperici, cumini, sagapeni, acaciæ succi,
iridis Illyricæ, cardamomi, singulorum P. I I. *.
anisi P. I I I. *. nardi gallici, gentianæ, radi-
cis, aridorum rosæ foliorum, singulorum P. I I I I.
*. papaueris lacrymæ, petroselini, singulorum
P. *. I I I I. 3. casie, sili, lolij, piperis longi, sin-
gulorum P. V I. *. styracis P. *. V. 3. castorei,
thuris, hypocistidis succi, myrrhæ, opopanax,
singulorum P. V I. *. malobathri folij P. V I. *.
floris iunci rotundi, resinæ terebinthinæ, gal-
bani, dauci cretici seminis, singulorum * P. *. V. * P. *. V I.
3. nardi, opobalsamum, singulorum P. *. V I. 3.
thlaspi P. *. V. 3 3. radice pontica P. V I I. *.
croci, Zingiberis, cinnamomi, singulorum P.
*. V I I I. 3. Hæc contrita melle excipiuntur,
& aduersus venenum, quod magnitudinem nu-
cis Græcæ impleat, ex vino datur. In ceteris au-
tem affectibus corporis pro modo eorum, vel
quod Aegyptiæ fabæ, vel quod erui magnitu-
dinem impleat, satis est.

DE ACOPIS.

Acopum nervis utile. CAP. XXIIII.

A Copa quoque utilia nervis sunt. Quale est quod habet floris iunci rotundi P. * . I I . 33. costi, iunci quadrati, lauri baccarū, ammoniaci, cardamomi, sing. P. * . I I I I . 3. myrrhæ, æris combusti, singulorum P. * . V I I . iridis illyricæ, ceræ, singulorum P. I I I I . *. alexandrini calami, iunci rotundi, aspalathi, xylobalsami singulorum P. X V I I I . *. seui P. I . *. unguenti irini cyathum.

Acopum Euodes nervis utile.

* ἐλαίω-
δες

A Lterū quod * ἐὺὼδες vocāt, hoc modo fit, ceræ P. * . 3. olei tantūdem, resinæ terebinthinæ ad nucis iuglandis magnitudinē simul incoquuntur, deinde infusa in mortario teruntur, instillaturq; subinde quā optimi mellis acetabulum, tum irini unguenti, & rosæ terni cyathi.

Enchrissa ad vlcera purganda & implenda.

E Ἐγχρίσσις autem Græci vocant liquida quæ illinuntur. Quale est quod fit, ad vlcera purganda, & implenda maxime inter nervos, paribus portionibus inter se mistis, butyri, medulle vitulinæ, seui vitulini, adipis anserinæ, ceræ, * cilini mellis, resinæ terebinthinæ, rosæ, olei * cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis verò emollit, si pro rosâ cyprus infunditur.

Ad sacrum ignem.

A D sacrum ignem spumæ argenti P. V I . *. cornu bubuli combusti P. I I . *. conteruntur,

tur, adijciturq; inuicem vinum, & id quod specialiter sic vocatur, & myrteum, donec vtriusq; terni cyathi conficiantur.

De Catapotiiis.

CAP. XXV.

Catapotium ad somnum accersendum, & leuationem doloris, & simul ad coquendum.

Catapotia quoque multa sunt, varijsq; de causis fiunt. Anodyna vocant, quæ somno dolorem leuant. Quibus vti, nisi nimia necessitas vrget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaueris lacrymæ, galbani, singulorum p. i. ✱. myrrhæ, castorei, piperis p. ii. ✱. Ex quibus quod erui magnitudinem habet, satis est deuorasse.

Catapotium valentius ad somnum.

Alium stomacho peius, ad somnum valentius ex his fit, mandragoræ p. ✱. 3. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulorum p. iiii. ✱. Quæ ex vino teruntur. Vnum autem eiusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde est sumpsisse.

Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Sive autem capitis dolores, siue vlcera, siue slippitudo, siue dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta, siue inflammatio vuluæ est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue vitio locorum aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrit dolori per quietem eiusmodi catapotium: Silij, acori, rutæ syluestris seminis,

nis, singulorum p. i. ✱. castorei, cinnamomi, singulorum p. i. i. ✱. papaueris lacryma, panacis, radicis mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum p. i. i. ✱. piperis grana l. v. i. Hec per se cōtrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapodium aliud ad multa valens.

Quinetiam syluestris papaueris cum iam ad excipiendam lacrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, que id contegat, atq; ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proicitur, & cum eo humore, passi pari mēsurā miscetur, inferuetq; donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapodia ex eo fiunt, ad nostræ fabæ magnitudinem, habentq; vsum multiplicē. Nam & somnū faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data, & aurium dolores leuāt, adiectis exiguo modo rutæ succo, ac passi. Et tormina supprimunt ex vino liquata, & inflammationē vuluæ coërcent, mista cerato ex rosa factō, cum paulum his croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentē tenent.

Catapodium ad inducendum somnum, quod vulua dolens prohibuit.

Item si vulua dolens somnum prohibuit, croci p. i. i. ✱. anisi, myrrhæ, singulorum p. i. ✱. papaueris

pauers lacryma p. iiii. *. cicutæ seminis p. viii. *. miscentur, excipiunturq; vino vete-
re, & quod lupini magnitudinem habet in tri-
bus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre pe-
riculose datur.

Ad iecur sanandum.

Ad sanandū iecur nitri p. *. 3. croci, myr-
rha, nardi Gallici, singulorum p. i. *. mel-
le excipiuntur, daturq; quod Aegyptiæ fabæ
magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

Ad lateris dolores finiendos, piperis, ari-
stolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

Ad thoracis, nardi p. i. *. thuris, casie, sin-
gulorum p. i. *. myrrhæ, cinamomi sin-
gul. p. vi. *. croci p. v. i. *. resinæ terebin-
thine quadrans, mellis hemina tres.

Catapodium Athenionis ad tussim.

Ad tussim Athenionis, myrrhæ, piperis,
singulorum p. i. *. castorei, papaueris la-
cryma, singulorum p. i. *. Quæ separatim con-
tusa, postea iunguntur, & ad magnitudinem
fabæ nostræ, bina catapodia mane, bina nocte
dormituro dantur.

Catapodium Heraclidis Tarentini, ad
tussim, & somnum.

Si tussis somnū prohibet, ad utrūq; Heraeli-
dis Tarentini, croci p. i. *. cinamomi, castorei,
papaueris lacryma, singulorū p. i. *. myrrhæ, pi-
peris longi, costi, galbani, singulorum p. *. 3.

Catap

Catapotium ad purganda vlcera in
faucibus tussientibus.

Quod si purganda sunt vlcera in faucibus
tussientibus, panacis, myrrhæ, resine te-
rebinthinæ, singulorum P. V. *. galbani P. *. 3.
hyssopi P. *. 3. conterenda sunt, hisq; hemina
mellis adijcienda, & quod digito excipi potest,
deuorandum est.

Colicę Cassii medici.

Colica verò Cassij ex his constat, croci, ani-
si, castorei, singulorum P. I I I. *. petrose-
lini P. I I I. *. piperis et longi, & rotundi, sin-
gulorum P. V. *. papaueris lacrymæ, iunci rotun-
di, myrrhæ, nardi, singulorum P. V I. *. Que
melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest,
& ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum aut secundas impellendas.

Infantem verò mortuum, aut secundas expel-
lit aquæ potio, cui salis ammoniaci P. I. *. aut
cui dictami Cretici P. I. *. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

Ex partu laborantibus erisimum, ex vino
tepidio ieiunæ dari debet.

Ad adiuuandum vocem.

Vocem adiuuat thuris P. I. *. in duobus
cyathis vini datum.

Aduersus difficultatem vrinę.

Aduersus vrinę difficultatem, piperis lon-
gi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris la-
crymæ, croci, costi vnciæ singule, styracis, resine
terebinthinæ pondo sextates, mel, absinthij cya-
thus.

chus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ Aegyptiæ, & manè, & cænato dari debet.

Arteriaces compositio quomodo fiat.

Arteriace verò hoc modo fit, castæ, iridis, cinamomi, nardi, myrrhæ, thuris singulorum P. I. ✱. croci P. I. ✱. piperis grana xxx. ex passi tribus sextarijs decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum P. I. ✱. coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquuntur. Aut eiusdem passi hemine tres vsque eò coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adijcitur tri te castæ P. I. ✱.

De quinque generibus noxarum corporis, & primo de vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur.

C. A. P. XXVI.

Cum facultates medicamentorū proposuerim, genera in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra se ipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increuit, ut vena, quæ intumescens, in varicem convertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his, quæ præcipue scalpellum & manum postulant, nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sicut priorem. Et antè dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt.

Tum

Tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiã
 à vulneribus. In his autem ante omnia scire me-
 dicus debet, quæ insanabilia sint, quæ difficilem
 curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim
 prudentis hominis, primum eum qui seruari non
 spem potest, non attingere, nec subire speciem eius, vt
 occisi, quem sors ipsius peremit. Deinde ubi gra-
 uis metus, sine certa tamen desperatione est, in-
 spem dicare necessarijs periclitantis in difficili rem
 esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel
 fefellisse videatur. Sed vt hæc prudenti viro con-
 ueniunt, sic rursus histrionis est, paruum rem at-
 tollere, quò plus præstitisse videatur. Obligariq;
 æquum est, cõfessione promptæ rei, quò curiosius
 etiam circumspectat, ne quod per se exiguum est
 malum, maius curantis negligentia fiat.

Quæ vulnera insanabilia sint.

Seruari non potest, cui basis cerebri, cui cor,
 cui stomachus, cui iocinoris porta, cui in spi-
 na medulla percussa est, cuiq; aut pulmo medius,
 aut ieiunum, aut tenuis intestinum, aut ventricu-
 lus, aut renes vulnerati sunt, cui'ue circa fan-
 glandes, ces grandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt.

vene vel
 arteriæ,
 &c.

Quæ vulnera difficilem curationem habeant.

Vix autem ad sanitatē perueniunt, quibus
 vlla parte pulmo, aut iocinoris crassum,
 aut membrana quæ continet cerebrum, aut lie-
 nis, aut vulua, aut vesica, aut vllum intestinum,
 aut ceptum trāsuersum vulneratum est. Hi quo-
 que in præcipiti sunt, in quibus usque ad gran-
 des

des, intusq; conditas venas, in alis vel poplitibus mucro *desedit. Periculosa etiam vulnera *descēdit. sunt, ubicunq; venæ maiores sunt, quoniam exhaurire hominem, profusione sanguinis possunt. Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his venis, quæ ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel inter digitos est. Item quodcunq; musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.

Tutissimū omniū, quod in carne est, & hæc quidem loco, vel peiora, vel meliora sunt. Modò verò periculū facit, quodcūq; magnū est.

Observationes quædam, & ætatis, & corporis & vitæ, & temporis in vulneribus.

Aliquid etiam in vulneris genere, figuraq; est. Nam peius est quod etiam collisum, quam quod tantum discissum est, adeo ut acuto quoq; , quam retuso telo vulnerari cōmodius sit. Peius etiā vulnus est, ex quo aliquid excisum est, ex quo'ue caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessimaq; plaga in orbem est: tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quò deinde propius huius, illi'ue figuræ vulnus est, eò vel deterius, vel tolerabilius est. Quin etiam confert aliquid ætatis, & corpus, & vitæ propositū, et anni tempus: quia facilius sanescit puer, vel adolescens, quam senior, valēs, quam infirmus: neq; nimis

tenuis, neq; nimis plenus, quàm si alterum ex his est. Integri habitus, quàm corrupti: exercitatus, quàm iners: sobrius, & temperans, quàm vino, & veneri q; deditus. Opportunissimumq; curationi tempus verum est, aut certè neq; feruens, neq; frigidum. Siquidē vulnera & nimius calor, & nimium frigus infestant: maximè tamen horum varietas, ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex vulneribus oculis subiecta sunt, quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstrauimus, cū positis interiorum partium ostendimus. Veruntamen quia quedam vicina sunt, interest quoque vulnus in summa parte sit, an penitus penetrauerit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus, & ex quibus vel spes, vel desperatio oritur.

Signa percussæ cordis.

Igitur corde percussso, sanguis multus effertur, venæ languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, maliq; odoris, tanquam in rotato corpore oriuntur, extremisq; partibus frigidis, matura mors sequitur.

Signa pulmonis icæti.

Pulmone uerò icæto, spirandi difficultas est, sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulq; etiam spiritus cum sono fertur: in vulnus inclinari iuuat, quidam sine ratione consurgunt. Multi si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa

Signa iocinoris vulnerati.

Iocinoris autem vulnerati nota sunt, multus sub dextra parte præcordium profusus sanguis, ad spinam reducta præcordia, in ventrem cubandi dulcedo, punctiones, doloresq; vsque ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum, os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

Signa percussorum renum.

Renibus verò percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit, difficulter urina redditur, eaq; aut est cruenta, aut cruor fertur.

Signa vulnerati lienis.

At liene iclo, sanguis niger à sinistra parte prorumpit, præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt, sitis ingens oritur, dolor ad iugulum, sicut iocinore vulnerato venit.

Signa percussæ vuluæ.

At cum vulua percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. Sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit, vomitus bilis insequitur. Quædam obtumescunt, quædam mente labuntur, quædam sui compotes, neruorum, oculorumq; dolore vrgeri se confitentur, morientesq; tandem, eadem quæ corde vulnerato patiuntur.

Signa percussi cerebri, vel membranæ eius.

In cerebrum, membrana'ue eius vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdā etiam per aures exit, fereq; bilis vomitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur, appellati'que

§ 3

ignor

ignorant. Quorundam trux vultus est, quorundam oculi quasi resoluti, huc atq; illuc mouentur. Fereq; tertio vel quinto die delirium accedit. Multorum etiā nerui distenduntur. Ante mortem autē pleriq; fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori obijciunt.

Signa percussi stomachi.

Vbi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur. Si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito. Venarum motus elanguescunt, sudores tenues oriuntur, per quos extremæ partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.

Communes verò ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati notæ sunt. Nam cibus, & potio per vulnus exeunt, præcordia indurescunt, nonnunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina iccta vel stercus, vel odorem eius exhibent.

Signa percussæ medullæ, quæ in spina est.

Medulla verò quæ in spina est discussa, nerui resoluuntur, aut distenduntur, sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

Signa septi transuersi percussi.

At si septum transuersum percussum est, præcordia sursum contrahuntur, spinadet, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

Signa

Signa vesicę vulneratę.

Vesica verò vulnerata, dolēt inguina. Quod super pubē est, intenditur, pro vrina sanguis, aut ex ipso vulnere vrina descendit, stomachus afficitur. Itaq; aut bilem vomunt, aut singultiunt, frigus, & ex eo mors sequitur.

De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus, quando meliora, deterioraue sint.

His cognitis, etiam nunc quedam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera vlceraq; de quibus dicturi sumus, pertinētia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, et glutinosa, & colorata. Pus crassissimum, albissimumq; glutinosius & sanguine et sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter vtrunq; tempus: Pus ex vlcere iam ad sanitatē spectante. Rursus & sanies, & pus quasdam species Grecis nominibus distinctas habent. Est enim quedā sanies, quę vel ἰχὼρ, vel *meliceria nominatur. Est pus, *μελίμηλον quod ἐλαϊώδες appellatur. ἰχὼρ tenuis, subalbidus ex malo vlcere exit, maximeq; vbi neruo lęso inflammatio secuta est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbida melliq; albo subsimilis fertur. Hęc quoq; ex malis vlceribus, vbi nerui circa articulos lęsi sunt, & inter hęc loca, maxime ex genibus. Ελαϊώδες tenue, subalbidum, quasi vnctum colore atq; pinguitudine, oleo albo non dissimile, adparet in magnis vlceribus

5 4 sanescen

sanescentibus. Malus autē est sanguis nimium
 aut tenuis, aut crassus, colore vel liuidus, vel ni-
 ger, aut pituita mistus, aut varius. Optimus ca-
 lidus, rubēs, modice crassus, nō glutinosus. Itaq;
 protinus eius vulneris expedita magis curatio
 est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itēq; postea spes
 in his maior est, ex quib⁹ melioris generis quæq;
 proueniunt. Sanies igitur mala est, multa, nimis
 tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut gluti-
 nosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus,
 & iunctā ei cutē erodit. Melior non multa, mo-
 dice crassa, subrubicūda, aut subalbida. Itēq; au-
 tem peior est multus, crassus, subliuidus, aut sub-
 pallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris.
 Tolerabilior est subalbidus, qui cætera omnia cō-
 traria prioribus habet. Meliceria autem mala
 est multa, & percrassa, melior quæ & tenuior,
 & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum
 est. Sed id quoq; peius est multum, tenue, dilu-
 tum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore
 sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum
 est. Præter hæc, si male olet, nisi tamen locus
 hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est,
 quo crassius, quo albidius. Itemq; si leue est, si
 nihil olet, si æquale est, modo tamen conuenire,
 & magnitudini vulneris & tēpori debet. Nam
 plus ex maiore, plus nondum salutis inflamma-
 tionibus naturaliter fertur. Eleodes quoq; peius
 est multum, & parum pingue, quo minus etiam,
 quoq; idipsum pinguius, eo melius est.

Curatio

Cūratiō aduersus profusionem sangui-
nis in vulneribus.

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est,
qui seruari potest, protinus prospicien-
da duo sunt, ne sanguinis sit profusio, ne' ve in-
flammatiō interimat. Si profusionem timeamus,
quod ex sede vulneris, & magnitudine eius, &
ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, siccis
linamētis vulnus implendū est, supraq; imponen-
da spongia, ex aqua frigida expressa, ac manu
super comprimenda. Si parum sic sanguis con-
quiescit, saepius linamenta mutanda sunt. Et si
sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id
vehemēs ad sanguinem supprimendū est. Ideoq;
quidam id vulnere infundunt. Sed alius rursus
metus subest, ne nimis valenter ibi retenta ma-
teria magnam inflammationem postea moueat.
Quae res efficit, ut neq; rodentibus medicamen-
tis, neq; adurentibus, & ob id ipsum inducenti-
bus crustam, sit utendum, quamuis pleraq; ex
his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea de-
curritur, potius quae mitius idem efficiunt. Quod
si illa quoq; profluvio vincuntur, venae quae san-
guinem fundunt apprehedendae, circaq; id quod
ictum est, duobus locis deligandae, intercidendaeq;
sunt, ut & in se ipsae coeant, & nihilominus
ora praclusa habeant. Vbi ne id quidem res pa-
titur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam sa-
tis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque
neruus, neq; musculus est, ut puta in fronte, vel
superio

superiore capitis parte, commodissimum tamen est, cucurbitulam admouere à diuersa parte, vt illuc sanguinis cursus reuocetur.

Curaciones aduersus vulnorum inflammationem.

ET aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu, ea timeri possunt, vbi lesus est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus: aut vbi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit, sed pati fluere, dum tutum erit, adeo vt si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat, vtiq; si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multoq; magis, si id vulnus ebrietas praecessit. Quod si musculus lusus videbitur, praecidendus erit. Nam percussus mortiferus est: praecisus sanitatem recipit.

De glutinatione vulnorum.

Sanguine autem vel suppresso, si nimis exsumpit: vel exhausto, si per se parum fluxit, longè optimum est vulnus glutinari. Potest autem id vel quod in cute vel etiam in carne est, si nihil ei praeterea mali accedit. Potest caro alia parte dependens, alia inherens, si tamē etiam nūc integra est, & coniunctione corporis fouetur. In his verò quae glutinantur duplex curatio est. Nā si plaga in molli parte, sui debet, maximeq; si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa
guttur

guttur cutis vel venter. Si verò in carne vulnus est, hiatq; neq; in vnum ora facile attrahuntur, futura quidē aliena est. Imponendæ verò fibulæ sunt (αὐτὴν ἰσχυροὺς Græci nominant) quæ oras, paulum tamē, contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoq; quod alia parte dependens, alia inherebit, si alienatum adhuc nō est, suturam, an fibulā postulet. Ex quibus nautra antè debet imponi, quàm intus vulnus purgatum est, ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflammationē mouet, & glutinari vulnus prohibet. Ne linamentū quidem, quod suppressendi sanguinis causā inditū est, inibi relinquendum est. Nam id quoq; inflammat. Comprehendi vero sutura vel fibula non cutem tantum, sed aliquid etiā ex carne, vbi suberit hæc, oportebit, quò valentius hæreat, neq; cutem abrumpat. Vtraq; optima est ex *acia molli non nimis * acie torta, quò mitius corpori insadat. Vtraq; neq; nimis rara, neq; nimis crebra inijcienda est. Si nimis rara est, non continet. Si nimis crebra est, vehementer afficit, quia quò sepius acus corpus *transiit, quoq; plura loca iniectum vinculum *transiit mordet, eo maiores inflammationes oriuntur, magisq; æstate. Neutra etiam vim illam desiderat: sed eatenus utilis est, quā cutis ducentem, quasi sua sponte subsequitur. Ferè tamen fibulæ latius vulnus esse patiuntur. Sutura oras iungit, quæ ne ipse quidem inter se contingere ex toto debent

bent, vt si quid intus humoris cōcreuerit, sit quā
emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit,
id tamē purgari debet, deinde omni vulnere pri-
mo imponenda est spongia ex aceto expressa: si
sustinere aliquis aceti vim non potest, vinovten-
dum est. Leuis plaga inuatur etiam, si ex aqua
frigida expressa spongia imponitur. Sed ea quo-
rumq; modo imposita est, dū manet, prodest. Itaq;
vt inarescat, non est committendum. Licetq; si-
ne peregrinis, et conquisitis, et compositis me-
dicamentis vulnus curare. Sed si quis huic pa-
rum confidit, imponere medicamentum debet,
quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruen-
tis vulneribus apta esse proposui. Maximeq; si
caro est, barbarum: si nervi, vel cartilago, vel
aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra
sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoq;
viride nervis idoneum est, eminentibusq; parti-
bus ea, quam Græci πάπλωμα vocant. Solet e-
tiā colliso corpore exigua parte findi cutis. Quod
vbi incidit, non alienum est scalpello latius ape-
rire, nisi muscoli, nerviq; iuxtā sint, quos incidi
non expedit. Vbi satis deductum est, medica-
mentum imponendum est. At si id quod collisum
est, quamuis parum deductum est, latius tamen
aperiri propter nervos, aut musculos non licet.
adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extra-
hant, præcipueq; ex his, id quod rhypodes voca-
ri proposui. Non alienum est, etiam vbiunque
vulnus graue est, impositum, quo id inuetur.
in super

in super circumdare lanam succidam ex aceto,
& oleo. Vel cataplasma, si mollis is locus est,
quod leniter reprimat, si nervosus aut masculo-
sus, quod emolliat.

Quomodo vulnus ligari conveniat.

Fascia vero ad vulnus deligandum, lintea
aptissima est, eaq; lata esse debet, vt semel
iniecta non vulnus tantum, sed paulum vtrinq;
etiam oras eius comprehendat. Si ab altera par-
te caro magis recessit, ab ea melius attrahitur.
Si aequè ab vtraq;, transuersè cōprehendere oras
debet: aut si id vulneris ratio non patitur, media
primum injicienda est, vt tum in vtranq; par-
tem ducatur. Si autem deliganda est, vt & con-
tineat, neq; astringat. Quod non continetur, ela-
bitur: Quod nimis astrictum est, cancro pericli-
tatur. Hyeme sæpius fascia circuire debet, æstate
quoties necesse est, tum extrema pars eius in-
ferioribus acu assuenda est. Nam nodus *vulnus *vulnus
lædit, nisi tamen longè est. Illo neminem decipi
debet, vt propriam viscerum curationem requi-
rat, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa cu-
randa extrinsecus, vel sutura, vel alio medicina
genere est. In visceribus nihil mouendum est,
nisi aut si quid ex iocinore, aut liene, aut pulmo-
ne duntaxat extremo dependat, præcidatur. A-
lioquin vulnus interius, ea victus ratio, eaq;
medicamenta sanabunt, quæ cuiq; visceri con-
uenire superiore libro proposui.

De ratione victus, & notis vulnerum cu-
rationibûsq; eorum.

His ita

His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est, isq; si graue vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem à cibo debet: bibere donec sitim finiat aquam calidam: vel si aestus est, neq; febris, neq; dolor est, etiam frigidā. Adeo tamen nihil perpetuum est. Sed semper pro viribus corporis aestimandum, ut imbecillitas etiā cibum protinus facere necessarium possit, tenuem scilicet et exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex profluvio sanguinis intermorientes, ante ullam curationē vino reficiendi sunt, quod alioqui inimicissimum vulneri est. Nimis verò intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, periculosissimum est. Illud indicium est magne inflammationis, hoc emortui corporis. Protinusq; si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, maturē vulnus sanum fore. Ac ne febris quidē terrere debet, si in magno vulnere, dū
 *inflatio est, permanet. Illa perniciosa est, quæ
 vel leui vulnere superuenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel deliriū mouet, vel si nervorum rigor, aut distentio, quæ ex vulnere orta est, eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non voluntarius, vel protinus ut percussus est aliquis, vel dum inflamatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorū vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere non alienum est, præcipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cibum, neq;
 iam

* inflam-
 matio

iā inflammatione orta, neq; cū in superioribus partibus plaga est. Biduo sic vulnere habito, tertio die aperiendū, detergendāq; sanies ex aqua frigida est, eadēq; rursus inijcienda sunt. Quinto iam die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto vulnere cōsiderandus color est. Quod si liuidus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, scire licet malum vulnus esse: idq; quādo cūq; animaduersum est, terrere nos potest. Album, aut rubicundum esse vlcus, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, vbi hac sine dolore tenuis, et mollis est. Sed si glutinatur vulnus, aut leuiter intumuit, eadē sunt imponenda, quae primò fuerunt. Si grauis inflāmatio est, neq; glutinandi spes est, eaq; pus moueat, aquae quoq; calidae necessarius vsus est, vt & materiā digerat & duritiā emolliat, & pus citet. Ea sic tēperanda est, vt & manu contingēti iocunda, sit, vsq; eō adhibenda donec aliquid ex tumore minuisse, coloremq; vlceri magis naturalē reddidisse videatur: maximeq; si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locus cartilaginosus, rhypodes. Post id fomentum, si lata plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, & si latius hiat, illud emplastrum liquari ex irino vnguento oportet: eoq; illita linamenta disponi per plagam, deinde emplastrum suprā dari, & super id succidam lanā, minusq; etiam, quā primò, fasciae astringendae sunt.

Curatio

Curationes proprię articulorum.

Proprię quædam in articulis visenda sunt, in quibus si præcisi nerui sunt, qui continebant, debilitas eius partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, ea transversa commodior est, si retuso & graui est, nullum in figura discrimen est. At visendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albūq; & crassum diu fertur, neruum præcisum esse credibile est. Magis quoq; maiores dolores inflammationesq; quò maturius excitatæ sunt. Quamuis autem non abscissus neruus est, tamen si circà tumor durus diu permanet, necesse est & diuturnum vlcus esse, & sano quoq; eo tumorem permanere, futurūq; est, vt tardè membrum id extendatur vel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, vbi recuruato articulo curatio adhibita est, quàm in recuruando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoq; membrum quod iclum est ratione certa debet. Si glutinandum est, vt superius sit, si in inflammatione est, vt in neutram partem inclinatum sit. Si iam pus profluit, vt deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moueri & ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite vel brachijs, quàm qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeq; ambulatio conuenit, femine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debebit. Balneum quoque dum parum
vulnus

vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & humidum, & sordidum reddit, ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit. Levis frictio recte adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

INflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta, supraq; id, emplastrum, vel enneapharmacum dandum est. Tum demum verò purum vlcus est, cum rubet, ac nimium neque siccum, neq; humidum est. Ac quodcumq; sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est: quod aut pallidum, aut albidum, aut lividum, aut nigrum est, id purum non est.

Quomodo vulnus implendum est.

Purgato, sequitur vt impleatur, iamq; calida aqua eatenus necessaria est, vt sanies removeatur. Lanæ succida superuacuis vsus est. Lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaq; ea adhiberi non alienum est, vt butyrum cum rosa, exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa tetrapharmacum, aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rari. Cibi boni succi, vitatis omnibus acribus, sed iam plenioribus. Nam & avis, & venatio, & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. Itemq; vsque ad cicatricem, si nervi, musculi ue

t vulner

vulnerati sunt, etiam si alte caro, aut si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non perue-
tus, modicè tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in ner-
uosis locis, musculosisq; necessarium est, cerato quoque super vulnus vtendum est. At si caro su-
percreuit, modice reprimit siccum linamentum, vehementius squama aris. Si plus est, quod tol-
li opus est, adhibenda sunt etiamnum vehemen-
tiora, quæ corpus exedant. Cicatricem post o-
mnia hæc commodè inducit, lycium ex passo, aut lacte dilutum, vel etiam per se impositum sic-
cum linamentum.

De vlceribus, quæ extrinsecus per vulnera in-
cidunt, curationibûsq; eorum.

Hic ordo felicitis curationis est. Sed quædam
tamen periculosa incidere consuerunt. In-
terdum enim vetustas vlcus occupat, induciturq;
ei callus, & circum ora crassæ liuent, post quæ
quicquid medicamentorum ingeritur, parû pro-
ficit, quod fere negligenter curato vlcери super-
uenit. Interdum vel ex nimia inflammatione,
vel ob æstus immodicos, vel ob nimia frigora,
vel quia nimis vulnus æstrictum est, vel quia
corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer
occupat. Id genus à Grecis diductum in species
est, nostris vocabulis non est. Omnis autem can-
cer non solum id corrumpit, quod occupauit, sed
etiam serpit, deinde alijs alijsq; signis decerni-
tur. Nam modò super inflammationem rubor
vlcus

vlcus ambit, isq; cum dolore procedit, ἰσχυρῶς
 ἄλγος Græci nominant. Modò vlcus nigrum est,
 quia caro eius corrupta est. Idq; vehementius
 etiam putrescendo intenditur. Vbi vulnus hu-
 midum est, & ex nigro vlcere humor pallidus
 fertur, maliq; odoris est, caruncula corruptæ.
 Interdum etiam nerui ac membrane resoluun-
 tur, specillumq; demissum descendit aut in latus,
 aut deorsum, eoq; vitio nonnunquam os quoque
 afficitur. Modò oritur ea, quàm Græci γάγρεα
 ὤνυξ appellant. Priores in qualibet parte corpo-
 ris fiunt. Hæc in prominentibus membris, id est
 inter ungues, & alas vel inguina, fereq; in se-
 nibus, vel his quorum corpus mali habitus est.
 Caro in vlcere vel nigra, vel liuida est, sed sicca
 & arida, proximaq; cutis plerūq; subnigris*pu- * pusulis
 stulis impletur, deinde ei proxima vel pallida,
 vel liuida, fereq; rugosa sine sensu est. Vltior in
 inflammatione est, omniaq; ea simul serpunt.
 Vlcus in locum pustulosum: Pustula, in eum qui
 pallet aut liuet: Pallor aut liuor, in id quod in-
 flammatum est: Inflammatio, in id quod inte-
 grum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta
 oritur, ingensq; sitis, quibusdam etiam delirium
 accedit, alij quamuis mentis suæ compotes sunt,
 balbutiendo tamen pæne sensus suos ore expli-
 cant. Incipit affici stomachus. Fit fædi spiritus
 ipse odoris. Atq; initium eius quidem mali reci-
 pit curationem. Vbi verò penitus insedit, insana-
 bile est, plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

Curatio vlcis.

A C pericula quidem vulnerum hæc sunt. *inciden*
m Vetus autem vlcus scalpello * incidendum
 est, excidendaq; eius ora, & quicquid super eas
 liuet, æquè incidendum. Si varicula intus est,
 quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda.
 Deinde, ubi sanguis emissus, nouatumq; vulnus
 est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus
 vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis vti
 non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex
 ladano fit, & cum vlcus sub eo exesum est, id
 quo cicatrix inducitur.

Curatio Erysipelarum.

I D autem quod Erysipelas vocari dixi, non
 solum vulnere superuenire, sed sine hoc quoq;
 oriri consuevit, atque interdum periculum maius
 affert, vtiq; si circa ceruices aut caput consti-
 tit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mit-
 tere, deinde imponere simul reprimentia & re-
 frigerantia, maximeq; cerussam solani succo, aut
 cimoliam cretam aqua pluuiali exceptam, aut ex
 eadem aqua subactam farinam cupresso adie-
 cta, aut si tenerius corpus est, lenticulam. Quic-
 quid impositum est, betæ folio contegendum est,
 & super linteolum frigida aqua madens impo-
 nendum. Si per se refrigerantia parum prode-
 runt, miscenda erunt hoc modo, sulphuris P. I. *.
 P. XII. cerussæ & croci, singulorum * P. XX. *. eaq;
 cum vino conterenda sunt, & id his illinendum:

aut

aut si durior locus est, solani folia contrita, suillæ adipi miscenda sunt, & illita linteolo superini-
cienda. At si nigrities est, neque dum serpit, im-
ponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exe-
dant, repurgatumq; vlcus sic vt cetera nutrien-
dum est. Si magis putre est, iamq; procedit ac
serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne
hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec
ex eo nullus humor feratur: nam quod sanū est,
siccum est cum aduritur, post vstionem putris
ulceris superponenda sunt quæ crustas à vino
resoluant, eas ἐσχαρὰς Græci vocant. Vbi exci-
derunt, purgandum vlcus maxime melle &
*resina est, sed alijs quoque purgari potest, qui- *resina
bus purulenta curantur, eodemq; modo ad sani- vsta
tatem perducendum est.

Curatio Gangrænæ.

GAngranam verò, si nondum planè tenet,
sed adhuc incipit curare non difficilimum
est, vtiq; in corpore iuuenili, & magis etiam si
musculi integri sunt, si nerui vel lesi non sunt,
vel leuiter affecti sunt, neque vlus magnus ar-
ticulus nudatus est, aut carnis in eo loco paulum
est, ideoq; non multū, quod putresceret, fuit, con-
sistitq; eo loco vitium: quod maxime fieri in di-
gito potest. In eiusmodi casu primum est, si vi-
res patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quic-
quid aridum est, & intentione quadam proxi-
mum quoque locum male habet, *vsq; ad sanum *vsq; e
corpus concidere. Medicamenta verò, dum ma- sa-
lum

lum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus mouere consuerunt, ideoq; ne aqua quidem calida. Grana quoq; quamuis reprimantia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est, superq; ea quæ inflammata sunt, vtendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, vbi id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet. Præcipueq; in hoc casu petendum, non à medicamentis solum, sed etiam à victus ratione præsidium est. Neque enim id malum nisi corrupti vitiosiq; corporis est. Ergo, primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia vtendum. Deinde danda quæ per cibum portionemq; aluum, ideoq; etiam corpus, astringant, sed ea leuia. Postea si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri vlcere præscripta sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis vti licebit ex media materia, sic tamen non nisi aluum, corpusq; siccantibus: aqua verò pluuiali frigida balneum (nisi iam certa fiducia reddita sanitatis est) alienum est, siquidem emollitum in eo vulnus, cito rursus eodem malo afficitur. Solent uerò nonnunquam nihil omnia auxilia proficere, ac nihilominus serpere his cancer. Inter quæ miserum, sed vnicum, auxilium est, vt cætera pars corporis tuta sit, membrum quod paulatim emoritur, abscindere. Hæ grauissimorum vulnerum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, vbi integra cute interior pars collisa est, aut vbi dera sum, attritum'ue aliquid est, aut vbi surculus corpori infixus est, aut vbi te-

ne,

due, sed altum vulnus insedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex vino coquere, interioremq; eius partem conterere, & cerato miscere ex rosa facto, idq; supponere: deinde ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, quale λιπαρά est. Deraso verò, detrictoq; imponendum est emplastrū tetrapharmacum, minuendusq; cibis, & vinum subtrahendū. Neq; id quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit. Siquidem ex eiusmodi casibus sæpe cancri fiunt. Quòd si lenius id erit, & in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum verò (si fieri potest) oportet vel manu, vel etiam ferramento eijcere. Si vel præfractus est, vel altius descendit, quàm ut ita fieri possit, medicamento euocandus est. Optime autē educit superimposita arundinis radix, si tenera est protinus contrita: si iam durior, antè in mulso decocta. Cui semper mel adijciendum est, aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex surculis arundo est, quia aspera est. Eademq; offensa, etiam in filice est. Sed usu cognitū est, utraque aduersus alteram medicamentum esse, si contrita superimposita est. Facit autem idem in omnibus surculis, quodcūq; medicamentū extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusq; vulneribus aptissimū est. Priori rei Philocrati, huic Hecatæi emplastrū maxime cōuenit.

Quomodo cicatrix vulnere inducenda,
purgandāq; sit.

2 4

Vbi

VBi vero in quolibet vulnere ventū ad inducendum cicatricem est, quod per purgatis iam repletisq; vlceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentū, dum caro alitur: deinde cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix sylvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterij p.i. *. ssumæ argenti p. i i. *. vnguenti pondo i i i i. *. Quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant paribus portionibus mixta, ærugo, plumbum elotum, eademq; rosa cocta, siue vngitur cicatrix, quod in facie fieri potest: siue id vt emplastrum imponitur, quod in alijs partibus commodius est. At si vel excreuit cicatrix, vel concava est, stultum est decoris causa rursus, & dolorem & medicinam sustinere. Alioqui res utriq; succurri patitur. Siquidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniungienda sunt: super concavam implentia, donec utrunq; vlcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

De vulneribus quæ per morsus inferuntur, eorumq; curationibus. CAP. XXVII.

Dixi

DIxi de his vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur. Sequitur, ut de his dicam, quæ morfu fiunt, interdum hominis, interdum simiæ, sepe canis, nonnunquam ferorū animalium, aut serpentium. Omnis autem feræ morsus habet quoddam virus. Itaq; si vehemens vulnus est, cucurbitula admouenda est. Si leuius, protinus emplastrū iniiciendum, præcipueq; * Diogesi. Si * Diogesi id non est, quodlibet ex his, quæ aduersus morsus nis proposui. Si ea non sunt, viride Alexandrinum. Si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his quæ recentibus vulneribus accommodantur. Sal quoq; his, præcipueq; ei, quod canis fecit, medicamentū est, si manus uulneri imponitur, superq; id duobus digitis verberatur. Exaniat enim: ac salamentū quoq; recte super id vulnus deligatur.

Curatio aduersus rabiosi canis morsum.

VTiq; autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula virus eius extrahendum est. Deinde si locus neque nervosus neq; musculosus est, vulnus id adurendum est. Si vri non potest, sanguinem homini mitti non alienū est. Tum vsto quidem vulnere superimponenda, quæ cæteris vstis, sunt. Ei verò quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt. Postq; nullo nouo magisterio, sed iam supraposito vlcus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt, ibiq; patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vlcere adaperto, quo ma-

gis ex eo quoq; virus distillet, deinde multo, me-
 racoq; vino excipiunt: quod omnibus venenis
 contrarium est. Idq; cum ita per triduum factū
 est, tutus esse homo à periculo videtur. Solet au-
 tem ex eo vulnere, vbi parum occursum est, aqua
 Timor Timor nasci, ὁποφοβία Graci appellant. Mis-
 aqua. ferrimū genus morbi, in quo simul eger & siti,
 ὁποφ & aqua metu cruciatur. Quo oppressis in angu-
 69. sto spes est. Sed vnicum tamen remedium est, nec
 opinantē in piscinam non antē ei prouisam pro-
 iicere. Et si natandi scientiam non habet, modò
 mersum bibere pati, modò attollere. Si habet, in-
 terdum deprimere, vt inuitus quoq; aqua satie-
 tur. Sic enim simul & siti, & aqua metus tol-
 litur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum
 corpus in aqua frigida vexatū, nervorū disten-
 tio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in
 oleum calidum demittendus est. Antidotum au-
 tem, præcipuè id, quod primo loco posui: vbi id
 non est, aliud, si nondum eger aquam horret, po-
 tui ex aqua dandū est, & si amaritudine offen-
 ditur, mel adiiciendum est. Et si iam is morbus
 occupauit, per catapotia sumi potest.

Curationes communes, aduersus omnes
 morsus serpentium.

Serpentium quoque morsus non nimium di-
 stantem curationē desiderant, quamuis in ea
 multum antiqui variarunt, vt in singula genera
 anguium singula medendi genera præciperent,
 atq; alijs alia. Sed in omnibus eadem maxime
 profic

proficiunt. Igitur in primis super vulnus id membrum deligandum est, non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Deinde venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit. Neque alienum est, antequam scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitii iam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, quod tamen vix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exugat. Neque Hercules scientiam praecipuam habent hi qui Psylli nominantur, sed audaciam usu ipso Psylli confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quaedam etiam venatoria venena, quibus Galli praecipue utuntur non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur, ictus eius occidit, & si stupente ea (quod per quaedam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis exemplum Psylli secutus, id vulnus exuxerit, & ipse tutus erit, & tutum hominem praestabit. Illud ne intereat, antequam debeat attendere, ne quod in gingivis, palato'ue, alia'ue parte oris vlcus habeat. Post haec is homo loco calido collocandus est, sic ut id, quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neque qui exugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet ius anserinum, vel ouillum, vel vitulinum, & vomere. Viuum autem gallinaceum pullum per medium diuidere, & protinus calidum super vulnus imponere, sic ut pars interior corpori iungatur. Facit id

id etiam hædus, agnus'ue discissus, & calida eius caro statim super vulnus imposita. Emplastrum quoq; quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumq; est, vel Ephesium, vel id quod ei subiectum est. Præsensq; in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est, necessarium est exorbere portionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quo calor mouendus est, ne humorem intus coire patiatur. Nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam mouentia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,
& primo aduersus ictum aspidis.

HAec aduersus omnes ictus communia sunt. **U**sus tamen ipse docuit, eum quem aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos aestus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum quod forte secum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo quoniam id, quamuis refrigerandi vim habet, tamen habet etiam dissipandi. Quò fit, ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo vi verisimile est, spissescentem quoq; intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

Aceti vis
& natura.

Aduersus ictum scorpionis.

IN quibusdam etiam alijs serpentibus, certa quædam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. Quidam

dam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt, quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, vndique veste circumdata, ne is furmus dilabatur, tum carbonem eius super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris, quam ἡλιότροπον Græci vocant, semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam fursures ex aceto, vel ruta syluatica recte imponitur, vel cum melle saltoctus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis, nihil aliud quam ex brachio sanguinem miserunt.

Heliotropium herba solaris.

Aduersus aranei, & scorpionis ictum.

ET ad scorpionis autem, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum semper imponitur.

Aduersus cerastis, & dipsas, & hæmorrhoidis ictum.

AT si cerastes, aut dipsas, aut hæmorrhoidis percussit* asphodeli, quod Aegyptiæ fabæ * catapotium magnitudinē æquet, arefactum, in duas portiones diuidendum est, sicut ei rutæ paulum adijciatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces æquè proficiunt. Costumq; & casia, & cinamomum recte per potionem assumuntur.

Aduersus chersydri ictum, & cerastis.

ADuersus chersydri verò ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum * P. I. I. * vel * I. I. I. s. porri succus cum hemina vini sumendus est, & * I. edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut
ex

ex eodem ordeacea farina, aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoque vulnere, quod ceras tes fecit, æquè valet.

Aduersus phalangii ictum.

Vbi verò phalangium nocuit, præter eam curationem quæ manu redditur, sæpe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrha, & vuae taminia par modus ex passi hemina, vel radícula semen, aut lolij radix ex vino, & super vulnus furfures ex aceto coctæ, imperandumq; ut is conquiescat.

Aduersus ictus Italorum anguium, qui minus terribiles peregrinis sunt.

Verum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquāto magis pestifera sunt, maximeq; æstuosis locis gignuntur. Italia, frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit herba betonica, vel cantabrica, vel cætaurion, vel agrimonia, vel trixago, vel personina, vel marina pastinaca, singulæ binæ ue trita, & cum vino potui data, & super vulnus impositæ. Illud ignorari non oportet, omnis serpentis ictum & ieiuni, & ieiuno magis nocere. Ideoq; perniciosissimi sunt cum incubat. Vtilissimumq; est, ubi ex anguib; metus est, non antè progredi, quàm quis aliquid assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sumpserunt.

runt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere. Deinde, ubi præcordia exhausit, bibere antidotum. Si id non est, vel merum vinum.

Specialia remedia aduersus quædam venena,
& primo aduersus cantharidas.

Sunt tamē quædā remedia propria aduersus quædam venena, maximeq; leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbano, vino adiecto dari, vel lac per se debet.

Aduersus cicutam

Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est, deinde is vomere cogendus. Posteaq; laser ex vino dandum. Isq; si febre vacat, in calidum balneum mittendus. Si non vacat, vngendus ex calefacientibus est. Post que quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

Si hyoscyamum, feruens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asinum.

Aduersus cerussam

Si cerussam, ius malue, vel ius glandis ex vino contrite, maxime profunt.

Aduersus sanguisugam si epota est, & lac quod intus coit.

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum,

aut coagulum, aut cum aceto laser.

Aduersus fungos inutiles.

Si fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi verò hi & specie quidem discerni possunt *fieri ab vtilibus, & cocturae genere idonei* sunt. Nam siue ex oleo inferbuerint, siue piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debent.

Adustis quoq; locis extrinsecus vis inferitur, itaq; sequi videtur, vt de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs aut lilij, aut lingue caninae, aut betæ in vetere vino oleoq; decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum, ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoq; curatio potest in ea, quæ mediocriter exedetia reprimentiaq; primò & pustulas prohibeant, & summâ pelliculam exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticula cum melle, farina, vel myrrha, vel vino, creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua cocta, atque vbi vsus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus quælibet lipara. Sed idonea maxime est, quæ vel plumbi recrementum, vel vitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflamatio est, impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit farina cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crustæ cadant. Tum eruum cum melle, aut irim, aut resinâ tereb

terebinthinam, donec vlcus purum sit. Nouissime siccum linamentum.

De interioribus vlceribus, quæ aliqua corporū parte corrupta nascuntur CAP. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

AB his quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est quæ interius corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. Eius hæ notæ sunt: Rubor est, superq; eum non nimium pustulæ eminent, maxime nigre, interdum subliuidæ, aut pallidæ. In his sanies esse videtur, infra color niger est. Ipsum corpus aridū, & durius quàm naturaliter oportet. Circa quæ quasi crusta est, eaq; inflammatione cingitur, neq; in eo loco leuari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus vrget, nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrunq;. Idq; vitium subteractis quasi quibusdā radicibus serpit, interdum celerius, interdū tardius, suprā quoq; procedens in albescit, dein liuidum fit, circumq; exiguae pustulæ oriuntur. Et si circa stomachum fauces ue incidit, subito spiritus sæpe elidit. Nihil melius est, quàm protinus aduere. Neque id graue est. Nam non sentit, quoniam ea caro mortua est. Finisq; adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cætera aduſta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undique à viua carne diducta, quæ trahit secum quicquid corruptum erat, purusq; iam si-

mus curari potest implentibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quædam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcūq; verò medicamentum positum est, si satis proficiet, protinus à viua corruptam partem resoluit. Certa q; esse fiducia potest, ferè ut vndiq; vitiosa caro excedat, qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentumq; malo vincitur, utique ad vstionem properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisq; ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

De Carcinomate, & eius curatione.

Non idem periculū *καρκίνωμα* affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciē, nares, aures, labra, mammæ fœminarū. Et in iecore autem, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, isq; immobilis, inæqualis tumet, interdum etiam torpet. Circa eum inflatæ venæ quasi recurvantur, hæq; pallent, aut liuent, nonnunquā etiam in quibusdam deliteſcunt. Tactusq; is locus, alijs dolorē affert, in alijs eum non habet. Et nonnunquā sine vlcere durior aut mollior est, quàm esse naturaliter debet, nonnunquam ijsdem omnibus vlcus accedit. Interdumq; nullam habet proprietatē, interdum simile his est, quæ vocant Græci *νοδὺλωματα*, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorq;

Colorq; eius ruber est, aut lenticula similis, neq;
tuto fertur. Nam protinus aut resolutio nervorū,
aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmu-
tescit, atq; eius anima deficit. Quibusdā etiam si
idipsum pressum est, quæ circa sunt, intēduntur
& intumescūt. Nanq; pessimū id genus est, se-
re q; primū id fit, quod κακοήθες a Græcis nomi-
natur. Deinde ex eo id κακίνωμα, quod sine
ulcere est. Deinde vlcus ex eo thymiū. Tolle ni-
hil nisi κακοήθες potest, reliqua curationibus ir-
ritantur. Et quo maior vis adhibita est, eo magis
quidā vsi sunt medicamētis adurentibus. Quidā
ferro adusserunt. Quidā scalpello exciderūt. Neq;
vlli vnquā medicina proficit. Sed adusta pro-
tinus concitata sunt, & increuerunt, donec occide-
rent. Excisa etiā post inductam cicatricē, tamen
reuerterunt, & causam mortis attulerunt. Cum
interim pleriq; nullā vim adhibendo, quæ tollere
id malum tentent, sed imponendo tantum lenia
medicamēta, quæ quasi blandiantur, quo minus
ad vltimam senectutē perueniant, non prohiben-
tur. Discernere autem cacoethes, quod curationē
recipit, à carcinomate, quod non recipit, nemo
scire potest, nisi tempore & experimento. Ergo
vbi primum id vitium notatum est, imponi de-
bent medicamēta adurentia. Si leuatur malum,
minuunturq; eius indicia, procedere curatio po-
test, & ad scalpellum, & ad vstionē. Si pro-
tinus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse,
remouēdaq; sunt omnia acria, omnia vehemen-
tia.

tia. Sed si sine vlcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguis simam, aut rhyodes emplastrum satis est. Si vlcus aequale est, ceratum ex rosa injiciendum est, adijciendusq; ei pulvis ex cõtrita testa, ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Sed si id nimium supercrevit, tentanda squama æris est, qua lenissima ex adurentibus est, eatenus ne quid eminere patiatur, sed ita, si nihil exacerbat. Si minus, eodem cerato contenti esse debebamus.

De Theriomate, & eius curatione.

Est etiã vlcus, quod θηγιώμα Græci vocat. Id & per se nascitur, et interdũ vlceri ex alia causa factò supervenit. Color est vel lividus, vel niger, odor fœdus, multus, & mucco similis humor. Id ipsum vlcus neq; tactũ, neq; medicamentũ sentit, prurigine tantũ movetur. At circã dolor est, & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex vlcere sanguis erumpit. Ad id quoq; malum serpit. Quæ omnia sæpe intenduntur. Fitq; ex his vlcus, quod ἑγγραία ἐσθίουσιν Græci vocant, quia celeriter serpendo, penetrandoq; vsq; ossa corpus vorat. Id vlcus inæquale est, cæno simile, inestq; multus humor glutinosus, odor intolerabilis, maiorq; quàm pro modo vlceris inflãmatio. Vtrũq; sicut omnis cãcer, fit maxime in senibus, vel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio vtriusq; eadem est, sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum à victus ratione ordinãdus est, vt quiescat

quiescat in lectulo, ut primis diebus à cibo absti-
neat, aquam quàmplurimam assumat. Alius
quoq; ei ducatur. Dein post inflammationē ci-
bum boni succi capiat, vitatis omnibus acribus,
portionis quantum volet, sic, ut interdum quidem
aqua contentus sit. In cœna etiā vini austeri ali-
quid bibat. Non equè tamen fame in his quos
herpes urget, atque in his qui therioma adhuc
habebunt, utendū erit. Et victus quidē talis ne-
cessarius est. Super vlcus verò inspergenda est
arida aloë, œnanthe, & si parū proficiet, chalcit-
tis. Ac si quis nervus exesa carne natus est, con-
tendendus antè linteolo est, ne sub eo medicamēto
aduratur. Si validioribus etiam remedijs opus
est, ad eas compositiones veniendū est, quæ ve-
hementius adurunt. Quicquid autem inspergi-
tur, averso specillo infundi debet. Superdanda
cum melle sunt vel linamenta, vel olea folia ex
vino decocta, vel marrubium, eaq; linteolo conte-
genda in aqua frigida madefacto, dein bene ex-
presso. Circaq; quā tumor ex inflammatione est,
imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub
his nihil proficitur, ferro locus aduri debet, dili-
genter nervis, si qui adparent, antè contactis.
Aduſtum vel medicamentis, vel ferro corpus,
primum purgandum, deinde implendum esse,
adparare cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, & eius curatione.

Sacer quoq; ignis, malis vlceribus annume-
rari debet. Eius duæ species sunt: Alternū
v 1 est

est subrubicundū, aut mistum rubore atq; pallore,
 exasperatumq; per pustulas continuas, quarum
 nulla altera maior est, sed plurimae perexiguae.
 In his semper ferè pus, & saepe rubor cum calo-
 re est, serpitq; id nonnunquam sanescente eo,
 quod primum vitiatum est, nonnunquam etiam
 exulcerato, ubi ruptis pustulis vlcus continua-
 tur, humorq; exit, qui esse inter saniem, & pus
 videri potest. Fit maxime in pectore, aut late-
 ribus, aut eminentibus partibus, praecipueq; in
 plantis. Alterū autem est in summā cutis exulce-
 ratione, sed sine altitudine, latum, subliuidū, in-
 æqualiter tamen, mediumq; sanescit, extremis
 procedentibus, ac saepe id, quod iam sanum vi-
 debitur, iterum exulceratur. At circa proxima
 cutis quæ vitium receptura est, tumidior & du-
 rior est, coloremq; habet ex rubro subnigrum.
 Atque hoc quoque malo ferè corpora seniores
 tentantur, aut quæ mali habitus sunt, sed in cru-
 ribus maxime. Omnis autem sacer ignis, ut mi-
 nimum periculum habet ex his quæ serpunt, sic
 propè difficilimè tollitur. Medicamentum eius
 fortissi- *fortuitum est, vno die febris, quæ humorem no-
 xium absumat. Cuius quo crassius & albidius
 est, eo periculi minus est. Prodest etiam infrà
 os vlcerū ladi, quo plus puris exeat, & id quod
 ibi corruptum corpus est, extrahat: sed tamen
 si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alui
 ductione opus est. In omni verò sacro igni neq;
 lenibus, & glutinosis cibis, neq; salsis & acri-
 bus

bus vtendum est, sed his quæ inter vtrunq; sunt, qualis est panis sine fermento, piscis, hœdus, aues, exceptoq; apro omnis ferè venatio. Si nō est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerū, & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quàm cibus debet. Ipsa autē vlcera si mediocriter serpunt, aqua calida: si vehementius, vino calido fouenda sunt. Deinde acu pusula quæcunq; sunt aperiendæ. Tum imponenda ea, quæ putrem carnē exedant. Vbi inflammatio sublata, vlcusq; purgatū est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in vino cocta, atq; contrita. Poteſt emplastrum vel Hieræ, vel tetrapharmacū, cui quinta pars thuris adiecta sit. Poteſt nigra hedera ex vino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato vlcere, quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

De chironio vlcere, & eius curatione.

Chironium autem vlcus appellatur, quod & magnum est, & habet oras duas, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in vlcere, neq; in eius^{*} tumore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil serpit, ideoq; nullum periculum adfert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, vlcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Su-

7 4

per id

per id imponi debet, quod & lene aliquid, & vehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei caussa fit ex his, Squamæ aris, plumbi eloti combusti, singulorum ꝑ. iiii. ✱. cadmiæ, ceræ, singulorum ꝑ. viii. ✱. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus, & manibus oriuntur, & eorum curationibus.

ἰμετρον
hoc genus
ulceris di-
tūtur à Græ-
s, à Lati-
is Pernio.

Flunt etiam ex frigore hyberno ulcera, maxime in pueris, & præcipuè pedibus, digitisq; eorum, nonnunquam etiā in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdū pustulæ oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est, nonnunquā humor exit, sed non multus, qui referre vel pus, vel sanie videtur. In primis multa calida aqua fouendū est, in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliqua verbenæ ex reprimētibus. Si nondū ad apertum ulcus, res quā maxime calidū quis pati potest, admouendū est. Si iam exulceratio est, imponi debet alumen, æqua portione cum thure contritū, cū vino adiecto, aut malicoriū in aqua coctū, deinde contritū. Si summa detracta pellicula est, hic quoq; melius lenia medicamēta proficiunt.

De struma, & eius curatione.

Struma quoq; est tumor, in quo subter secreta quedam ex pure & sanguine, quasi glandulæ oriuntur. Quæ vel præcipuè fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec vnquam facile maturescunt, & siue ferro, siue medica

medicamentis curantur. Plerunq; iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post medicamento est opus. Quibus id quoq; accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoq; foeminarum se reperisse, Chirurgicus Meles autor est. Propter haec & album veratrum recte datur, atq; etiam saepius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quae humorem vel educant, vel dissipent, quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoq; quidam utuntur, quae exedunt, crustaq; eum locum astringunt: tunc vero ut vlcus conterant. Quaecunq; autem ratio curandi est, corpus puro vlcere exercendum, atq; alendum est, donec ad cicatricem perueniat. Quae cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

De Furunculo, & eius curatione.

Furunculus vero est tuberculū acutum cum *inflammatione, & dolore, maximeq; ubi *inflatio iam in pus vertitur. Qui ubi ad apertus est, & exit, super adparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se, atq; erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quae maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum
v s est.

est. Sed alia quoq; suprà comprehensa sunt. Si cætera desunt, imponi debet primum non pingue emplastrum, vt id reprimat: deinde si nõ repres- sit, quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidam est, vel resina, vel fermentum. Ex- presso pure, nulla vltrà curatio necessaria est.

De Phymate, & eius curatione.

Phyma verò nominatur tuberculum furun- culo simile, sed rotundius & planius, sæpe etiam maius. Nam furunculus oui dimidiij ma- gnitudinem raro explet, nõquam excedit. Phy- ma etiam latius patere cõsuevit, sed inflamma- tio dolorq; sub eo minores sunt. Vbi euulsum est pus, eodem modo adparet ventriculus, quod in furunculo non inuenitur. Verùm omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæ- pius nascitur, & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, et difficilius curatur. Vbi et as in- durauit, ne nascitur quidem. Quibus verò medi- camentis discuteretur, suprà propositum est.

De Phygethlo, & eius curatione.

Phygethlon autem est tumor, non altus, sed latus, in quo quiddã pustulæ simile est. Do- lor distentioq; vehemēs est, & maior quàm pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricu- la, idq; tarde maturescit, neq; magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in vertice, aut in
 Panis. alis, aut in inguinibus. Panem, ad similitudinem figuræ, nostri vocant. Atq; idipsum quo medi- camento tolleretur, suprà demonstravi. Sed cum
 omnes

omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium ad suppurationem spectās. Idq; ferè fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius, maximeq; eos, qui ventrem infestant. Sæpiusq; oculis expositum est, siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma vocari proposui, rubetq; cum calore, et paulò post etiam cum duritia, magisq; innocenter indolescit, et siti vigiliamq; exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehēdi potest, maximeq; ubi altius pus movetur. Sed cū siti vigiliaq; sentiuntur intus aliquæ punctiones, et quod de subito durius non est, melius est: et quamvis non rubet, coloris tamen aliter mutati est. Quæ signa iā pure oriente nascuntur. Tumor ruborq; multo antè incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materia auditus est per cataplasmata, quæ simul et reprimunt, et refrigerant, qualia et aliās et paulò antè in Erysipelate proposui. Si iā durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, et resoluant: qualis est ficus arida, contusa: aut fex mista cum cerato: quod ex adipe suilla coactum sit, aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, antè ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusq; adycere myrrhæ dimidio minus, quàm in prioribus singulis erit. Atq; emplastra quoq; et malagmata idem efficiunt, quæ suprà explicui. Quod per hæc discussum

cussum non est, necesse est, maturescat. Idq; quo
 celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex
 qua cocta recte miscetur. Eadem autem hæc in
 minoribus quoq; abscessibus, quorum nomina
 proprietatesq; supra reddidi, recte fiunt. Eadēq;
 omnium curatio, tantummodo distat. Crudum est
 autem, in quo magis quasi venarum motus est,
 & grauitas, & ardor, & distentio, & dolor,
 & rubor, & durities. Et si maior abscessus est,
 horror aut etiam febricula permanet, penitusq;
 condita suppuratio. Si pro his quæ alibi cutis o-
 stendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt,
 * iamq; is * iamq; cutis prurit, & aut sublinidus, aut sub-
 locus pru albidus est, matura suppuratio est, eaq; ubi vel
 rit per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta
 est, pus debet emitti. Tum si qua in aliis, vel in-
 guinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In
 cæteris quoq; partibus, si vna plaga exigua est,
 si mediocris suppuratio fuit, si non altè penetra-
 uit, si febris non est, si valet corpus, æquè lina-
 menta superuacua sunt. In reliquis, parce tamen,
 nec nisi plaga est, imponi debent. Commodè ve-
 rò vel super linamenta, vel sine his imponitur
 lenticula ex melle, aut malicorium ex vino co-
 ctum. Quæ & per se, & mista idonea sunt. Si
 qua circa duriora sunt, ad ea molliēda, vel mal-
 ua cōtrita, vel sæni græci, lini' ve semen ex pas-
 so coctum superdādum est. Quicquid deinde im-
 positum est, non astringi, sed modicè deligari
 debet. Illo neminem decipi decet, vt in hoc gene-
 re ce

re cerato vtatur. Cetera quæ pertinent ad purgandum vlcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conueniuntq; in vulneribus, exposita sunt.

De Fistulis, & earum generibus, & curationibus.

Nonnunquam autẽ ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs vlcerum generibus Fistule oriuntur. Id nomen est vlceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis, habetq; quædam in singulis locis propria. prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. Siquidem aliæ breues sunt, aliæ altius penetrant, aliæ rectè intus feruntur, aliæ multoq; plures transversæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplices, ve ab vno ore intus orsæ, quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur, aliæ rectæ, aliæ flexæ, et tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant, aut vbi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt. Aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur. Atq; etiam quædam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici recenti intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est. Inimica, contraria his sunt. Itemq; si fistula os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vuluam, vel ad grandes venas arterias, ve, vel ad inania, vt guttur, stomachum, thoracẽ penetrauit. Ad intestina quoq;
ea ten

ea tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit, ut quò tendat, & quàm alte perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit: quod extracto specillo patet. Si verò os in vicino est, id quod disci potest, si iam nec'ne, eò fistula penetravit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si elabitur specillum, nondum caries est: si non labitur, sed equali inmititur, caries quidē, verum adhuc leuis est. Si inæquale quoq; & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subhæsit, ipsa sedes docet, peruentūq; esse ad eam ex renixu potest. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples verò hæ sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris, cuius si plus fertur, quàm quod simplici spatio conuenit, plures sinus esse manifestum est. Cumq; fere iuxta sint caro, & nervus, & aliqua nervosa, quales ferè tunicae, membranaeq; sunt: genus quoq; puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perferint. Siquidem ex carne pus leue, album copiosius fertur. At ex nervoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus. Ex nervo pingue, & oleo non dissimile. Deniq; etiam corporis

poris inclinatio docet, num in plures partes fistula penetrarint, quia saepe cum quis aliter decubuit, aliterq; membrum collocavit, pus ferri, quod iam desierat, incipit, testaturq; non solum alium sinum esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si & in carne, & recens, & simplex est, ac neq; rugosa, neq; caua sede, neq; in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore mouetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aris, vel æruginem, ex metallicis aliquid. Ex q; eo collyriū fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idq; ea parte qua tenuius est, altera antecedente demitti oportet in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. Quæ in omnibus fistularum collyrijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo super imponendum, supraq; injicienda spongia, in acetum antè demissa, solui quinta die satis est. Genusq; victus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius à præcordijs fistula est, ex intervallo ieiunium radículas edisse, deinde vomere, necessarium est. Vetustate callosa sit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lacrymæ p. i. *. gummi p. i i i. *. cadmiæ p. i i i i. *. atramenti sutoriij p. v i i i. *. Ex quibus aqua coacta collyrium

Callus.

* P. I. lyrium fit. Aut in quo sunt galle * P. * .eruginis, sandarace, aluminis Aegyptij, singulorum P. I. * .atramenti sutorij combusti P. I I. * . Aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis, quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adijcitur, eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex praecepto Aesculapii, eruginis rasae P. I I. * .conterere, deinde ammoniaci, thymiamatis P. I I. * .aceto liquare, eoq; infuso ex erugine colligere. Idq; ex primis medicamentis est. Sed ut haec maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est calum quibuslibet adurentibus medicamentis prodere, aut quibus haec maxime in effectu sunt erodere. Satiusq; est vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii astricturn eo illinere. Scilla quoq; cocta & mista cum calce, callum exest. Si quando vero longior & transversa fistula est, demisso specillo contra principium huius incidi, commodissimum est, & collyrium * utrinq; demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraq; carne sit, collyrio uti non debemus, quod unam partem curet, reliquas omitat: sed eadem medicamenta arida in calamus scriptorium coniicienda sunt, isq; ori fistulae aptandus, inspirandumq; ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda. Vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt, atq; intus infundendum, quicquid

quid inditum est. Superponenda sunt quæ refri-
gerent & reprimant. Nam ferè quæ circa fistu-
lam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque
alienum est ubi quis resolverit, antequàm rursus
alia medicamenta coniiciat, per oricularium cly-
sterem fistulam eluere. Si plus puris fertur, vi-
no: si callus durior est, aceto: si iam purgatur,
mulso, vel aqua, in qua eruum coctum sit, sic ut
huic quoq; mellis paulū adijciatur. Fere verò fit,
ut ea tunica quæ inter* ferramentū et integram *foramen
carnem est, victa medicamentis tota exeat, in-
fraq; vlcus purum sit. Quod ubi contigit, impo-
nenda glutinantia sunt, præcipueq; spongia mel-
le cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, li-
namentum in modum collyrii compositum, tin-
ctum melle demitti. Sed celerius id glutinatur,
quàm impletur. Neque verendum est, ne purum
corpus puro corpori iunctum, non coeat, adiectis
quoque medicamentis ad id efficacibus, cum se-
pe exulceratio digitorum, nisi magna cura pro-
speximus, sanescendo in unum eos iungat.

De Meliceria.

Est etiam vlcus genus, quod & à faui si-
militudine μέλιτης à Græcis nomina-
tur, idq; duas species habet. Alterum subalbi-
dum furunculo simile, sed maius, & cum dolore
maiore. Quod ubi maturescit, habet foramina
per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus,
nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si
diuisum est, multo plus intus corrupti quàm in
x furunc

furunculo apparet, altiusq; descendit. Rarò fit, nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus eminens, durum, latum, subuiride, subpallidum, magis exulceratum. Siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei. Si inciditur, viridis intra caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est, rectè imponitur *quod in tur & ficus arida, & lini semen * in mulso co- vino co- Etum, & emplastra ac malagmata materiam Etum educant, aut quæ propriè huc pertinentia, supra posui. Super alterum, & ea medicamenta, & farina ex mulso cocta, sic ut ei dimidium resinae terebinthinae misceatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & vnae taminie pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum vlcus vsq; ad sanam carnem excidi oportet, & vlcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum quæ pus citent, deinde quæ purgent, tum quæ impleant.

De Acrochordone, & Thymio, & Myrmecijis,
& Clauo, curationibusq; eorum.

Sunt quedam verò verrucis similia, quorum diuersa nomina, ut vitia sunt. Acrochordona Greci vocant, vbi sub cute coit aliquid durius

rius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem, infrà tenue, ad cutem latius, idq; modicum est, quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix vnum tantum eodem tempore nascitur, sed ferè plura, maximeq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At Thymion nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem tenue, suprà latius, subdurum, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi repræsentat, vnde ei nomen est, ibiq; facile finditur, & cruentatur, nonnunquam aliquantũ sanguinis fundit, fereq; circa magnitudinem fabæ Aegyptiæ est, raro maius, interdum perexiguum, modò vnum, modò autem plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum partibus. Pessima tamen in obscænis sunt, maximeq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem vocantur, humiliora thymio, durioraq; quæ radices altius exigunt, maioremq; dolorẽ mouent, infrà lata, super autem tenuia, minus sanguinis mittunt, magnitudine vix vnquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoq; aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipuè tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, dolorẽq; etiam, si non aliàs, tamẽ ingredienti mouet. Ex his Acrochordon, siue Thymium sepe
etiam

etiam per se finiuntur: & quo minora sunt, eo
 magis. Myrmecia & clavi sine curatione vix
 vnquam desinunt. Acrochordon si excisa est,
 nullam radiculam relinquit, ideoq; ne renascitur
 quidem. Thymio clauoq; excisis subter rotunda
 radícula nascitur, quæ penitus descendit ad car-
 nem, eaq; relicta idem rursus*exigit. Myrme-
 cia latissimis radicibus inherens, ideoq; ne ex-
 cidi quidem sine exulceratione magna possunt.
 Clauum subinde deradere commodissimum est.
 Nam sine vlla vi sic emollescit, ac si sanguinis
 quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tol-
 litur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde im-
 ponit resinam, cui miscuit pulueris paulum, quem
 ex lapide molari contrito fecit. Cætera verò ge-
 nera medicamentis adurenda sunt. Alijsq; id
 quod ex fece vini: myrmecijs id, quod ex alu-
 mine, & sandaraca fit, aptissimum. Sed ea, quæ
 circa sunt, folijs contegi debent, ne ipsa quoque
 exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi
 solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, & earum
 curationibus.

AT pustule maximè vernis temporibus o-
 riuntur. Earum plura genera sunt. nam
 modò circa totius corporis partem, ne aspreudo quæ-
 dam fit, similis his pustulis, quæ ex urtica, vel
 ex sudore nascuntur, ἐξ αὐθιγῶν Græci vocant,
 eaq; modò rubent, modò colorem cutis non exe-
 dunt.

dunt. Nonnunquam plures similes varis oriuntur, nonnunquam maiores pustula liuida, aut pallida, aut nigra, aut aliter naturalicolore mutato, subestq; humor. Vbi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro adparet, * ἐλκῶδες Græcè * φλυκτὴρ nominatur. Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel vā ex medicamentis. Psyracion autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ex pustulis uerò nonnunquam etiam vlcuscula sunt, aut aridiora, aut humidiora: & modò tantū cum prurigine, modò etiam cum inflammatione aut dolore. Exitq; aut pus, aut sanies, aut vtrunque. Maximeq; id euenit in ætate puerili, rarò in medio corpore, sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est, quæ ἐπιφυκτὴς vocatur. Ea colore vel subliuida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio est, & cum adaperta est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est, neq; enim ea faba maior est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & ferè noctis. Vnde nomen quoque à Græcis ei Epinyctis impostum est. In omni verò pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuire, abstinere ab omnibus acribus, & extenuantibus, eademq; nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Prater hæc is qui

x 3 iam

iam robustus est, si pustulae minuta sunt, desudare in balneo debet, simulq; super eas nitrum inspergere, oleoq; vinum miscere, & sic ungi. Tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupauit, imponenda lenticula est, detractaq; summa pellicula ad medicamenta lenia transeundum. Epinyctis post lenticulam recte herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœni graeci mista, sic, ut his inuicem rosa, atq; intubi succus adijciatur, donec mellis crassitudo fiat. Proprie ad eas pustulas, quae infantes male habent, lapidis, quem pyriten uocant P. V. I. I. *. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adijciunturq; olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulae debent, tum hoc illini.

De Scabie, & eius curatione.

iliàs, hu
or cutis
ibicun-
us
S Cabies uero est, *durior cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam sicciores. Exit ex quibusdam sanies, fitq; ex his continuata exulceratio pruriens, serpitq; in quibusdam citò. Atque in alijs quidem ex toto desinit, in alijs uero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eò difficilius tollitur. Itaque eam, quae talis est, & xypiax (id est feram) Graeci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem quae supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est, quod fit ex spody, croci, eruginis,

nis, singulorū p. i. *. piperis albi, omphacij, singulorum p. i. *. cadmiæ p. v i i i. *. Aut ubi iam exulceratio est, id quod fit ex sulphuris p. i. *. ceræ p. i i i i. *. picis liquidæ hemina, olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum autorem refertur. Habet hoc farina lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ selibram, aceti cyathos tres. Crocum quoq; lycium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus rectè miscentur, & ex passo coquuntur. Idq; omnem pituitam ubiq; sustinet. At si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, uel sulphur pice liquida mistum, sicut in pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

De Impetiginis speciebus, & curationibus.

Impetiginis uerò species sunt quatuor. Minime mala est, quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ea, quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uidenturq; esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore squamulæ resoluntur, certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est, simile papulæ ferè, sed asperius, rubicundiusq; figuræ uarias habens: squamulæ ex summa cute descendunt, rosio maior est, celerius & latius procedit, certioribusq; *disced

x 4 etiam

etiam nonnunquam prior temporibus & fit, & desinit, Rubrica cognominatur. Tertia etiamnum deterior est: nam & crassior est, & durior, & magis tumet, in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit, & latè, & tardè eminus serpit. In temporibus aut oritur, aut desinit, neque ex toto tollitur, Nigra cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet pallidas, quasdam subalidas, quasdam lenticule similes, quibus demptis, nonnunquam profluit sanguis. Alioqui verò humor eius albidus est, cutis dura, atq; fissæ est, proceditq; latius. Hæc verò omnia maximè genera oriuntur in pedibus, & manibus, atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quàm quod ad scabiem quoque pertinere sub autore Protarcho retuli. Serrapion autem nitri P. I I. ✱. sulphuris P. I I I I. ✱. excipiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

De Papulis, & eius curatione.

Papularum verò duo genera sunt. Altera est in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leuiterq; roditur: medium habet pauxillo leuius, tarde serpit: idq; vitium maximè rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam αὑπρία, id est, feram Græci appellant. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq;

turq; ac vehementius & roditur, & rubet, interdum etiam pilos remittit. Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur: sed levis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur, sanescit. Maior commodissimè murali herbâ tollitur, si sub ea detrita est. Ut verò ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his vitij est: alterum ad idem Myronis, nitri rubri, thuris, singulorum p. i. *. cantharidum purgatarum p. i. i. *. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinae liquidæ p. x. x. *. farine * lolij semis, gith cyathos tres, picis crudæ * vnum.

De Vitiliginis speciebus, id est, de Alphi, & Melane, & Leuce, & earum curatione.

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum periculum adfert, tamen fœda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. Ἀλφ & vocatur, ubi color albus est, serè subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Μέλαις colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. Λευκὴ habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, altius descendit, in eaq; albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt, sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphos & Melas in quibusdam varijs temporibus & oriuntur, &

* lolij
sext.

III.

*sext.

x 5 desin

desinunt. Leuce quem occupavit, non facile dimittit. Priora curationem non difficilimam recipiunt, ultimum vix unquam sanescit, ac si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Virum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pun-
gi. Si sanguis exit, quod ferè fit in duobus prio-
ribus, remedio locus est: si humor albidus, sana-
ri non potest: itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id verò, quod curationem reci-
pit, imponenda lenticula mista cum sulphure &
thure, sic ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad
idem, quod ad Hirenæum autorem refertur, Al-
cyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida pari-
bus portionibus contunduntur, adiecto aceto. His
in sole vitiligo perungitur, deinde non ita multo
post, ne nimis erodatur, eluitur. Propriè quidem
Myrone autore eos, quos Alphos vocari dixi,

* P. * 2 a- hoc medicamento perungunt, sulphuris * P. I I. *.
umini scif nitri P. I I I I. * myrrhæ aridæ contritæ aceta-
ilis P. * 3 bulum miscent, deinde in balneo super vitiligi-
nitri P. * III myr nem inspergunt farinam ex faba, tum hæc in-
i radice co ducunt. Hi verò quos Melanas vocari dixi, cu-
rita ace- rantur, cum simul contrita sunt alcyonium,
ab. thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo
ante sudorem insperguntur,
tum genus id vitili-
ginis defrica-
tur.

LIB

LIBER VI.

337

De vitiiis singularū corporis partium. C A P. I.
De capillis fluentibus.

DIXI de his vitijis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorū auxilia desiderant. Nunc ad ea veniā, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur. Adijcit enim vim quandam ad continendum, ladanum cum oleo mistum. Nunc de his capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam quo minus caput quibusdam etate nudetur, succurri nullo modo potest.

De Porrigine, & eius curatione. C A P. II.

Porrigo autem est, ubi inter pilos quedam quasi squamule surgunt, eaq; acute resoluntur, et interdum madent, multo sæpius sicca sunt. Idq; euenit modò sine vlcere, modò ex ulcerato loco: huic quoq; modò malo odore, modò nullo accidente, fereq; id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. Nam bene integro capite, nō exit. Vbi aliquod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quàm id quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde peccando repurgare, quàm id ex toto prohibere. Si tamen

men ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magisque si id etiam mali odoris est, caput saepe radendum est, dein id super adiuvandum aliquibus ex leuiter reprimentibus, quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per haec proficitur, vehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus, utique in recenti vitio id inutile esse.

De Sycofi, & eius curatione. CAP. III.

Est etiam vlcus, quod a fici similitudine uul-
neris a Graecis nominatur. Caro excrescit,
& id quidem generale est. Sub eo vero duae species sunt. Alterum vlcus durum, & rotundum est, alterum humidum, & inaequale. Ex duro exiguum quiddam, & glutinosum exit: ex humido plus: & mali odoris. Fit vero utrumque in his partibus, quae pilis conteguntur. Sed id quidem quod callosum, & rotundum est, maxime in barba. Id vero quod humidum, praecipue est in capillo. Super utrumque oportet imponere elaterium, aut lini semen cotritum, & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum, terra quoque ereτρια ex aceto liquata recte illinitur.

De Arcis, & earum curationibus. CAP. IIII.

Arearum quoque duo genera sunt. Commune utriusque est, quod emortua summa pellicula pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris,

odoris, increfcitq; vtrunque in alijs celeriter, in alijs tarde. Peius eſt, quod denſam cutem, & ſubpinguē, & ex toto glabram fecit: ſed ea quæ ἀλόνεξία nominatur, ſub qualibet figura dilatatur, fit et in capillo, & in barba. Id verò quod à ſerpentis ſimilitudine ὀφίασις adpellatur, incipit ab occipitio, duorum digitorum latitudinē non excedit, ad aures duobus capitibus ſerpit, quibusdam etiam ad frontem, donec ſe duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet etate eſt, hoc fere infantibus. Illud vix vnquam ſine curatione, hoc per ſe ſæpe finitur. Quidam hæc genera arearū ſcalpello exaſperant. Quidam illinunt adurentia ex oleo, maximeq; chartam combuſtam. Quidam reſinā terebinthinam cum thapſia inducunt. Sed nihil melius eſt, quàm nouacula quotidie radere, quæ cum paulatim ſumma pellicula exciſa eſt, adaperiuntur pilorum radiculæ. Neq; antè oportet deſiſtere, quàm frequentem pilum naſci adparuerit. Id autem, quod ſubinde raditur, illini atramento ſcriptorio ſatis eſt.

De Varis, & Lenticulis, & Ephelide, & eorum curationibus.

C A P. V.

PEnè ineptiæ ſunt, curare Varos, & Lenticulas, & Ephelidas. Sed eripi tamē fœminis cura cultus ſui non poteſt. Ex his autē quas ſuprà poſui, Vari, Lenticulæq; vulgo notæ ſunt, quamvis rarior ea ſpecies eſt, quàm ξέβιον Græci vocant, cū ſit ea Lenticula rubicundior, & inequa

inequalior. Epulis verò à plerisque ignoratur, quæ nihil est, nisi asperitas quædam, & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie, Lenticule etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. De qua per se scribere alio loco, visum operepretium non est. Sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quàm ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaq; ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendum est, oleoq; leuiter vngendum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia verò ista, atque etiam ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem autorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, * magmatis, cretæ cymatis molie subcerule, nucum amararum, farine hordei, atque erui, struthij albi, sertulæ campanæ seminis. Quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquuntur, illitumq; à vespere vsq; mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibûsque eorum,
& primo de his morbis, qui lenibus medicamentis curantur. C A P. VI.

Sed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus verò, & varijs casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul & vsum,

usum, et dulcedinē conferant, summa cura tuendi sunt. Propterea autem orta lippitudine quædā notæ sunt, ex quibus quid euenturum sit, colligere possimus. Nam simul ac lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mixta est, & ea lacryma calida est, pituita verò alba, & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lacryma multa, & calida, pituita paulum, tumor modicus, idq; in uno oculo est, longum id, sed sine periculo futurum est. Idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur, nonnunquā per duos menses durat, sed quandoq; finitur. Si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæc utrumque oculum inuaserunt, potest esse breuior, sed periculum vlcere est. Pituita autem sicca & arida dolorem quidem mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. Tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine vlllo periculo est. Si siccus quidem, sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillis uel est, ubi super magnum dolorem lacrymæ salsa, calidæq; eunt, aut etiam si tumore infinito diu lacryma cum pituita profuit. Peius etiamnum est, ubi pituita calida, aut liuida est, lacryma calida aut multa profuit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit, nocturna vigilia urget. Siquidem sub
his

his oculus plerūq; rumpitur, votumq; est, vt tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula iuuat. Si foras iam ruptus procedit, sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit. Curari verò oculos sanguinis detractio, medicamentò, balneo, vino, vetustissimus autor Hippocrates memoriae prodidit. Sed eorum tempora, & causae parum explicuit, in quibus Medicina summa est. Neque minus in abstinentia, & alui ductione saepe auxilij est. Hos igitur interdum inflammatio occupat, vbi cum tumore in his dolor est, sequiturq; pituitae cursus nonnunquam copiosior vel acrior, nonnunquam vtraq; parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet, sic vt à sermone quoque abstineat. Nullum cibum assumere, si fieri potest, ne aquam quidem: sin minus, certè quàm minimum eius. Quòd si graues dolores sunt, commodius secundo die, si tamen res vrget, etiam primo sanguis mittendus est, vtique si in fronte venae tument, si firmo corpori materia superest. Si verò minor impetus, minus acrem curationem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio uel die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. Satisq; est vti quiete, & abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est, ne pituita

tuita tenuior atque acrior fiat. Sed secundo die dari debet id, quod leuissimum videri potest ex his, quæ pituitam faciunt crassiores, quælia sunt oua sorbilia. Si minor vis vrget, pulicula quoque, aut panis ex lacte. Insequentibus diebus, quantum inflammationi detrahatur, tantum adijci cibis poterit. Sed generis eiusdem, utique ut nihil salsum, nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, sumatur, nihil potui præter aquam. Et victus quidem ratio talis maxime necessaria est. Protinus autem primo die croci P. I. ✱. & farina candida quàm tenuissimæ P. II. ✱. excipere oportet oui albo, donec mellis crassitudinem habeat, idq; in linteolum illinere, & fronti agglutinare, ut compressis renis pituitæ impetum cohibeat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an lana excipiatur, nihil interest. Super inungi verò oculi debent, sic ut croci quantum tribus digitis comprehendi potest, sumatur: myrrhæ ad fabæ, papaueris lacrymæ ad lenticulæ magnitudinem, eaq; cum passo conterantur, & specillo super oculum inducantur. Aliud idem: Myrrhæ P. I. ✱. mandragoræ succi P. II. ✱. papaueris lacrymæ P. II. ✱. foliorum rosæ, cicutæ seminis, singulorum P. III. ✱. acaciæ P. III. ✱. gummi P. VIII. ✱. Et hæc quidē interdum. Noctu verò, quò commodior quies veniat, non alienum est superimponere candidi panis interiorē partem ex vino subactam. Nam & pituitam reprimit,

y

& si

& si quid lacrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si graue id, & durum propter magnum oculorum dolorem videtur, oui & album, & vitellus in vas defundendum est, adiiciendumq; eo mulsi paulum, idq; digito permiscendum. Vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est, & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque ordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mista, commodè imponitur. Neque ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnum cadant, & hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commodè potest: & cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ ἀνωδιὰ Græci vocant. Satisq; est puero, quod erui, viro quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum verò oculum primo die, **modica si *immodica inflammatio est, nihil rectè conijcitur.* Sæpe enim potius concitatur eo pituita, quàm minuitur. A' secundo die graui quoque lippitudini per indita medicamenta rectè succurritur, vbi vel iam sanguis missus, vel alius ducta est, aut vbi neutrum necessarium esse, manifestum est.

De

De diuersis oculorum collyriis.

Multa autem malorumq; autorum collyria ad id apta sunt, nouisq; etiã nunc misturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimẽtia, facile & varie misceantur. Ergo nobilissima exequar.

Philonis collyrium.

Est igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, spodij, gummi, singulorum P. I. *. papaueris lacrymæ combustæ P. I. *. Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista, iterũ adiecta paulatim vel aqua vel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, vt vbi collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neq; frientur.

Gummi.

Dionysij collyrium.

Dionysij verò collyrium est, papaueris lacrymæ combustæ, donec tenerescat, P. I. *. thuris combusti, gummi, singulorum P. I. *. spodij P. I. I. I. I. *.

Cleonis collyrium.

Cleonis nobile admodum, papaueris lacrymæ frictæ P. I. *. croci P. I. *. gummi P. I. *. quibus cum teruntur, adiicitur rosæ succus. Aliud eiusdẽ valentius: Squamæ æris quod ῥόμωμα appellant, P. I. *. croci P. I. I. *. spodij P. I. I. I. *. plumbi & eloti, & combusti P. VI. *. gummi tantundem. Eius aliud quoque ad idem est, maxime vbi multa pituita profluit. Castorei P. *. 3. aloës P. L. *. croci P. L. *. P. X. I.

γ 2

myrr

myrrhæ P. I I. *. lycij P. I I I. *. cadmiæ cura-
tæ P. V I I I. *. stibis tantundem, acaciæ succi
P. X I I. *. quod cum gummi miscuit, liqui-
dum in pixidicula seruatur. Theodotus verò
huic cōpositioni adiecit papaueris lacrymæ com-
aliàs: nu bustæ P. *. æris combusti & eloti P. I I. *. * nu-
eos pal- cleorum palmarum combustorum P. X. *. gum-
uari cō- mi P. X I I. *.

istos nu
ero X.

Theodoti collyrium, Acharstium appellatum.

A Tipsius Theodoti, quod à quibusdā ἀχά-
σις nominatur, eiusmodi est. Casto-
* P. I I. rei, nardi indici, singulorum P. I. *. lycij * P. *.
papaueris lacrymæ tantundem, myrrhæ P. I I. *.
croci, cerussæ elotæ, aloës, singulorum P. I I I. *.
cadmiæ botryodis elotæ, æris combusti, singulo-
P. X V I I I. rum P. V I I I. *. gummi * P. V I I I. *. acaciæ suc-
ci P. X X. *. stibis tantundem, quibus aqua plu-
uialis adiicitur.

Cythion vel Tephron collyrium.

P Reter hæc ex frequentissimis collyrijs est
id, quod quidam Cythion, quidam à cine-
reo colore Tephron appellant, amyli, tragacan-
thæ, acaciæ succi, gummi, singulorum P. I. *. pa-
P. V I I I. paueris lacrymæ P. I I. *. cerussæ elotæ * P. I I I I.
umæ elo * spumæ elotæ P. V I I I. Quæ æque ex aqua plu-
P. X I I I I uiali conteruntur.

Euelpidis collyrium, Trygodes nominatum.

E Velpides autem qui etate nostra maximus
fuit oculus medicus, utebatur eo, quod
ipse cōposuerat, Trygodes nominabat: Castorei
P. I I.

P. I. I. *. lycopodii, nardi, papaueris lacryma, singulorum P. I. *. croci, myrrhae, aloës, singulorum P. I. I. I. *. aris combustis P. V. I. I. *. cadmia, & P. V. I. I. stibis, singulorum P. XII. *. acaciae succi P. XXV. I. *. gummi tantundem. Quo grauior verò quæq; inflammatio est, eo magis leniri medicamentum debet, adiecto vel albo oui, vel muliebri lacte. At si neque medicus, neq; medicamentum præsto est, sepius vtrumlibet horum in oculis penicillo ad ipsum facto infusum, id malum lenit. Vbi verò aliquis releuatus est, iamq; cursus pituitæ constitit, reliquias fortasse leniores futuras discutiunt balneum & vinum. Igitur lauari debet leniter, antè ex oleo perfricatus, diutiusq; in cruribus & feminibus, multaq; calida aqua fouere oculos, deinde per caput prius calida, tum egelida perfundi, à balneo cauere, ne quo frigore afflatu ne laedatur: posthac cibo paulo pleniore, quàm ex eorum dierum consuetudine, vti: vitatis tamen omnibus pituitam extenuantibus. Vinum bibere lene, subausterum, modice vetus, neque effuse neque timide, vt neque cruditas ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturq; intus latentia acria. Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturbationem quàm attulerat, quod incidere his solet, qui manente adhuc pituitæ cursu festinarunt, quàmprimum discedere debet, nihil eo die vini assumere, cibi minus etiam quàm pridie. Deinde cum primū satis pituita substitit

iterum ad vsum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam siue tempestatum vitio, siue corporis, vt pluribus diebus neq; dolor, neq; inflammatio, & minimè pituitæ cursus finiatur. Quod vbi incidit, iamq; ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Hac enim vt in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, & accendere, sic in veteribus quæ nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficacia esse consuerunt. Videlicet hic quoq; vt alibi, cum secunda vana fuerint, contrarijs adiuuantibus. Sed antè tonderi ad cutem conuenit. Deinde in balneo aqua calida quàm plurima caput atq; oculos fouere, tum vtrunq; penicillo detergere, & vngere caput irino vnguento: continereq; in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est, finiatur, desinatq; sudor, qui necessario in capite collectus est. Tum ad idem cibi viniq; genus veniendum est sic, vti potiones meracæ sint, obtegendumq; caput, et quiescendum. Sæpe enim post hæc grauis somnus, sæpe sudor, sæpe alui deiectio pituitæ cursum finit. Si leuatum malum est, quod aliquanto sæpius fit, per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituatur. Si diebus eisdem alius nihil reddit, ducenda est, quo magis superiores partes leuentur. Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, vt oculos sua sede propellat. $\pi\gamma\acute{o}\pi/\omega\sigma\iota\upsilon$ id, quoniam oculi procidunt, Græci appellant. His
vtiq;

vtiq; si vires patinuntur, sanguinem mitti: si id fieri non potest, aluum duci, longioremq; in ediam indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoq; Cleonis collyrio. quidam quod ex duobus antè positum est, vtuntur. Sed optimum est Nilei. Neq; de vlllo magis inter omnes autores conuenit.

Nilei collyrium omnium optimum.

ID habet nardi Indici, papaueris lacrymæ, singulorum p. i. *. gummi p. i. *. croci p. ii. *. foliorum rosæ recetium p. iiii. *. Quæ vel aqua pluuiatili, vel vino leni subaustero coguntur. Neq; alienum est malicorium, vel fertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere, aut myrrham nigram cum rosæ folijs miscere, aut hyoscyami folia, cum oui cocti vitello, aut farinam cum acacie succo, vel passo, aut mulso. Quibus si folia quoq; papaueris adijciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo preparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso: in qua antè mel myrti vel rosæ folia decocta sint. Deinde ex illis aliquid imponi. Præter hæc ab occipitio incisa cute, cucurbitula admoüenda est. Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodemq; modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum. Deinde futurum, vt inarescat is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior tempore est, incidi oculus debet: vt effuso pure et inflammatio, ac dolor finiatur, & intus tunica residant,

dant, quo minus fœda postea facies sit. Utendum
deinde vel iisdem collyrijs est ex lacte, aut ovo,
vel croco, cui album oui misceatur. Ac si indu-
ruit & sic emortuus est, ne in pus verteretur,
quatenus fœde prominebit, excidendum erit, sic
ut hamo summa tunica apprehendatur: infra id
deinde scalpellus incidat, tātundem medicamen-
ta erunt coniicienda, donec omnis dolor finiatur.
Iisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum
est, qui primum procidit, deinde per plura loca
fixus est.

De carbunculis oculorum, & eorum
curatione.

Solent etiam carbunculi ex inflammatione
nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnun-
quam in palpebris: & in his ipsis oculis modò ab
interiore, modò ab exteriori. In hoc casu alius
ducenda est, cibus minuendus, lac potui dan-
dum, ut acria quæ laeserunt, leniantur. Quod ad
cataplasmata & medicamenta pertinet, his v-
tendum, quæ aduersus inflammationes proposi-
ta sunt. Atq; hic quoq; Nilei collyrium optimum
est: si tamen carbunculus in exteriori palpebræ
parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini
semen, ex mulso coctum: aut si id non est, tritici
farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum & curatio-
ne earum.

Pustulæ quoq; ex inflammationibus inter-
dum oriuntur. Quod si inter initia proti-
nus incidit, magis etiam seruanda sunt, quæ de
sanguine

sanguine, et quiete supra posui. Sin serius quàm
ut sanguis mitti possit, alius tamē dicenda est.
Si id quoq; aliqua res inhibet, utiq; victus ratio
servanda est. Medicamentis autem hic quoq; le-
nibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

*Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.

ID quoq; quod *Philetis vocatur, huic aptum
est, Myrrhae, papaveris lacrymae, singulorum *φιλαι-
*Philale ληθς.
P. I. *. plumbi eloti, terrae samiae, quae ἀσής vo-
thos
catur, tragacanthae, singulorum P. III. *. sti-
bis cocti, amyli singulorum P. XVI. *. spodij elo-
ti, cerussae elotae, singulorum P. VIII. *. Quae a-
qua pluviāli excipiuntur. Usus collyrii, vel ex
ovo, vel ex lacte est.

De ulceribus oculorum, & eorum curatio-
ne, & de διαβαλαν collyrio.

EX pustulis ulcera interdum fiunt, eaq; re-
centia aequē lenibus medicamentis nutrien-
da sunt, & iisdem fere quae supra in pustulis
posui. Fit quoq; proprie ad haec quod *diabalani *διαβα-
vocatur. Habet aeris combusti & eloti papave-
λανος
ris lacrymae frictae, singulorum P. I. *. spodij elo-
ti, thuris, stibis combusti & eloti, myrrhae, gum-
mi, singulorum P. II. *.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

Venit etiam, ut oculi vel ambo, vel singuli,
minores fiant, quàm esse naturaliter debeant.
Idq; & acer pituitae cursus in lippitudine effi-
cit, & continuati fletus, & ictus parum bene
curati. In his quoq; iisdem lenibus medicamentis

ex muliebri lacte utendum est. Cibus verò his qui maxime corpus alere, & implere consue-
runt. Vitandaq; omni modo caussa, quæ lacry-
mas excitet, curaq; domesticorum, quorum etiam
si quid tale incidit, eius notitiæ subtrahendum:
atq; acria quoq; medicamenta, et acres cibi non
alio magis nomine his nocent, quàm quòd lacry-
mas mouent.

De pediculis palpebrarum.

Genus quoq; vitij est, qui inter pilos pal-
pebrarum pediculi nascuntur. Id $\phi\theta\epsilon\gamma\iota\alpha\sigma\iota\upsilon$
Græci nominant. Quod cum ex malo corporis
habitu fiat, raro nō vltrā procedit. Sed fere tem-
pore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequi-
tur, exulceratisq; vehementer oculis, aciem quoq;
ipsam corrumpit. His aluus ducenda, caput ad
cutem tondendum, diuq; quotidie ieiunis perfri-
candum. His, ambulationibus, alijsq; exercita-
tionibus diligenter utendum, gargarizandumq;
ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus deco-
cta sit: sæpe in balneo multa calida aqua fouen-
dum caput. Vitandi acres cibi, lacte vinoq; pin-
gui utendum, bibendumq; liberalius quàm eden-
dum est. Medicamenta verò intus quidem le-

* aliàs, ma danda sunt, * ne acriorem pituitam conci-
acrio- tent. Super ipsos verò pediculos alia, quæ neca-
s pitui- re eos et prohibere ne similes nascantur, possint.
conci- Ad id ipsum spume nitri p. i. *. sandaracæ p. i.
itur. *. vuae taminiæ p. *. i. simul teruntur, adijci-
turq; vetus oleum pari portione, atq; acetum, do-
nec

nec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andreae collyrio, & de *diacerato.

HActenus oculorum morbi lenibus medicamentis *nutriuntur. Genera deinde alia ^{*dià né} ^{gα/θ.} sunt, quæ diuersam curationē desiderant, fereq; ^{*curatur} ex inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseuerat tenuis pituitæ cursus, quibus alius ab inferiore parte euocanda est, demendum aliquid ex cibo. Neq; alienum est illini frontem compositione Andreae. Quæ habet gummi P. I. *cerussæ, stibis, singulorum P. I I. *. spumæ argenti & coctæ, & elotæ P. I I I. *. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida hæc medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fröte, cataplasma quoq; super injiciendum ex farina, quæ frigida aqua coacta sit, cuiq; aut acaciæ succus, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; , inciso vertice, recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi verò eo debet quod habet squamæ æris, papaueris lacrymæ, singulorum P. *. ceruini cornu combusti & eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum P. I I I I. *. thuris P. XII. *. Hoc collyrium quia cornum habet, ^{dià né} ^{gα/θ.} nominatur. Quotiescunque non adijcio quod genus humoris adijciendum sit, aquam intelligi volo.

Memigmenon, Euclidis collyrium,

Ad

AD idem Euelpidis, quod *μεμυγμένον* nominabat. In eo papaveris lacryma, & albi piperis, singulae unciae sunt, gummi libra, aeris combusti P. I. *. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquam profunt balneum & vinum. Cumq; omnibus lippientibus vitandi cibi sunt, qui extenuant, tum praecipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quae pituitam crassiorem reddunt, sicut in hoc genere materiae maxime promptum est, confugiendum est ad ea, quae quia ventrem, corpus quoq; astringunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, veteribus, & curationibus singulorum.

AT ulcera si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe vetera esse consuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod *Μεμυγμένον* vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo quod *Smilion* nominatur.

Smilion collyrium.

Habet *eruginis* P. I I I. *. gummi tantundem, ammoniaci, minij sinopici, singulorum P. X V I. *. Quae quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon collyrium Euelpidis.

Alias, **I**D quoq; Euelpidis, quod *Phynona* adpellabatur, huic utile est: Croci P. I. *. papaveris lacrymae, gummi, singulorum P. I I. *. aeris combusti et eloti, myrrhae, singulorum P. I I I. *. piperis albi P. VI. *

P.VI.*. Sed ante linitum hoc vngendum est.

Sphæron collyrium Euelpidis.

ID quoq; eiusdem, quod Sphæron nominabat, eodem valet. Lapidis hæmatitis eloti P. II.*. piperis grana sex, cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaueris lacrymæ, singulorum P. III.*. croci P. III.*. gummi P. VII.*. Quæ cum vino amineo conteruntur.

Liquidum Euelpidis collyrium.

Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat, in quo erant hæc, æruginis P.*. minij combusti, atramenti sutorij, cinamomi, singulorum P. III.*. croci, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum P. I.*. myrrhæ P. II.*. æris combusti P. III.*. cineris ex odoribus P. III.*. piperis grana *XV. Hæc ex vino austero teruntur: deinde cum passi tribus heminis decoquuntur, donec corpus vnum sit. Idq; medicamentum vetustate efficacius fit.

De causis oculorum vlceribus, & curationibus.

CAua verò vlcera commodissime implentur ex his quæ suprâ posita sunt, Sphæron, & id quod *Philetis vocatur. Idem Sphæron vetustis vlceribus, & vix ad cicatricem venientibus optime succurrit. *aliàs, Philaletis, quæ dicitur.

Hermonis collyrium.

Est etiam collyrium quod cum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his vlceribus videtur. Refertur ad Hermonem autorem, habet piperis longi P. I. 3.*. albi P.*. cinnamomi, costi, singulorum P. I.*. atramenti sutorij, nardi,

nardi, castæ, castorei singulorum P. II. *. gallæ
P. V. *. myrrha, croci, thuris, lycij, cerussæ, singu-
lorum P. V. I. I. *. papaveris lacrymæ P. XII. *.
aloës, eris combusti, cadmiæ, singulorum P. XVI.
*. acaciæ, stibis, gummi, singulorum P. XXV. *.

De cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus fa-
ctæ sunt, & quomodo curari debeant,
& de Asclepiæ, & Canopitæ &
Pyxino, collyrijs.

Factæ verò ex ulceribus cicatrices, duo-
bus vitijs periclitantur, ne aut caue, aut
crassæ sint. Si caue sunt, potest eas implere, id
quod sphæarion vocari dixi, vel id quod Ascle-
pias nominatur. Habet papaveris lacrymæ P. II.
*. sagapeni, opopanacis, singulorum P. III. *. æ-
ruginis P. IIII. *. cumini P. VII. *. piperis
P. XII. *. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum P.
XVI. *. At si crassæ cicatrices sunt, extenuat
vel Smilion, vel Canopitæ collyrium quod habet
cinamomi, acaciæ, singulorum P. I. *. cadmiæ e-
lotæ, croci, myrrha, papaveris lacrymæ, gummi,
singulorum P. I. I. *. piperis albi, thuris, singulo-
rum P. III. *. aris combusti P. IX. *. cum aqua
pluviali. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his
constat: Salis fossilis P. IIII. *. ammoniaci, thy-
miamatis P. VIII. *. papaveris lacrymæ P. XII.
*. aliàs, *. cerussæ P. XV. *. piperis albi, croci siculi, * sin-
gulo-
gulum P. LII. *. gummi P. XIII. *. cadmiæ
elotæ P. IX. *. Maxime tollere cicatricem vide-
tur, id quod habet gummi P. III. *. æruginis
P. I. *. crocomagmatis P. IIII. *.

De

De alio genere inflammationis oculorum.

Est etiam genus inflammationis, in qua sunt cui tument ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti necessarium, multaq; aqua calida caput atq; oculos fouere, gargariari ex lenticula, vel ex fici cremore, inungi acribus medicamentis, quæ supra cōprehensa sunt, maximeq; eo quod Sphæxion nominatur, quod lapidem hæmatiten habet. Atq; alia quoq; vtilia sunt, quæ ad extenuandā aspritudinem sunt, de qua protinus dicam. Hanc autem inflammatio oculorum fere sequitur, interdum maior, interdum leuior, nōnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit, deinde aspritudinē ipsam auget, fitq; ea in alijs brevis, in alijs longa, & quæ vix vnquā finiat. In hoc genere valetudinis quidam crassas durasq; palpebras, & ficulneo folio & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt, versasq; quotidie medicamentis suffricant. Quæ neq; nisi in magna vetustaq; aspritudine, neq; sepe faciēda sunt. Nam melius eōdem ratione victus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fouebimus. Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collyrium.

At medicamentum id quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti sutorij P.I. ✱.
misys

misſyos p. *. piperis albi p. v. *. papaueris lacry-
 mæ, gummi, ſingulorum p. ii. *. cadmia lotæ p.
 iii. *. ſtibis p. vi. *. Satisq; conſtat, hoc colly-
 rium aduerſus omne genus oculorum valetudi-
 nis idoneum eſſe, exceptis hiſ que lenibus *nu-
 rantur triuntur.

Hieracis collyrium.

ID quoq; quod Hieracis nominatur, ad aſpri-
 tudinem poteſt: Habet myrrhæ p. i. *. am-
 moniaci, thymiamatis p. ii. *. æruginis ræſæ p.
 iii. *. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum
 eſt etiam id quod Canopite eſt, & id quod Smi-
 lion vocatur, & id quod pyxinum, & id quod
 Sphærian. Si compoſita medicamēta non adſunt,
 felle caprino, vel quā optimo melle ſatis com-
 mode aſpritudo curatur.

De Xerophthalmia, genere aridæ lippitudinis.

Eſt etiam genus aridæ lippitudinis, ἔγγοφ-
 τὰ δακρύων Græci appellant: neq; tument,
 neq; fluunt oculi, ſed rubent tantum, & cū dolo-
 re quodam graueſcunt, et noctu prægravi pitui-
 ta *maleſcunt: quantoq; minor generis huius im-
 petus, tanto ſinis minus expeditus eſt. In hoc
 vitio multum ambulare, multum exerceri, lauari
 ſæpe, ibiq; deſudare, multaq; frictione vti neceſ-
 ſarium eſt. Cibi neq; qui implent, neq; nimium
 acres apti ſunt, ſed inter hoſ medij. Molane vbi
 concoxiſſe manifeſtum eſt, non alienum eſt ex
 Aliàs, ſinapi gargariſare, tum deinde caput atque os
 fricare diutius *perfricare.

Rhinion

Rhinion collyrium.

Collyrium verò aptissimum est, quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ P. I. *. papaueris lacrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorū P. I. *. lapidis hæmatitis, lapidis phrygi, lycij, lapidis scissilis, singulorum P. I. I. *. æris combusti P. I. I. I. I. *. Ac pyxinum quoque eodem accommodatum est.

Ad oculos scabros, collyria.

SI uerò scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion, id quod suprâ positū est: potest similiter prodesse id quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaueris lacrymæ, singulorum P. *. I. I. piperis albi, gummi, singulorum P. *. I. I. I. I. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum P. V. I. *. Nullum tamen melius est quàm Euelpidis, quod Basilicon nominabat. Habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis Asij, singulorum P. I. I. *. gummi P. X. I. I. I. *. piperis albi P. I. I. I. I. *. croci P. V. I. *. psorici P. X. I. I. I. *. Nulla autem per se materia est, quæ Psoricum nominetur, sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idq; in vas fictile additum, & coniectum ficulis folijs sub terra reponitur, sublaturq; post dies viginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoque collyrio conuenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non lenibus medicamentis curantur. Vbi non sunt lenibus autem medicamenta composita, scabros angulos

descriptio
quæ eadem
fere &
Dioscori-
de tradi-
tur.

Z lenant

leuant & mel & vinum. Succurritq; & his,
& aride lippitudini, si quis panem ex uino sub-
actum super oculum imponit. Nam cum fere sit
humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo
angulos, aut palpebras exasperat, sic, & si quid
prodit humoris, extrahitur, & si quid iuxta
est, repellitur.

Ad Caligationem oculorum, quæ propter lippi-
tudinem oritur, remedia & collyria.

Caligare verò oculi nonnunquam ex lip-
pitudine, nonnunquam etiam sine hac pro-
pter senectutem, imbecillitatem'ue aliam consue-
runt. Si ex reliquijs lippitudinis id vitium est,
adiuuat collyrium, quod Asclepias nominatur.
Adiuuat id quod ex crocomagmate fit.

Ἀσκληπιάδος collyrium.

Propriè etiam ad id componitur, quod Ἀσκληπιά-
δος vocant: habet piperis p. i. *. croci
cilicis, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum p.
i i. *. psorici, gummi, singulorum p. i i i i. *.

Ad caligationem oculorum, quæ propter sene-
ctutem, aut aliam imbecillitatem fit.

At si ex senectute, alia'ue imbecillitate id
est, recte inungi potest, & melle quàm
optimo, & cyprino, & oleo vetere. Commodis-
simum tamen est, balsami partem vnâ, & olei
veteris, aut cyprini partes duas, mellis quàm a-
cerrimi partes tres miscere. Vtilia quoque huic
medicamenta sunt, quæ ad caliginem proximè,
quæq; ad extenuandas cicatrices supra compre-
hensa sunt. Cuicumq; verò oculi caligabunt, huic
opus

opus erit multa ambulatione atque exercitatione, frequenti balneo, ubi totum quidem corpus perfricandum est, præcipue tamē caput, & quidem irino, donec insudet, velandumq; postea, nec detegendum antequam sudor & calor domi conquierint. Tum cibis utendum acribus, & extenuantibus, interpositisq; aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoque (quam Græci *πρόχυσιν* nominant) interdum oculi* potentia, qua cer-
nit, se opponit. Quod si inueterauerit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam certis observationibus discutitur. Sanguinē ex fronte vel naribus mittere, in tēporibus venas adurere, gargarizando pituitam euocare, suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. *Viētus* optimus est, qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ Paralysis dicitur.

Ac ne resolutio quidem oculorum, quam *παράλυσιν* Græci nominant, alio viētus modo, vel alijs medicamentis curanda est. Expofuisse tantum genus vitij satis est. Igitur interdum euenit, modo in altero oculo, modo in utroque, aut ex icū aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorū, qua vehementer oculus ipse concussus est, ut his neque ququam intendi possit, nec omnino consistat: sed huc illuc'ue sine ratione moueatur, ideoq; ne conspectum quidem rerum præstet.

De Mydriasi oculorum.

Non multum ab hoc malo distat id, quod *μυδρίασις* Græci vocant. Pupilla effunditur & dilatatur, aciesq; eius hebescit: ac penè difficilime genus id imbecillitatis eliditur. In utraq; verò, id est, & paralyti & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt, paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adiiciendum est, melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis vsu releuatiq;. Quidam sine vlla manifesta causa subito obcæcati sunt. Ex quibus nonnulli cum aliquandiu nihil vidissent, repentina profusione alui lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, ex recenti re & interposito tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Preter hæc imbecillitas oculorū est, ex qua quidem interdū satis, noctu nihil cernunt, quod in fœminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet, hu-
 tet * sanguine iocinoris, maxime hircini: si minore io-
 nus, caprini: vbi id assum coquitur, excepto:
 atq; edi quoque ipsum iecur debet. Licet tamen etiam ijsdem medicamentis non inutiliter vti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant: quidam contritò semine portulacæ mel adiiciunt, eatenus ne id ex specillo distillet, eoq; inungunt.

Exerc

Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargari-
zationibus iisdem, his quoq; utendum est.

Ad oculos, qui extrinsecus offenduntur, cum
sanguine suffusi sunt.

EThæc quidem in ipsis corporibus oriuntur.
Extrinsecus verò interdum si ictus ocu-
lum ledit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil
commodius est, quam sanguine vel columbæ, vel
palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine
caussa fit, cum horum acies extrinsecus læsa in-
terposito tempore in antiquum statum redeat, ce-
leberrimeq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ
factus est, aut per parentes, aut id herba chelido-
nia restitui, quod per se sanescit. Eorū ergo san-
guis nostros quoq; oculos ab externo casu com-
modissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis
optimus, deinde palumbi, minime efficax colum-
bæ & illi ipsi, & nobis. Supra percussum verò
oculum ad inflammationem leniendam, non est
alienum imponere etiam cataplasmata. Sed* am-
moniacus, vel quilibet alius quam optimus teri
debet, sic ut ei paulatim oleum adijciatur, donec
crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum
est cum hordacea farina, quæ ex mulso decocta
sit. Facile autem recognitis omnibus, quæ medici
quoq; prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix
vllum ex his, quæ supra comprehensa sunt, oculi
vitiū esse, quod non simplicibus quoq; & prom-
ptis remedijs submoueri possit.

De aurium morbis, & curationibus. CA VII.

℞ 3

Hact

*Arme
cus lege
dū, ut si
audiatur
lapis.

H Aclenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possint. Ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia oculorum intra ipsos nocent. Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementiam mortemque precipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere et continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere et operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliqua causa prohibent, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue fœni Græci, siue lini, siue alia farina ex mulso decocta est. Recte etiam subinde admouentur spongiæ, ex aqua calida expressæ. Tum leuato dolore, ceratum circumdari debet ex irino aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. Si vehemens inflammatio somni ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent, papaueris, corticis fricti atque contriti, sicut ex his pars dimidia sit, eaque tum simul ex passo misto decoquatur. In aurem verò infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper antequam tepescere conuenit, commodissimeque per strigilem instillatur. Vbi auris repleta est, super lana molli

lis addenda est, quæ humorem intus contineat.
Et hæc quidem communia sunt. Medicamentum
verò est & rosæ, & radicum arundinum suc-
cus, & olerum in quo lumbrici cocti sunt, et hu-
mor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali
persici expressus. Composita verò ad inflamma-
tionem doloremq; leniendum hæc fere sunt: Ca-
storei, papaveris lacrymæ pares portiones conte-
runtur, deinde adijcitur his passum. Vel papave-
ris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus, sic teri-
tur, ut inuicem modo rosa, modo passum instille-
tur. Vel id quod amarum in ægyptia faba est, con-
teritur, rosa adiecta. Quibus myrrhæ quoq; pau-
lum à quibusdam miscetur, vel papaveris lacry-
mæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum
nucum cum rosæ succo. Vel castorei, myrrhæ, pa-
paveris lacrymæ pares portiones cum passo. Vel
croci p. i. *. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum
p. *. 3. quibus cum teruntur, paulatim miscentur
passi cyathi tres, mellis minus cyatho. Idq; ex-
primis medicamenti est. Vel papaveris lacryma
ex aceto. Licet etiam compositione uti Themi-
sonis, quæ habet castorei, opopanax, papaveris
lacrymæ ex aceto, singulorum p. i i. *. spumæ
lycij p. i i i i. *. Quæ contrita passo excipiun-
tur, donec cerati crassitudinem habeant, atq; ita
reponuntur. Vbi usus requiritur, rursus idem
medicamentum adiecto passo, specillo teritur.
Illud perpetuum est, quotiescunq; crassius medi-
camentum est, quam ut in aurem instillari pos-
sit,

℞ 4 sit,

sit, adijciendum eum esse humorem, ex quo id
 componi debet, donec satis liquidum sit. Si vero
 pus quoque aures habent, recte lycium per se in-
 funditur, aut irinum unguentum, aut porri suc-
 cus cum melle, aut centaurea succus cum passo,
 aut dulcis punici mali succus in ipsius cortice te-
 pefactus, adiecta myrrhae exigua parte. Recte
 etiam miscentur myrrhae (quam *ξανθὸν* co-
 gnominat) p.i. *. croci tantundem, nuces ama-
 rae x v. mellis sesquicyathus. Quae contrita, cum
 utendum est, in cortice punici mali tepescant. Ea
 quoque medicamenta quae oris exulcerati causa
 componuntur, aequae ulcera aurium sanant. Quae
 si vetustiora sunt, & multa sanies fluit, apta
 compositio est, quae ad autorem Erasistratum re-
 fertur, piperis p.i. *. croci p.i. 3. *. myrrhae, mi-
 syos cocti, singulorum p.i. i. *. aeris combusti p.
 i. i. *. Haec ex vino teruntur. Deinde ubi in-
 aruerunt, adijciuntur passi heminae tres, & si-
 mul coquuntur. Cum utendum est, adijcitur his
 mel & vinum. Est etiam Ptolemaei chirurgi me-
 dicamentum, quod habet lentisci p.i. *. gallae p.
 i. *. omphacis p.i. *. succum punici mali. Est
 Menophili validum admodum, quod ex his con-
 stat, piperis longi p.i. *. castorei p.i. i. *. myr-
 rhae, croci, papaveris lacrymae, nardi syriaci, thu-
 ris, malicorij, ex Aegyptia faba partis interio-
 ris, nucum amararum, mellis quam optimi, sin-
 gulorum p.i. i. i. *. Quibus, cum teruntur, ad-
 jicitur acetum quam acerrimum, donec crassitu-
 do

do in his passi fiat. Est Cratonis, cinamomi, casiae, singulorum p.i. x. lycij, nardi, myrrhae, singulorum p.i. x. aloës p.i. i. x. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus vinum cum lycio decoquitur, deinde his alia miscentur. At si multum puris, malusq; odor est, æruginis rasæ, thuris, singulorum p.i. i. x. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquantur. Vbi vtendum est, dulce vinum miscetur. Aut aluminis scissilis, papaueris lacrymae, acaciae succi par pondus miscetur, hisq; adijcitur hyoscyami succi dimidio minor quam unius ex superioribus portio, eaq; trita, ex vino diluuntur. Per se quoq; hyoscyami succus satis proficit. Commune verò auxilium aduersus omnes aurium casus, iamq; usu comprobatus Asclepiades composuit. In eo sunt cinamomi, casiae, singulorum p.i. x. flores iunci rotundi, castorei albi, piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrhae pinguis, croci, spumæ nitri, singulorum p.i. i. x. Quæ separatim contrita, rursus mista ex aceto conteruntur, atq; ita condita, ubi vtendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est, Polybij sphragis ex dulci vino liquata. Quæ compositio priore libello continetur. Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, misto vino per oricularem clysterem eluere, & tum infundere vinum austerum cum rosa mistum, cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut her-

ba sanguinalis succum cum rosa, aut mali punisi succum cum exigua parte myrrhæ. Si sordida quoque vlcera sunt, melius mulso eluuntur, & tum aliquod ex his, quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput utiq; tondendum est, & multa calida aqua perfundendum, & gargariandum, & vsq; ad lassitudinẽ ambulandum, & cibo modico vtendum est. Si cruor quoq; ex vlceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, uel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adiecto. Quod si super vlcera caro increuit, eaq; mali odoris sanguinẽ fundit, aqua tepida elui debet: tamẽ infundi id, quod ex thure & æruginẽ, & aceto, & melle fit, aut mel cum æruginẽ incoctum. Squama quoq; aris cum sandaraca contrita per fistulam recte instillatur.

Aduersus antrium vermes.

VBi verò vermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt. Si longius, medicamentis enecandi, cauendumq; ne postea nascentur. Ad vtrunq; proficit album veratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Sic emortui vermes in primam auris partem prouocabuntur, vnde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

SIn foramen auris compressum est, & intus scrassa sanies subest, mel quàm optimum addendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho

¶

et dimidio, æruginis rasæ P. I I. ✕. adijciendum est, incoquendumq; et eo vtendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis et rosæ scrupuli duo. Item galbani P. I I. ✕. myrrhæ cum melle, et fellis taurini, singulorum P. I I. ✕. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad grauem auditum.

Vbi uerò grauius aliquis audire cæpit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit. In primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis super vlcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nistri paulū. Atq; ubi crusta à corpore iam recedit, eluenda auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta, oriculario specillo protrahatur. Si sordes aque molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At si duræ sunt, acetum et cum eo nistri paululum coniiciendum est. Cumq; emollitæ sunt, eodem modo elui aurem purgariq; oportet. Quod si capitis grauitas manet, attondendum idem, et leniter, sed diu perfricandum est: adiecto vel irino vel laureo oleo, sic ut utrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterq; post vnctionem aqua calida caput fouendum. Cibisq; vtendum ex imbecillissima, et media materia, magisq; assumenda diluta potiones, nonnunquam gargariandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto, et laureo oleo, et succo radic

radicule corticis. Aut cucumeris agrestis succus,
adiectis contritis rosa folijs. Immatura quoque
sordidi- vnae succus cum rosa instillatus, aduersus * sur-
attem ditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra seipsas.

Aliud vitij genus est, vbi aures intra se-
ipsas sonant. Atq; hoc quoq; fit, ne exter-
num sonum accipiant. Leuissimum est, vbi id ex
grauedine est. Peius, vbi ex morbis, capitis ue
longis doloribus incidit. Pessimum, vbi magnis
morbis venientibus, maximeq; comitiali, proue-
nit. Si ex grauedine est, purgare aure oportet, &
spiritum continere, donec inde humor aliquis ex-
pumat. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad
exercitationem, frictionem, perfusionem, gargari-
zationemq; pertinet, eadem facienda sunt. Cibis non
utendum nisi extenuantibus. In aurem dandus
radicula succus cum rosa, vel cum succo radicis
ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto,
& laureo oleo. Veratrum quoq; cum aceto conte-
ritur, deinde melle cocto excipitur, & inde col-
lyrium factum in aurem demittitur. Si sine his
caepit, ideoq; nouo metu terret, in aurem dari de-
bet castoreum cum aceto, vel irino, vel laureo
oleo, aut huic mistum castoreum cum succo ni-
cum amararum, aut myrrha et nitrum cum ro-
sa & aceto. Plus tamen in hoc quoq; proficit vi-
ctus ratio. Eademq; facienda sunt, quae supra
comprehendi, cum maiore quoq; diligentia: &
praeterea donec his sonus finiatur, a vino absti-
nendum.

uendum. Quòd si simul & sonus & inflammatio est, laureum oleũ coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus exprimitur, quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

Ad ea quæ in aurem inciderunt extrahenda.

Solet etiã interdum in aurem aliquid incidere, vt calculus, aliquod'ue animal. Si pulex intus est, compellendũ eo lanæ paulũ est, quò ipse is subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliud'ue animal est, specillũ lana inuolutũ in resina nam quàm glutinosissimã, maximeq; terebinthinam demittendũ, idq; in aurem injeciendũ, ibiq; vertendum est. Vtiq; enim cõprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendũ est, aut hamulo retuso paulũ recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoq; admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoq; collocatur media inherens capitibus vtrinq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic vt extra tabulã emineat. Tum malleo caput tabulæ, quod à pedibus est, feritur: atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

De Nariũ morbis, & curationibus. CAP. VIII.

Nares verò exulceratas fouere oportet vapore aquæ calidæ, id est spongia expressa atq; admota. Fit & subiecto vase oris angustî, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda
vlcera

ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa.
Aut argenti spumã cum quolibet horum aliquis
conterit, eiq; dum teritur, inuicem vinum &
oleum myrteum adijcit, donec mellis crassitudi-
nem fecerit. Sin autẽ ea ulcera circa nares sunt,
pluresq; crustas & odorem fœdum habet, quod
genus Græci δσάριον appellant, sciri quidẽ de-
bet, vix ei malo posse succurri. Nihilominus ta-
men hæc tentari possunt, vt caput ad cutem ton-
deatur, assidueq; vehementer perfricetur, multa
calida aqua perfundatur, multa ei deambulatio
sit, cibus modicus, neq; acer, neq; valentissimus.
Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resi-
ne terebinthinæ coniiciatur, quod specillo quoq;
inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritu is succus,
donec in ore gustus eius sentiatur. Sub his enim
crustæ resolvuntur, quæ tum per sternutamenta eli-
di debent. Puris ulceribus vapor aquæ calidæ
subijciendus est. Deinde adhibendũ aut lycium
ex vino dilutum, aut amurca, aut omphaciũ, aut
mentæ, aut marrubij succus, aut atramentum su-
torium, quod candens factum, deinde contritum
sit: aut interior scillæ pars contrita, sic vt horum
cuiuslibet mel adijciatur. Cuius in ceteris admo-
dum exigua pars esse debet: in atramento suto-
rio tanta, vt ea mixtura liquida fiat, cum scilla
vtique pars maior, inuoluendumq; lana specil-
lum est, & in eo medicamento intingendum,
eoq; ulcera implenda sunt. Rursusq; linamētum
inuolutum & oblongum eodem medicamento
illinen

illinendum, dimittendumq; in narem est, & ab inferiore parte leniter deligandum. Idq; per hyemem, & ver, bis die: per æstatem, & autumnum, ter die fieri debet. Interdū verò etiam in naribus caruncula quædam, similes muliebris mammis nascuntur, hæq; imis partibus, quæ carnosissimæ sunt, inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus sub quibus ex toto consumuntur. Polypus verò est caruncula, modò πολύπους alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhaeret, & modò ad labra pēdens, narem implet, modò retro per id foramen, quò spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post ruam conspici possit, strangulatq; hominem maxime, austro aut euro flante, fereq; mollis est, raro dura: eaq; magis spiritum impedit, & nares dilatat, quæ fere uagnivōdes est, itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum aut penicillum ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitidis, calcis, sandaracæ, singulorum ꝑ. i. ✕. atramenti sutorij ꝑ. i. ✕.

De Dentiū dolore, & curationibus. CAP. IX.

IN Dentiū dolore, qui ipse quoq; maximis tormētis annumerari potest, vinum ex toto circuncidendum est. Cibo quoq; primo abstinendum, deinde eo modico molliq; utendum, ne mandentis dentes irriteret, tum extrinsecus admo-
uendus per spongiam vapor aquæ calidæ, impo-
nend

nendumq; ceratum ex cyprino aut irino factum,
lanaq; id comprehendendum, caputq; velan-
dum est. Quod si grauior is dolor est, vtiliter &
alius ducitur, & calida cataplasmata super ma-
xillas inijciuntur, & ore humor calidus cum
medicamentis aliquibus continetur, sepiusq; mu-
tatur. Cuius rei caussa & quinquefolij radix, in
vino misto coquitur, & hyoscyami radix, vel
in posca, vel in vino misto coquitur, sic vt paulu
his salis adijciatur, & papaueris non nimiu: ari-
di cortices, et maderagoræ radix, eodem modo. Sed
in his tribus vtiq; vitandū est, ne quod haustum
erit deuoretur. Ex populo quoq; alba, cortex ra-
dicis in hunc vsum in vino misto recte coquitur,
& in aceto cornu ceruinum rasum, & nepeta
cum teda pingui: ac ficus ite pinguis vel in mul-
so, vel in aceto & melle, ex quibus cum ficus de-
cocta est, is humor percolatur. Specillu quoq; la-
na inuolutum in calidum oleum demittitur, eoq;
ipso dens fouetur. Quinetiam quedam quasi ca-
taplasmata in dentem ipsum illinuntur. in quem
vsum ex malo punico acido atq; arido, malicorij
pars interior cum pari portione, & galle, & pi-
nei corticis conteritur, misceturq; his miniu: eaq;
contrita aqua pluuiatili coquuntur. Aut panacis,
papaueris lacrymæ, peucedani, vuae taminie si-
ne seminibus, pares portiones conteruntur. Aut
galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars
quarta. Quicquid dentibus admotū est, nihilomi-
nus supra maxilla, ceratum, quale supra posui,
esse

esse debet lana obiectū. Quidam etiam myrrhæ,
 cardamomi, singulorum P. I. *. croci, pyrethri,
 *ficorum partes, singulorum P. I. I. I. *. sinapis *ficorum
 P. V. I. I. *. contrita linteolo illinunt, imponūt q; pinguium,
 in humero partis eius qua dens dolet. Si is supe- fortasse le-
 rior est, à scapulis: si inferior, à pectore. Idq; do- gendū, aut
 lorem leuat: & cum leuauit, protinus submouen- paruarū,
 dum est. Si verò exesus est dens, festinare ad
 eximendum eum, nisi res coëgit, non est necesse.
 Sed cum omnibus fomētis, quæ supra posita sunt,
 adiiciendæ quædā valentiores cōpositiones sunt,
 quæ dolorem leuant, quales hæ sunt. Habet au-
 tem papaueris lacrymæ P. I. *. piperis P. I. I. *.
 psoreos P. X. *. quæ contrita galbano excipiun-
 tur: idq; circumdatur. Aut Menemachi maxi-
 me ad maxillares dentes, in qua sunt croci P.
 I. *. cardamomi, thuris fuliginis, ficorum *partes, *parua-
 pyrethri, singulorum P. I. I. I. *. sinapi P. V. I. I. rum, vel
 *. Quidam autem immiscent pyrethri, piperis, pinguiū:
 elaterij, singulorum P. I. *. aluminis scissilis, pa- vt supra.
 paueris lacrymæ, vnae taminie, sulphuris ignem
 non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis,
 singulorum P. I. I. *. Quod si dolor eximi eum
 cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eo-
 dem modo bacca hederæ coniecta in id foramē,
 dentem findit, isq; forte stans excidet. Et plani
 piscis, quam pastinacam nostri, τρυγώνα Græci Pastinaca.
 vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, resi-
 naq; excipitur, quæ denti circumdata hunc sol-
 uit. Et alumen scissile in id foramen contectum
 A demitti

demitti commodius est, quia sic dente seruato, dolorem leuat. Hæc à Medicis accepta sunt. Sed agrestium experimento cognitum, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus velli debere, & in peluem conijci, supraq; aqua infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem vndique veste coniectum, tum in peluem candentes silices demitti, sic vt aqua tegantur, hominemq; eum hiante ore vaporem excipere, vt supra dictum est, vndique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idq; sæpe longiorem, sæpe annuam valetudinem bonam præstat.

De Tonsillis, & eorum cura. C A P. X.

Radix dul-
cis.

SI vero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput velandum est extrinsecus, is locus vapore calido fouendus, multa ambulatione vtendum, caput in lecto sublime habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. Radix quoq; ea, quam dulcem appellant, contusa & in passo, mulso'ue decocta idem præstat. Leniterq; quibusdā medicamentis eas illini non alienum est, quæ hoc modo fiunt: Ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit, tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. i. i. x. per se conteruntur, paulatimq; his adiunguntur vini lenis cyathi duo, mellis vnus, deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur. At eiusdem succi sextarius eodem

eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita
 ei adijciuntur hæc: Nardi *P. *omphacij P. I. *. *P. V.
 cinamomi, myrrhæ, casie, singulorum P. I. *. Ea-
 dem autem hæc et auribus, & naribus purulen-
 tis accommodata sunt. Cibus quoq; in hac vale-
 tudine lenis esse debet, ne exasperet. Quod si tan-
 ta inflammatio est ut spiritum impediat, in lecto
 conquiescendum, à cibo abstinendum, neq; adsumen-
 dum quicquid præter aquam calidam est. Alius
 quoq; ducenda est. Gargariandum ex fico &
 mulso. Illinendum mel, cum omphacio. Intrinsicus
 admouendus, sed aliquanto diutius, vapor aquæ
 calidæ, donec ea suppurent, & per se aperiatur.
 Si pure substantie non rumpuntur, hi tumores,
 incidendi sunt, deinde ex mulso calido gargari-
 andum ex fico. At si modicus quidē tumor &
 exulceratio est, fursurū cremori ad gargari-
 andum paulū mellis adijciendum est, illinendaq; vlce-
 ra hoc medicamento. Passi quamdulcissimi tres
 hemine ad unam coquuntur, tum adijcitur thu-
 ris P. I. *. croci, myrrhæ, singulorum P. I. *. leni-
 terq; omnia rursus feruescunt. Vbi plurima vlce-
 ra sunt, eodem fursurum cremore, vel lacte gar-
 gariandum est. Atque hic quoque cibus lenibus
 opus est, quibus adijci dulce vinum potest.

De Oris ulceribus, & curationibus, & quæ An-
 theræ sunt.

C A P. XI.

VLcera autem oris, si cum inflammatione
 sunt, & parum pura ac rubicunda sunt,
 optime his medicamentis curantur, quæ supra po-

A 2

sita

sita ex malis punicis fiunt. Continendusq; saepe
 ore reprimens cremor cui paulum mellis sit adie-
 ctum. Viendū ambulationibus, & non acri cibo.
 Simulatq; verò pura vlcera esse cœperunt, lenis
 humor, interdum etiam quàm optima aqua ore
 continenda est. Prodestq; assumptum purum vi-
 num, pleniorq; cibus, dum acribus vacet. In sper-
 giq; vlcera debent alumine scissili, cui dimidio
 plus gallæ immaturæ sit adiectū. Si iam crustas
 habent, quales in adustis esse consuerunt, adhi-
 benda sunt hæ compositiones quas Græci ἀνθρα-
 γὰς nominant. Iunci quadrati, myrrhæ, sandara-
 cæ, singulorū p. i i i i. *. aluminis pares portio-
 nes. Aut croci, myrrhæ, singulorum p. i i. *. iri-
 dis, aluminis scissilis, sandaracæ, singulorum p.
 i i i i. *. iunci quadrati p. v i i i. *. Aut gallæ,
 myrrhæ, singulorum p. i i. *. aluminis scissilis p.
 i i. *. rosæ foliorū p. i i i i. *. Quidā autem cro-
 ci p. *. aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum p.
 i. *. sandaracæ p. i i. *. iunci quadrati p. i i i i.
 *. miscent. Priora arida insperguntur. Hoc cum
 melle illinitur, neq; vlceribus tantum, sed etiam
 tonsillis. Verum ea longe periculosissima vlcera
 sunt, quas ἀφθας Græci appellant, sed in pueris:
 hos enim saepe consumunt, in viris & mulieri-
 bus idem periculum non est. Hæc vlcera à gin-
 givis incipiunt, deinde palatum totumq; os oc-
 cupant: tum ad vnam faucesq; descendunt. Qui-
 bus obsessis, non facile fit, vt puer conualescat.
 Ac miserius etiam est, si lactens adhuc infans
 est,

est, quominus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes mouent. Mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammæ perfundere, tum alenda cibus lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est, vini diluti. Ac si alius nutrici substituit, ducenda est. Si pituita eius in os coit vomere debet. Tum ipsa vlcera perungenda sunt melle, cui ^{*}rhus quem syriacum vocat, aut amaræ nu- ^{*}ros ces adiectæ sunt. Vel mistis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ coliculo, melle. Vel eo medicamento, quod ex moris fit, quorum succus eodem modo quo punici mali ad mellis crassitudinē coquitur, eademq; ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel, miscetur. Neq; quicquā dandum, ad quod humor euocari possit. Si verò iam firmior puer est, gargarizare debet his fere, quæ supra comprehensa sunt. At si lenia medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda ea, quæ adurendo crustas vlceribus inducant. Quale est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest etiam fames, & abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen vlcera interdum caseus ex melle recte datur.

De ^{*}linguæ vlceribus.

C A P. XII. ^{*}linguæ

L^{*}ingua quoq; vlcera non alijs medicamentum
tis egent, quàm quæ prima parte superioris ^{*}Gingiuæ
capitis

A 3

capitis exposita sunt. Sed quæ in latere eius nascuntur, diutissimè durant. Videndumq; est, num contrà dens aliquis acutior sit, qui sanescere sepe vlcus eo loco non sinit, ideoq; limandus est.

De parodontidibus gingivarū tuberculis, deq;
alijs vlcerebus gingivarum. CAP. XIII.

Aldus con-
ungit hoc
aput cum
præceden-
e, neque
itulu ad-
lit.

Solent etiam interdum iuxta dentes in gingivis tubercula quedam oriri dolentia, πᾶσι γινώσκοντες Græci appellant. Hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mistis sale fossili, combusto cupresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare, donec pituitæ satis profluat. In maiore verò inflammatione iisdem medicamentis vtendum est, quæ ad vlcera oris supraposita sunt: et mollis linamenti paulum inuoluendum aliqua compositione ex his, quas antheras vocari dixi, demittendumq; id inter dentem & gingivam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admo- uendus erit spongiæ vapor calidus, imponendumq; ceratum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo vapore vtendum erit, & continendū ore calidum mulsum, in quo ficus decocta sit. Itemq; subcrudum incidendū, ne si diutius ibi pus permanserit, os lēdat. Quod si maior is tumor est, cōmodius totus exciditur, sic vt ex vtraq; parte dens liberetur. Pure exempto, si lenis plaga est, satis est ore calidam aquā continere, & extrinsecus fouere eodē vapore. Si maior est, lenticulæ cremore: vti iisdem medicamentis, quibus cætera vlcera

ulcera oris curantur. Alia quoq; ulcera in gingiuis plerūq; oriuntur, quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt. Maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumq; eū ore continere. Fit etiam interdum, vt ex gingiue ulcere, siue ^{*pa-} ^{*παγοδο-} rodontides sint, siue nō sint, diutius pus feratur. ^{tis fuit,} Quod aut dente corrupto, aut fracto, vel aliter siue non vitiato osse, maximeq; id per fistulam venire fuit cōsuevit, vbi incidit, locus aperiendus, dens eximendus: testa ossis, si qua excessit, recidenda est: si quid vitiosi est, radendum. Post quæ, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est. Si verò à dentibus gingiue recedunt, eadem antheræ succurrunt. Vtile est etiam pyra, aut mala non permatura mandere, et ore eum humorem continere. Idemq; præstare non acre acetum in ore retentum potest.

De Vuæ morbo, & curatione. CAP. XIII.

Vuæ vehemens inflammatio terrere quoq; debet. Itaq; in hac abstinencia necessaria est, & sanguis recte mittitur: & si id aliqua res prohibet, alius vtiliter ducitur, caputq; super hæc velandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargariandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa vuæ vel omphacio, vel galla, vel alumine scissilli, sic vt cuilibet eorum mel adiiciatur. Est etiam medicamentum huic aptū, quod Andronium appel- Audron latur. Cōstat ex his, alumine scissili, squama eris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy.

Quæ per se contrita mistaq; rursus paulatim ad-
iecto vino austero teruntur, donec his mellis cras-
situdine sit: ubi horum aliquo illita vna est, cheli-
doniæ quoq; succo per cochlear illita vna maxi-
me prodest. Fere multa pituita decurrit, cunq;
ea quieuit, ex vino calido gargariZandū. Quòd
si minor in ea inflāmatio, laser terere, eiq; adij-
cere frigidam aquam satis est, eamq; aquam co-
chleario exceptam ipsi vna subijcere: Ac me-
diocriter eam tumentem aqua quoq; frigida, eo-
dem modo subiecta, reprimat. Ex eadem autem
aqua gargariZandum quoq; est, vel cum lasere,
vel sine eo hac curatione vna subiecta est.

De Cancro oris.

CAP. XV.

SI quando autem vlcera oris cancer inuasit,
primo considerandum est, num malus cor-
poris habitus sit, eiq; occurrendum, deinde ipsa
vlcera curanda. Quòd si in summa parte id vi-
tium est, satis proficit anthera humido vlceri ari-
da inspersa: sicciori cum exigua parte mellis il-
lita. Si paulo altius, chartæ cōbustæ partes duæ,
auripigmenti pars vna. Si penitus malum de-
scendit, chartæ combustæ partes tres, auripi-
gmenti pars quarta. Aut pares portiones salis
fricti, et iridis frictæ. Aut item pares portiones
chalcedidis, calcis, auripigmenti. Necessarium au-
tem est linamentū in rosa tingere, & super adu-
rentia medicamenta imponere, ne vicinum &
sanum locum lædant. Quidā etiam in acris aceti
hemina frictum salem coniungunt, donec tabe-
scere

scere desinat : deinde id acetum coquunt , donec
 exiccetur , eumq; salem contritum inspergunt.
 Quoties autem medicamentū inijcitur , & antè
 & post os diluendum est, vel cremore lenticulae,
 vel aqua in qua aut eruum , aut olea , aut ver-
 benae decoctae sint, sic ut cuilibet eorum paulum
 mellis misceatur. Acetum quoq; ex scilla reten-
 tum ore, satis aduersus haec vlcera proficit. Ex
 aceto cocto sali , sicut supra demonstratum est,
 rursus mistum acetum . Sed & diu continere
 vtrumlibet, et id bis aut ter die facere, prout ve-
 hemens malum est, necessarium est. Quod si puer
 est, cui id incidit, specillum lana inuolutū in me-
 dicamentum demittendum est , & super vlcus
 tenendum, ne per imprudentiam adurentia de-
 uoret. Et si dolor in gingiuis est, mouenturq; ali-
 qui dentes, refici eos oportet: nam curationes ve-
 hementer impediunt. Si nihil medicamenta pro-
 ficient, vlcera erunt adurenda. Quod tamen in
 labris ideo non est necessarium, quoniam excide-
 re commodius est. Et id quidem aequè adustum
 atq; excisum, sine ea curatione, quae corpori ma-
 nu adhibetur , impleri non potest . Gingiuarum
 verò ossa, quae hebetia sunt, in perpetuum vstio-
 ne nudantur. Neq; enim postea caro increscit.
 Imponenda tamen adustis lenticula est , donec
 sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

De Parotidibus, quae sub auribus oriuntur.

C A P. XVI.

Haec in capite fere medicamentis egent.

A S Sub

Sub ipsis verò auribus oriri πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις solēt, modo in secunda valetudine ibi inflāmatiōe orta, modo post longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est. Itaq; nullam nouam curationem desiderat. Animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam, quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est. Si ex aduersa valetudine, illud inimicum est, maturariq; & quā primum aperiri commodius est.

De Umbilici prominentis curatione.

C A P.

XVII.

AD Umbilicos verò prominentes, ne manu ferroq; vtendum sit, antè tentandum est, vt abstineāt, alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: Cicutæ & fuliginis, singulorum P. I. * cerussæ elotæ P. IIII. * plumbi eloti P. VIII. * ouis duobus, quibus etiam solani succus adijcitur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & interim conuiescere hominem, cibo modico vti, sic vt vitentur omnia infantia.

De obscænarum partium vitijs, & curationibus.

C A P.

XVIII.

Proxima sunt ea, quæ ad partes obscænas pertinent, quarum apud Græcos vocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam vsu sunt, cum omni ferè medicorum volumine atq; sermone iactentur: apud nos scædiora verba, ne accom- consuetudine quidem aliqua verecundius lo- data quentium* commēdata sunt: vt difficilis hæc explanatio

planatio sit, simul & pudorem, et artis præcepta seruantibus. Neq; tamen ea res à scribendo deterrere me debuit. Primum, vt omnia quæ salutaria accepi, comprehenderem, dein quia in vulgus eorum curatio etiam præcipuè cognoscenda est, quæ inuitissimus quisq; alteri ostendit.

De Colis morbis, & curationibus.

Igitur si ex inflammatione Coles intumuit, reduciq; summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouendus locus est. Vbi verò glans contacta est, oriculario quoque clystere inter eam, cutemq; aqua calida inferenda est. Si mollita sic & extenuata cutis, ducendi paruit, expeditior reliqua curatio est. Si tumor vicit, imponenda est vel lenticula, vel marrubium, vel oleæ folia ex vino cocta, sic vt cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adijciatur. Sursumq; coles ad ventrem deligandus est. Quod in omni curatione eius necessarium est. Isq; homo continere se debet, & abstinere à cibo, & potione aquæ tantum à siti vindicari. Postero die rursus adhibendum ijsdem rationibus aquæ fomentum est, & cum vi quoq; experiundum, an cutis sequatur. Ea q; si non parebit, leuiter summo scalpello cōcidenda erit. Nam cum sanies profuxerit, extenuabitur is locus, et facilius cutis ducetur. Sine autem hoc modo victa erit, siue nunquam repugnauerit, vlcera vel in cutis vltiore parte, vel in glande vltra' ve eam in cole reperientur: quæ necesse est, aut pura sicca

ra sicca' ve sint, aut humida, & purulenta. Si
 sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt: de-
 inde imponendum lycium ex vino est, aut amur-
 ca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si le-
 uis ijs humor inest, vino eluenda sunt, tum buty-
 ri, & rosæ mollis paulum, & resine terebinthi-
 na pars quarta adijcienda est, eoq; vtendum.
 Aut si pus ex his profluit, ante omnia elui mul-
 so calido debet. Tum imponi piperis P. I. *. myr-
 rhæ P. II. *. croci, misyos cocti, singulorum P. II.
 *. Quæ ex vino austero coquuntur, donec mellis
 crassitudinem habeant. Eadem autem compositio
 tonsillis, vnde madentiori, nariumq; vlceribus
 accommodata est. Aliud ad eam piperis P. I. *.
 myrrhæ P. I. *. croci P. II. *. misyos cocti P. I. *.
 aeris combusti P. II. *. primum ex vino austero
 conteruntur, deinde vbi inaruerunt, iterum te-
 runtur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur,
 donec visci crassitudinem habeant. Aerugo quoq;
 cum cocto melle, & ea quæ ad oris vlcera supra
 comprehensa sunt, curant. Aut Erasistrati com-
 positio, aut Cratonis recte super purulenta natu-
 ralia imponitur. Folia quoq; oleæ ex noue cya-
 this vini coquuntur. His adijcitur aluminis scis-
 silis P. IIII. *. lycij P. VIII. *. mellis sesquicya-
 thus. Ac si plus puris est, id medicamentum ex
 melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum
 est, post curationem dum inflammatio manet,
 quale suprapositum est, cataplasma supra dare,
 & quotidie vlcera eadem ratione curare. Quod
 si pus

si pus & multum, & cū malo odore cœpit pro-
 fluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, vt ei mel-
 lis paulum adijciatur: aut oleæ, aut lentisci folia,
 vel marrubium decoquendum est, eoq; humore
 eodem modo cum melle vtendum, imponendaq;
 eadem, aut etiam omphacium cum melle, aut id
 quod ex ærugine & melle ad aures fit, aut com-
 positio Andronis, aut anthera, sic, vt ei paulum
 mellis adijciatur. Quidam vlcera omnia, de qui-
 bus adhuc dictum est, lycio ex vino curant. Si
 verò vlcus latius atq; altius serpit, eodem modo
 elui debet. Imponi verò, aut ærugo, aut ompha-
 cium cum melle, aut Andronis compositio, aut
 marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis co-
 cti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum
 P. I. * minij sinopici P. II. *. Quæ per se singula
 primum teruntur, deinde iuncta iterum melle ad-
 iecto, donec liquidi cerati crassitudinē habeant:
 tum in aneo vase leniter coquuntur, ne super-
 fluant. Cum iam guttæ indurescunt, vas ab igne
 remouetur, idq; medicamentū, prout opus est, aut
 ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per
 se etiam ad fistulas vtile est. Solet etiam inter-
 dum ad nervos vlcus descendere, profluitq; pi-
 tuita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non co-
 cta, aut aquæ similis, in qua caro recens lota est.
 Doloresq; is locus & punctiones habet. Id genus
 quamuis inter purulenta est, tamen lenibus me-
 dicamentis curandum est, quale est emplastrum
 ῥεῖσα & ῥεῖσα ex rosâ liquatum, sicut thuris
 quoq;

quoq; paulum ei misceatur. Aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit, supra verò à me positum est. Præcipueq; id vlcus multa calida aqua fouendum est, velandumq; , neq; frigori commitendum. Interdum autē per ipsa vlcera, coles sub cute exesus, sic vt glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuūq; est, quoties glans, aut ex cole aliquid vel excidit, vel abscinditur, hanc non esse seruandā, ne confidat, vlceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulā quoq; vrinæ includat. Tubercula etiam, quæ φύμαλα Græci vocant, circa glandē oriuntur, quæ vel medicamentis vel ferro aduruntur: & cū crustæ exciderunt, squama aris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De Cancro, qui in cole nascitur, curatione.

Hæc citra cancrum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum in his quoq; vel præcipue vlcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupauit, protinus specillum subiiciendum, eaq; incidenda est, deinde oræ vulsellæ prehendere: tum quicquid corruptū est, excidendum, sic vt ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendum. Quoties quid vstum est, id quoq; sequitur, vt imponenda lenticula sit, deinde vbi crustæ exciderunt, vlcera sic, vt alia, curentur. At si cancer ipsum colem occupauit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeq; id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamēta vincuntur, hic quoq; scalpello quicquid

quid corruptum est, sic ut aliquid etiam integri trahat, præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum est, exciso cancro vulnus esse adurendum. Sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ occalluerunt, magnum periculum est, ne his decidentibus ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ puræ leniter resoluantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immature crustas diduxit, et fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter et timide debet, neque vlllo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De Phagedænæ in cole nascentis curatione.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod φρυγέδαινα à Græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum, sed protinus ipsdem medicamentis occurrendum est, & si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit, ac si sustinuimus, usque ad vesicam tēdit, neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam vrine est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde ferro adurendum. Si verò alte penetravit, quicquid occupatum est præcidendum est. Ceterum eadem, quæ in alijs canceris, faciendæ sunt.

De Carbunculo, qui in cole nascitur.

Occalle

Occallescit etiam in cole interdum aliquid, idq; omni penè sensu caret, quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autē ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est. Deinde ipse quoq; medicamentis vrendus, maximeq; chalcitide cū melle, aut ærugine cum cocto melle. Vbi is excidit, liquidis medicamētis vtendum est, quæ ad ora vlcera componuntur.

De Testiculorum morbis, & eorum curatione.

IN testiculis verò, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est, à cibo abstinendum, imponendum ex faba farina ex mulso cocta, cū cumino contrito ex melle cocto. Aut contritum cuminum cū cerato ex rosa facto. Aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso, aut lilij radix contrita. Aut si ydē induruerunt, imponi debet lini vel fœnigraci semen ex mulso coctū, aut ex cyprino ceratum: aut similia ex vino contrita, cui paulum croci sit adiectum. Si vetustior iam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex ictu tument, sanguinē mitti necessarium est, magisq; si etiam luent. Imponendum verò vtrumlibet ex his, quæ cum cumino cōponuntur, supraq; proposita sunt. Aut ea compositio quæ habet nitri cocti p.i. ✱. resinæ pineæ, gummi, singulorum p.ii. ✱. ruæ taminie sine seminibus p.iiii. ✱. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid desit,

desit, fere quoque increfcit, neque aliter succurri potest, quam si incifo scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

De Rhagadijs, & Condylomate, & Hæmorrhoidibus, alijsq; ani morbis, & curationibus eorum: & primo de Rhagadijs.

ANus quoque multa tædijq; plena mala recipit, nec in se multum abhorrentes curationes habet. At primum in eo sæpe, & quidem pluribus locis, cutis exciditur, Πάγὰ δὲ Græci vocant. Id si recens est quiescere homo debet, & in aqua calida desidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, & ubi induruerunt purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foueri locus, sic ut inuicem utroq; aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhypodes rosa diluendum est, aut byssopum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa factò. Aut eidem cerato liquido plumbum elotum adijciendum. Aut resinæ terebinthinæ myrrha, aut spumæ argenti vetus oleum. Et quolibet ex his id perungendum. Si quicquid læsum est, extrà est, neq; intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, & quicquid antè adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neq; acris cibis utendum, neq; asperis, nec aluum comprimentibus: ne aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

B

De

Condyloma autem est tuberculum, quod ex
 quadam inflammatione nasci solet. Id ubi
 ortum est, quod ad quietē, cibos, potionesq; per-
 tinet, eadem seruari debent, quæ proxime scri-
 pta sunt. Iisdem etiam ovis recte tuberculum id
 fouetur. Sed desiderare antè homo in aqua debet,
 in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimētibz.
 Tum recte imponitur & lenticula cum exigua
 mellis parte, & sertula campana ex uino cocta,
 & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facta,
 & cum eodem cerato contritū uel cotoneum ma-
 lum, uel malicorij ex uino cocti pars interior, &
 chalcitis cocta atque contrita, deinde hyssopo ac
 rosa excepta. Et ex ea compositione, quæ habet
 thuris p. i. ✱. aluminis scissilis p. i i. ✱. cerussæ p.
 i i i. ✱. spumæ argenti p. v. ✱. Quibus dum te-
 runtur, inuicē rosa & vinum instillatur. Vincu-
 lum autē ei loco linteolum, aut panniculus qua-
 dratus est, qui ad duo capita duas ansas, ab alte-
 ra verò parte totidem fascias habet: cumq; sub-
 iectus est, ansis ad ventrē datis à posteriore par-
 te in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi ar-
 tatae sunt, dexteriori sinistra, sinisteriori dextra
 procedit, circumdatæq; circa aluū inter se nouissi-
 me nodo deligantur. Sed si vetus condyloma iam
 induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri
 medicamento potest, quod ex his constat, eruginis
 p. i i. ✱. myrrhæ p. i i i i. ✱. gūmi p. v i i i. ✱.
 thuris p. x i i. ✱. stibis, papaueris lacryma, aca-
 cia,

307
eie, singul. p. xvi. *. quo medicamento quidam
etiam vlcera, de quibus proxime dixi, renouant.
Si hoc parū in cōdylomate proficit, adhiberi pos-
sunt etiam vehemētius adurētia. Vbi cōsumptus
est tumor, ad medicamēta lenia transeundum est.

De Hæmorrhoidibus.

Tertium autem uitium est, ora uenarū tan-
quam ex capitulis quibusdam surgentia,
quæ sæpe sanguinē fundunt, αἱμορροΐδης Græci
vocant. Idq; etiam in ore vuluæ fæminarum in-
cidere consuevit. Atq; in quibusdam parum tutò
supprimitur, qui sanguinis profluuio imbecillio-
res non fiunt. Habent enim purgationē hanc, non
morbum. Ideoq; curati quidam cum sanguinis
exitum non haberent, inclinata in præcordia ac
viscera materia, subitis & grauissimis morbis
correpti sunt. Si cui verò id nocet, is desiderare in
aqua ex uerbenis debet: imponere maxime ma-
licorium cum aridis rosæ folijs contritum, aut ex
his aliqua quæ sanguinem supprimunt. Solet au-
tem oriri inflammatio, maxime vbi dura alius
eum locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum
est, & id fouendum ouis, imponendi vitelli cum
rosæ folijs ex passo* subactō: idq; si intus est, di-
gito illinendum: si extrā, sup̄ illitum pannicu-
lum imponendum est. Ea quoq; medicamēta, quæ
recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt.
Cibis verò in hoc casu ijsdem, quibus in priori-
bus, vtendum est. Si ista parū iuuant, solent im-
posita medicamenta adurentia, ea capitula absu-
mere.

mere. Ac si iam uetustiora sunt, sub autore Dionysio inspergenda sandaraca est, deinde imponendum, quod ex his constat: Squamæ æri, auripigmenti, sing. p. v. ✱. saxi calcis p. vii l. ✱. postero die acu compungendum. Aduſtis capitulis fit cicatrix, quæ sanguinē fundi prohibet. Sed quoties is suppressus est, ne quid periculi afferat multa exercitatiæ digerēda materia est. Prætereaq; & viris et sæminis, quibus mēstrua non proueniunt, interdū ex brachio sanguis mittendus est.

Si anus vel os vuluæ procidit, qua curatione utendum sit.

AT si anus ipse, vel os vuluæ procidit (nam id quoq; interdū fit) considerari debet purum'ne id sit, quod prouolutū est, an humore mucoso circumdatū. Si purū est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis, vel malicorio incocta. Si humidū, vino austero subluendum est, illinendumq; fece vini combusta. Vbi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponendaq; plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum, & sup̄ lana æque deliganda, cruribus inter se deuinctis.

De vlcere fungo simili in ano.

Fungo quoq; simile vlcus in eadē sede nasci solet. Id si hyems est, egelida: si aliud tempus, si hyems, frigida aqua fouendum est: deinde * spuma æris inspergenda, supraq; ceratum ex myrteo factum, cui paulum squamæ fuliginis, calcis sit adiectū. Si id hac ratione non tollitur, vel medicamentis.

mentis uehemētiōribus, vel ferro adurendum est.

De digitorum vlceribus.

CAP. XIX.

Digitorum autem uetera vlcera commodissime curantur, aut lycio, aut myrrha cocta, cum utrilibet uinū adiectum est. In ijsdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consuevit, πύγιον Græci appellant. Oportet alumen melinū rotundū in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum quantū eius aridi fuit, tantundem mellis infundere & radiculam miscere, donec similis croco colore fiat, eoq; illine-re. Quidam ad eundē usum decoquere simul mal-uam solent: cum paria pōdera aluminis aridi & mellis miscuerint. Si hac ratione ea non excide-runt, excidenda sunt: deinde digiti fouēdi aqua ex verbenis, imponendumq; super medicamentū ita factū: Chalcitis, malicoriū, squama aris exci-piuntur fico pingui leniter cocto ex melle. Aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myr-teo facto. Aut æruginis rasæ P.I. ✱. squamæ P.II. ✱. mellis cyatho coguntur, aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horū impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est, tertio die digitus resoluendus est. Si quid aridi est, iterum excidendum, si-milisq; adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandus scalpello, tenuibusq; ferramētis adu-rendus est, & sicut reliqua vsta curandus est. At ubi scabri ungues sunt, circumaperiri debēt,

B 3 quā

quà corpus contingunt, tunc super eos ex hac compositione aque imponi sandaracæ, sulphuris, singulorum P. I I. *. nitri, auripigmenti, singulorum * P. I I. *. resine liquidæ P. V I I I. *. Tertia quoque id die resoluendum est. Sub quo medicamento vitiosi vngues cadunt, & in eorum locum meliores renascuntur.

LIBER VII.

De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis esse Chirurgus debeat, & quid in hoc libro describatur.

ARTIAM esse medicinæ partem, quæ manu curet, & vulgo notum, & à me propositum est. Ea non quidem medicamenta atque victus rationem omittit, sed manu tamen plurimum præstat, estque eius effectus inter omnes medicinæ partes evidentissimus. Siquidem in morbis cum multum fortuna conferat, eademque sæpe salutaria, sæpe vana sint, potest dubitari secunda valetudo medicinæ, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamentis maxime nitimur, quamvis profectus evidentior est, tamen sanitatem & per hæc frustra queri, & sine his reddi sæpe manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest, qui à medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quæ manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiuuetur, hinc tamen plurimum

num trahere. Hæc autem pars cum sit vetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicina Hippocrate, quam à prioribus exculta est. Deinde posteaquam diducta ab alijs habere professores suos cæpit, in Aegypto quoq; increvit, Philoxeno maxime autore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Ammonius Alexandrinus, multiq; alij celebres uiri singuli quædam repperunt. Ac Romæ quoq; non mediocres professores, maximeq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus, & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Meles, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinæ adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certè adolescentiæ propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescente, eaq; non minus sinistra, quam dextra promptus, acie oculorum acri, claraq; animo intrepidus, immisericors, sic ut sanari velit eum, quem accipit, non ut clamore eius motus, vel magis quam res desiderat, properet, uel minus quam necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti proprie vendicandum sit, quia vulnorum quoq; ulcerumq; multorum curationes, quas alibi executus sum, chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare concipio. Atq; ubi se diuiserunt, eum laudo, qui

quàmplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit, & in quibus vulneribus vlceribus ue plus perfici manu, quàm medicamento credo: tum quicquid ad ossa pertinet, quæ deinceps exequi adgrediar, dilatisq; in aliud volumen ossibus, in hoc cetera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibo.

De Luxatis.

CAP. I.

Luxata igitur, in quacunq; parte corporis sunt, quamprimū sic curari debent, vt quæ dolor est, eà scalpello cutis crebro incidatur, detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. Quòd si paulò tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, qua rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunq; is est, id optimū auxilium est. Tum superdanda reprimētia sunt: maximeq; lana succida ex aceto & oleo. Quòd si leuior is casus est, possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoque maxime ex sarmentis. Si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

De his quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sint.

CAP. II.

Verum hoc quidem promptū est. In his autem negotium maius est, quæ per se vitio intus orto intumescunt, & ad suppurationē spectant. Ea omnia genera abscessū esse aliàs proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum.

Nunc

Nunc superest, ut dicam in iisdem quæ manu fieri debeant. Ergo priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet, quæ quicquid illuc malæ corruptaq; materiæ coit, extrahat, idq; iterum tertioq; recte fit, donec omne indicium inflammationis excidat. Neq; tamen fas non est, nihil cucurbitula agere. Interdum enim, sed raro quicquid abscedit, velamento suo includitur, id antiqui tunicam nominabāt. *Tunica.* Meget, quia tunica omnis nervosa est, dicit non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed subiecto iam vetustiore pure callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem si callus est, fieri debet. Neque vlla res prohibet, etiam si callus est, tamen quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoq; maturiore hæc interdum esse consuevit. Ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo siue id incidit, siue iam durities est, in hac auxilij nihil est. Et ut aliàs scripsi, vel auertenda concurrens eò materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præter ea necessarium est. Si pus maturuit in alis quidem & in inguinibus, raro secandum est. Item ubicunque mediocris abscessus est. Item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est, nisi festinare curantis imbecillitas cogit. Satisq; est cataplasmata efficere,

ut per se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autē altius malum est, considerari debet, nervosus ne is locus sit, an non sit. Nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet. Cuius hac gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus euocandum patet, paruaq; postea cicatrix fit.

* ignis a- At si nervi iuxta sunt, * in his periculum est, ne
lienū est vel distendantur hi, vel membrum debilitent. Necessaria verò opera scalpelli est. Sed cetera etiam subcruda aperiri possunt. Inter nervos verò vltima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, eiq; pus iungat, quod propius reperia-
* alia tur. Itemq; * aliam rectam plagam desiderant in carne, quia fere vehementer cutem extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem ubi scalpellus admouetur, id agendum est, ut & quamminimæ, & quamparcissimæ plagæ sint: cum eo tamen ut necessitati succurramus & in modo & in numero. Nam maiores sinus, latius interdum etiam duabus aut pluribus lineis incidendi sunt. Dandaq; opera, ut imus sinus exitum habeat, nequis humor intus subsidat, qui proxima et adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam ubi post longos morbos totus corporis habitus vitiatus est, lateq; se sinus diffundit, & in eo pars cutis pallet, scire licet eam iam emortuam esse, & inutilem futuram. Ideoq; excidere commodius est, maxime si circa articulos maiores

id

id euenit, cubantemq; ægrū fluens aluus *exer- *exhausta
ruit, neq; per alimenta quicquam corpori acce-
dit. Sed excidi ita debet, vt plaga ad similitudi-
nem myrtei folij fiat, quo facilius sanescat. Idq;
perpetuum est. Vbiq; medicus ex quacunque
caussa cutem excidit, pure effuso in alis vel in-
guinibus, linamento opus non est. Spongia ex ui-
no imponenda est. In ceteris partibus, si æquē ea
linamenta supernuacua sunt, purgationis caussa
paulum mellis infundendum, dein glutinantia su-
per danda. Si illa necessaria sunt, super ea quoq;
similiter dari spongia eodem modo ex vino ex-
pressa debet. Quando autem linamentis opus sit,
quando non sit, aliàs dictum est. Cetera eadem,
incisa suppuratione, facienda sunt, quæ ubi per
medicamenta rupta est, facienda esse proposui.

De bonis malisue signis exulceratorum.

CAP. III.

PRotinus autem quantum curatio efficiat,
quantumq; aut sperari aut timeri debeat,
ex quibusdam signis intelligi potest, fereq; ijs-
dem quæ in vulneribus exposita sunt. Nam bo-
na signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti
non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit,
ea vacare. Itemq; habere pus album, leue, non
fædi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus graui-
tas, sitis, cibi fastidium, febris, pus nigrum, aut
feculentum, & fædi odoris. Item procedente cu-
ratione eruptio sanguinis: aut si antequam sinus
carne impleatur, oræ carnosæ fiunt. Illa quoque
ipsa

ipsa carne hebetē nec firma, deficere tamen animam, vel ipsa curatione vel postea, pessimum omnium est. Quinetiā morbus ipse siue subito solutus est, dein suppuratio exorta est, siue effuso pure permanet, non iniuste terret. Estq; inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hac ipsa fortuna huc illuc'ue discernit, sic medici partim est, eniti ad reperiendā sanitatē. Ergo quoties vlcus resiliuerit, eluere id: si reprimendus humor videbitur, vino ex aqua pluuiatili misto, vel aqua in qua lenticula cocta sit, debebit. Si purgandū erit, mulso: rursusq; imponere eadē. Vbi iam repressus videbitur humor, vlcusq; purum erit, produci carnem conueniet, & foveri vulnus pari portione vini ac mellis, superq; imponi spongia ex vino & rosa tincta. Per quæ cum caro producat, plus tamen (ut aliās quoq; dixi) victus ratio eo confert, id est solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita, balneum rarum, quotidiana, sed lenis gestatio, cibi potionesq; corpori reficiendo. Apteq; omnia quæ per medicamenta suppuratione quoq; rupta sequuntur, sed quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reſeruata sunt.

De Fistulis.

CAP. IIII.

Aduersus Fistulas quoq; si altius penetrāt, ut ad vltimas demitti collyrium non possit, si tortuose sunt, si multiplices, maius in manu quā in medicamentis præsidium est, minusq; operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quā si recte

recte intus tendunt. Igitur si sub cute transversa fistula est, demitti specillum debet, supraq; id ea incidi: si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemq; faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulae ventum est, excidendus ex toto calculus est, superq; fibulae danda, & medicamentum quo glutinetur. At si recta subter tendit, ubi, quò maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis iniicienda est, & aequae glutinantia medicamenta superdanda sunt. Aut si corruptius vlcus, quod interdum ossi utiatis fit, ubi id quoq; curatum est, pus mouentia. Solent autem inter costas fistulae subter exire, quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte decidenda & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur: solent ubi costas transierunt, septum id, quod transversum à superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi & ex loco, & ex magnitudine doloris potest, & quia nonnunquam spiritus eo, cum humore quasi bullate prorumpit, maximeq; si hunc ore ille continuit. In eo medicamini locus nullus est. In ceteris verò quae circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt, ceteris quae ad vulnera accommodantur, uti licet. Optime tamen sicca linamenta, vel si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur. Venti nullum os subest, sed ibi perniciosae admodum fistulae sunt, adeo ut Sostratus insanabiles esse credider

diderit. Id non ex toto ita se habere vsus ostēdit. Et quidē (quod maxime mirum videri potest) tutior fistula est contra iecur, & lienem, & ventriculū, quā cōtra intestina: non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locū faciat. Cuius experimento moti quidam autores parum modum rei cognouerūt. Nam venter saepe etiam telo perforatur, prolapsaq; intestina conduntur, & oras vulneris suturae comprehendunt, quod quemadmodū fiat mox indicabo. Itaq; etiam vbi tenuis fistula abdomen perrumpit, excidere eam licet, suturaq; oras coniungere. Si verò ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna vi utiq; ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quaedam finit abdomen, quam *περιτόναιον* Græci vocant. Ergo vbi aliquis ingredi ac moueri cœpit, rumpitur illa sutura, atque intestina soluuntur. Quo fit, vt pereundum homini sit. Sed non omnimodo res ea desperationem habet. Ideoq; tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

De ani fistulis.

Propriā etiamnum animaduersionē desiderāt ea, quæ in ano sunt. In hac demisso specillo, ad vltimum eius caput incidi cutis debet, dein nouo foramine specillū educi lino sequente, quod in aliam eius partem ob idipsum perforatū coniectum sit. Ibi linum prehendendum, vinciendumq; cum altero capite est, vt laxè cutem, quæ super fistulā est, teneat. Idq; linum esse debet crudum,

dum, & duplex triplex'ue, sic tortum vt vinitas
facta sit. Interim autem licet negotia agere, am-
bulare, lauare, cibū capere perinde atq; sanissi-
mo. Tantummodo id linum bis die saluo nodo du-
cendū est, sic vt subeat fistulā pars quæ superior
fuerit. Neq; committendū est, vt id linum putre-
scat. Sed tertio quoq; die nodus resoluendus est,
& ad caput alterum recens linum alligandum,
eductoq; vetere, id in fistula cum simili nodo re-
linquendū. Sic enim id paulatim cutem, quæ su-
pra fistulam est incidit, simulq; & id sanescit,
quod à lino relictum est, & id quod ab eo mor-
detur, inciditur. Hæc ratio curationis longa, sed
sine dolore est. Qui festinat, astringere cutem li-
no debet, quo celerius secet, noctuq; penicillo te-
nuia quædam intus demittere, vt cutis hoc ipso
extenuetur, quo extenditur. Sed hæc dolorem mo-
uent. Adijcitur celeritati sic, vt tormento quoq; ^{*sicut}
si & linum & id quod ex penicillo est, aliquo
medicamento illinitur, ex his quibus callum exe-
di posui. Poterit tamen fieri vt ad scalpelli cura-
tionem etiam illò loci veniendum sit, si intus fi-
stula fort, si multiplex est. Igitur in hæc genera
demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est,
vt media inter eas habenula tenuis admodum
eijciatur, ne protinus ora coeant, sitq; locus ali-
quis linamentis, quæ quàm paucissima super-
inijcienda sunt, omniaq; eodem modo facienda,
qui in abcessibus positus est. Si vera ab vno
ore plures sinus erunt, recte fistula scalpello erit
incid

incidenda, ab eo cetera quæ iam patebunt lino excipiendæ: si intus aliqua procedet, quò ferrum tuto peruenire non poterit, collyrium demittendum erit. Cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manusiue medicamentis agetur, dari debet humidus, potio liberalis, diuq; aqua: ubi iam caro increscit, tum demum & balneis raris vtendum erit, & cibus corpus implentibus.

De Telis è corpore extrahendis.

Tela quoque quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sepe eijciuntur. Suntq; quædã difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte qua venit, aut ab ea in quam tetendit. Illic viam qua redeat, ipsum sibi fecit. Hic à scalpello accipit. Nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum insedit, & in summa est, aut certe magnas venas et loca nervosa non transfijt, nihil melius est, quàm quàm venit, id euellere. Si vero plus est per quod telo reuertendũ, quàm quod perrumpendũ est: iamq; venas nervosq; id trãsit, *eaq; commodius est aperire quod superest, * itaq; extrahere. Nam & propius petitur & tutius euellitur, & in maiore membro si medium mucro transfijt, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrinq; medicamento fouetur. Sed si retro telum recipiendũ est, amplianda scalpello plaga est, quo facilius id sequatur, quoq; minor oriatur inflammatio: quæ maior fit, si ab illo ipso telo dum redit,

dit, corpus laniatur. Itē si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quā ut telo postea transeunte amplietur. Summa autem utraque parte ita habenda cura est, ne nervus, ne vena maior, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumq; scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximendū est, tum quoq; eodem modo & eadē cura habita, ne sub eo quod eximetur, aliquid eorum ledatur, quæ tuenda esse proposui. Hæc communia sunt. Propria quædā in singulis telorum generibus subiicienda sunt, quæ protinus subiiciam. Nihil tam facile in corpore quā sagitta conditur, eademq; altissime insidit. Hæc autem eueniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa in angustio est. Sæpius itaq; ab altera parte, quā ex qua venit recipienda est, præcipueq; quia fere spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, quā si contrā trahuntur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento ad similitudinem facto Græcæ literæ ψ. Deinde ubi apparuit, si mucro, si arundo inheret, propellenda est, donec ab altera parte adprehendi & extrahi possit. Si iam illa decidit, solumq; intus ferrum est, mucro vel digitis adprehendi, vel forfice, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit, euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut arundo, si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaq;

C breuia

breuia & tenuia sunt, forfice ibi communi debent, vacuumq; ab his telum educi: si ea maiora valentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamis contegenda, ac ne quid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc observatio est. Latum verò telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adiiciamus. Euellendum est ergo genere quodam ferramenti, quod Diocleum Græci graphiscum vocant, quoniam autorem Dioclem habet, quem inter priscos maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina vel ferrea vel ænea etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncas habet, ab altero duplicata lateribus leuiterq; extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est, insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est. Hæc iuxta telum transversa demittitur. Deinde ubi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat. Cum in cauo mucro est, ilico duo digiti subiecti partis alterius uncis, simul & ferramentum id extrahunt & telum. Tertium genus telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, eà quæ venit, forfice extrahendum est. Accedit verò aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi in hæsit, vel in articulo se inter duo ossa demersit, in osse usq; eo mouendum

mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu vel forfice telum extrahendum est, quæ ratio in dentibus quoq; eijciendis est. Et vix unquã ita telum non sequitur. Sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramento poterit. Vltimum est, ubi non euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoq; foramine ad speciẽ literæ & contra telũ os excidere, sic vt lineæ quæ deducuntur ad telum spectent, eo facto id necesse est labet, et facile auferatur. Inter duo verò ossa si per ipsum articulũ perruperit, circa vulnus duo membra fascijs habenis'ue deligãda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, vt nervos distendat. Quibus extẽtis laxius inter ossa spatiũ est, vt sine difficultate telũ recipiatur. Illud videndum est, sicut in alijs locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo ledatur, dum id extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si venenato quoq; telo quis ictus est, ysdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis adijcienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autẽ ipsius extracto telo medicina nõ alia est, quàm quæ esset, si corpore icto nihil inhæsisset. De qua satis alio loco dictum est.

De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, & Steatomate capitis tuberculis. CAP. VI.

H*Aec venire in qualibet parte corporis possunt. Reliqua certas sedes habent, de quibus dicam, orsus à capite. In hoc multa va-*

riaq; tubercula oriuntur, γάγγλια, μελιγκίδας,
 & ἀθερώματα nominant, alijsq; etiamnum vo-
 cabulis quædam alijs discernunt, quibus ego τερ-
 τώματα quoque adijciam. Quæ quamvis & in
 cervice et in alis & in lateribus oriri solent, per
 se tamē non posui, cum omnia ista mediocres dif-
 ferentias habeant, ac neq; periculo terreant, neq;
 diuerso genere curentur. Omnia autem ista &
 ex paruulo incipiunt, & diu paulatimq; incre-
 scunt, & tunica sua includuntur. Quædā ex his
 dura ac renitentia, quædam mollia cedentiaq;
 sunt: quædam spatio nudantur, quædam tecta ca-
 pillis suo permanent, fereq; sine dolore sunt. Quid
 intus habeant, vt coniectura præfagiri potest, sic
 ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest.
 Maxime tamen in his quæ renituntur, aut lapil-
 lis quædam similia, aut cōcreti confertiq; pili re-
 periuntur. In his verò quæ cedunt, aut melli si-
 mile aliquid, aut tenui pulticulæ, aut quasi rase
 cartilagini, aut carni hebeti, & cruentæ, qui-
 bus aliqui colores esse consuerunt, fereq; gan-
 glia renituntur. Atheromati subest, quasi tenuis
 pulticula. Meliceridi liquidior humor, ideoq;
 pressum circumfluit. Steatomati pingue quid-
 dam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq;
 totam cutem superpositam, sic, vt ea labet, cum
 in cæteris sit astrictior. Omnia derafa antè, si ca-
 pillis conteguntur, per medium oportet incidere:
 sed steatomatis tunica quoq; secāda est, vt effun-
 datur quicquid intus coit: quia nō facile à cute,
 subiecta

subiecta carne, ea separetur, in ceteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba & intenta se ostendit. Tum scalpelli manubriolo diducenda à cute & à carne est, eijciendaq; cum eo quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicae musculus inhaesit, ne is laedatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Vbi tota exempta est, committendae orae, fibulaq; his iniicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Vbi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum vitiis quæ scalpello & manu curantur.

CAP. VII.

Sed ut hæc neq; genere vitij neq; ratione curationis inter se multum distat, sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diuersa sunt, & aliter aliterq; curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicae nasci solent pingues grauesq;, quæ vix attollere oculos sinunt, leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Fere verò in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute inteta, scapello transversam linea incidere, suspensa leuiter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat, tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere. Facile autem sequitur. Dein superungi collyrio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur, paucissimisq; diebus cicatricula inducitur. Mole-

C 3

stius

stius est, ubi incisa vesica est. Effundit enim humorem, neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quae puri mouendo sunt.

De Crite tuberculo palpebrarum.

IN eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum paruulum nascitur, quod à similitudine ordeï, à Græcis *κρίθῃ* nominatur. Tunica quiddam quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foueri oportet, sic ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione saepe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est exprimi. Eodem deinde vapore postea quoque foueri, & superinungi, donec ad sanitatem perueniat.

De Chalazio palpebrarum.

ALia quoque quaedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur, sed neque utique figuræ eiusdem, & mobilia simul atque digito huc vel illuc impelluntur. Ideoque ea *χαλᾶσις* vocant. Hæc incidi debent, si sub cute sunt, ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. Dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac si intus plaga est, mungendum primo lenibus, deinde acrioribus. Si extrinsecus, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

De vngue oculorum, quod *πλῆθυσιον* Græcis vocatur.

Vnguis

Vnguis verò, quod pterygion Græci vocant, est membranula nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquã ad pupillam quoq; pervenit, eiq; officit. Sæpius à nariû, interdum etiam à temporum parte nascitur. Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueteravit, iãq; ei crassitudo quoq; accessit, excidi debet. Post abstinentiam verò unius diei, vel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic auersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. Quidam si in sinistro oculo vitium est, aduersum: si in dextro resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico. Sed ab hoc, si ille aduersus est, inferiorem: si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recurvato subijcere extremo vngui debet, eumq; infigere, atq; eã quoq; palpebrã tradere alteri, ipse hamulo apprehenso levare vnguem, eũq; acu trajcere linum trahente. Deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, & per ea erecto vngue, si qua parte oculo inhaeret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat. Deinde, inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiat. Duplex enim periculum est, ne vel ex vngue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem, vel ex angulo quoq; caruncula abscinda-

tur, quæ si vehementius unguis ducitur, sequitur.
 Ideoq; decipit: ac si abscissa est, patescit foramen,
ῥυπαῖδα per quod postea semper humor descēdit, ** ῥυαῖδα*
 Græci vocant. Verus ergo anguli finis utiq; no-
 scendus est, qui ubi satis constitit, non nimium ad-
 ducto ungue scalpellus adhibendus est, deinde
 excidenda ea membranula, ne quid ex angulo
 lædatur. Eo deinde ex melle linamentum super-
 dandum est, supraq; linteolum & aut spongia,
 aut lana succida, proximisq; diebus diducendus
 quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpe-
 bræ glutinentur. Siquidem id quoq; tertium pe-
 riculum accedit, eodemq; modo linamētum im-
 ponendum, ac nouissime inungendum collyrio,
 quo vlcera ad cicatricem perducuntur. Sed ea cu-
 ratio ** verna* ratio ** vere* esse debet, aut certe ante hyemem.
 De qua re ad plura loca pertinente semel dixisse
 satis erit. Nam duo genera curationum sunt.
 Alia in quibus eligere tēpus non licet, sed uten-
 dum est eo, quod incidit, sicut in vulneribus, &
 in fistulis. Alia in quibus nullus dies vrget, &
 expectare tutissimū & facile est, sicut euenit in
 ijs, quæ & tarde increscunt, & dolore non cru-
 ciant, in his ver expectādū est. Aut si quid ma-
 gis pressit, melior tamē autūnus vel æstas, quàm
 hyems est. Atq; is ipse medius, iā fractis æstati-
 bus, nōdū ortis frigoribus. Quo magis aut neces-
 saria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoq; ma-
 iori periculo subiecta est, et sæpe quo maior pla-
 ga faciēda, eo magis hæc tēporis ratio seruabit.

De

De Encanthide, tuberculo.

EX curatione verò vnguis, vt dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa alijs quoq; de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum vngue exciso, vel aliter tuberculū, quod palpebris parum diduci patitur, ἐνὸς ᾠθῆς Græce nominatur. Excidi hamulo & circuncidi debet, hîc quoq; diligenter temperata manu, ne quid ex ipso abscindat. Tum exiguum linamentum respergendum est, vel cadmia, vel atramento sutorio, inq; eum angulum diductis palpebris inserendum, supraq; eodē modo deligandum, proximisq; diebus similiter nutriendum, tantum vt primis aqua egelida, vel etiam frigida foueatur.

De Ancyloblepharo oculorum vitio.

Interdum inter se palpebræ coalescunt, apeririq; non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, vt palpebræ cum albo oculi coherescant: scilicet cum in utroq; fuit vlcus negliger curatum. Sanescendo enim quod diduci potuit & debuit, glutinabit, ἀγκυλοβλέφαρον sub utroq; vitio Græci vocant. Palpebræ tātum inter se coherentes, non difficulter diducuntur, sed interdum frustra, nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet, quia bene res sæpius cedit. Igitur aduersum specillum inserendum, diducendæq; eo palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponēda, donec exulceratio eius loci finiatur. Aut vbi albo ipsius oculi palpebra inhaesit, Heraclides Tarentinus autor est, aduerso scalpello

c 5 pello

pello subsecare magna cum moderatione, ut neq;
ex oculo, neq; ex palpebra quicquā abscindatur:
ac si necesse est, ex palpebra potius. Post hæc in-
ungatur oculus medicamentis, quibus aspritudo
curatur, quotidieq; palpebra vertatur, non solū
ut vlceri medicamentū inducatur, sed etiam ne
rursus inhaereat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæ-
pe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum
esse neminē memini. Megeſ se quoq; multa ten-
taſſe, neq; vnquam profuiſſe, quia ſemper iterum
oculo palpebra inhaerit, memoriae prodit.

De Aegilopa, fistula oculorum.

ETiamnum in angulo, qui naribus propior
eſt, ex aliquo vitio quaſi parua fiſtula a-
peritur, per quam pituita aſidue diſtillat, αἰγί-
λοπα Græci vocāt, idq; aſidue male habet ocu-
lum, nōnunquam etiam ex eoſſe uſq; ad nares
penetrat, idq; interdum naturam carcinomatis
habet. Vbi intetæ venæ & recuruatæ ſunt, color
pallet, cutis dura eſt, & leui tactu irritatur, in-
flammationēq; in eas partes, quæ cōiunctæ ſunt,
euocat. Ex hiſ eos qui quaſi carcinoma habent,
curare periculofum eſt. Nā mortem quoq; ea res
maturat. Ea verò quibus ad nares tendit, ſuper-
uacuum: neq; enim ſaneſcunt. At quibus id in an-
* eo, ne gulo eſt, poteſt adhiberi curatio, cum eam non
ignotum ſit eſſe difficilem, quantoq; angulo pro-
pius id foramen eſt, tātō difficilior eſt, quoniam
per anguſtum eſt in quo verſari manus poſſit.
Recenti tamē re mederi facilius eſt. Sed hamulo
ſumm

summum eius foraminis excipiendum, deinde totum id cauum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum, oculoque et cæteris iunctis partibus bene obteclis, os ferramento adurendum est vehementius. Quod si iam carie vexatum est, quo crassior his squama accedat, quidam adurentia imponunt, ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam. Quod et tardius et non idem facit. Osse adusto curatio sequitur eadem, quæ in cæteris vstis.

De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Plli verò qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consuerunt. Nam modò palpebræ superioris summa cutis relaxatur, et procidit: quo fit, ut eius pili ad ipsum oculum conuertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit. Modò sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes verò hæc sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata, in igne coniicienda est. Deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspectu curantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transuat. Deinde iterum tertioque usque ad alterum angulum. Quo fit, ut omnes pilorum radices aduste emoriantur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat, atque ubi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facilime
autem

autem id genus sanescit: quidā aiunt acu transui
iuxta pilos in exteriorē partem palpebræ opor-
tere, eāq; transmitti duplicē capillū muliebrem
ducentem: atq; vbi acus transijt, in ipsius capilli
sinum, quā duplicatur, pilū esse injiciendum, &
per eum in superiorē palpebræ partem attrahen-
dum, ibiq; corpori adglutinandū & imponendū
medicamentum, quo foramen quoq; glutinetur: sic
enim fore, vt is pilus in exteriorē partem postea
spectet. Id primū fieri non potest, nisi in pilo lon-
giore, cum fere breues eo loco nascantur. Deinde
si plures pili sunt, necesse est longū tormentum,
cum toties acus transuet, magnam inflammatio-
nem moueat. Nouissime cum humor aliquis ibi
subsit, oculo & antè per pilos, & tum per pal-
pebræ foramina affecto, vix fieri potest, vt glu-
ten, quo vinctus est pilus, non resoluator. Eoq;
fit, vt is eò vnde vi abductus est, redeat. Ea verò
curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus fre-
quentatur, nihil habet dubij. Siquidem oportet
contecto oculo mediā palpebræ cutem, siue ea su-
perior, siue inferior est, apprehendere digitis, ac
leuare, tum considerare quantulo detracto futu-
rum sit, vt naturaliter se habeat. Siquidem hic
quoq; duo pericula circumstant: si nimium fuerit
excisum, ne contegi oculus non possit: si parum,
ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit.
Quā deinde incidendum videbitur per duas li-
neas atramento notandū est, sic vt de interiore
quæ pilos continet, & propiore ei linea aliquid
relinq

reliquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis scalpellus adhibendus est, & si superior palpebra est, antè: si inferior, postea propius ipsis pilis incidendum, initiumq; faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo qui tempori: in dextro, ab eo qui naribus propior est, idq; quod inter duas lineas est, excidendum. Deinde ora vulneris inter se simplici sutura committendæ, operiendusq; oculus est: & si parum palpebra descendet, laxanda utiq;: si nimium, aut astringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Vbi secta est, aliæ suture adiiciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spōgia ex aqua frigida expressa super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum injiciendum. Quarto sutura tollenda est, & collyrio quod inflammationes reprimat, superinungendum.

De Lagophthalmo oculorum.

Nonnunquam autē nimium sub hac curatione excisa cute euenit, ut oculus non contegatur. Idq; interdum etiā alia de causa fit, *λαγώφθαλμος* Græci appellant. In quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest. Si exiguum, mederi licet, paulum infra supercilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus

nibus eius deorsum spectantibus. Altitudo esse plagæ vsq; ad cartilaginē debet, ipsa illa nihil lesa. Nam si ea incisa est, palpebra cōcidit, neq; attolli postea potest. Cute igitur tantum diducta sit, vt paulum in ima oculi ora descendat, hiantē scilicet sup̄er plagā, in quā linamentū cōiūciendum est, quod & cōiungi diductam cutē prohibeat, et in medio carunculam citet: quæ ubi eum locum impleuit, postea rectē oculus operitur.

De Entropio.

VT superioris autem palpebræ vitium est, quod parum descendit, ideoq; oculum non contegit, sic inferioris, quod parū sursum attollitur, sed pendet & hiat, neq; potest cum superiore committi. Atq; id quoq; euenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute, ἐντροπίον Graci vocant. Si ex mala curatione est, eadem ratio medicinae est, quæ sup̄a posita est, plagæ tantum cornua ad maxillas, non ad oculum conuertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum, & quarto die vapore aquæ calidæ fouēdum inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De Staphylomate oculi.

HAec fere circa oculum in angulis palpebrarūq; incidere cōsueuerunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura acino fit. Vnde id σταφύλωμα Graci

Græci vocāt. Curatio duplex est. Altera ad ipsas radices per medium transuere acu duo lina ducente. Deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex interiore astringere inter se, quæ paulatim secando id excidunt. Altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere, deinde spodium aut cadmiam infricare. Vtrobilibet autem facto, album oui lana excipiendum & imponendum, posteaq; vapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis vngendus est.

De Clauis oculorum.

Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figura similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam aliàs feci mentionē, quia cūna recēs incidit, medicamentis quoq; sepe discutitur. Sed vbi vetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequā dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cuius cognitio, cū ad plura loca pertineat, tum vel præcipuè ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas, ex quibus superior à Græcis νεφροειδής vocatur. Ea qua parte alba est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Huic inferior adiuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa

circa tenuis, vltioribus partibus ipsa quoque
 *χοροειδής plenior, quæ *παροειδής à Græcis nominatur. He
 duæ tunicae cum interiora oculi cingant, rursus
 sub his coeunt, extenuatæq; et in vnum coactæ,
 per foramen, quod inter ossa est, ad membranam
 cerebri perueniunt, eiq; inhaerescunt. Sub his au-
 tem qua parte pupilla est, locus vacuus est. De-
 inde infra rursus tenuissima tunica quæ Hero-
 philus ἀπαροειδής nominauit. Ea media subsi-
 dit, eoq; cauo cōtinet quiddā, quod à vitri simi-
 litudine ὑαλοειδής Græci vocant. Id neq; liqui-
 dum, neq; aridū est, sed quasi cōcretus humor, ex
 cuius colore pupillæ color vel niger est, vel cæ-
 sius, cū summa tunica tota alba sit. Id aut super-
 ueniens ab interiore parte mēbranula includit,
 sub his gutta humoris est, oui albo similis, à qua
 videndi facultas proficiscitur, χευταλοειδής à
 Græcis nominatur. Igitur vel ex morbo vel ex
 ictu cōcrecit humor sub duabus tunicis, quā lo-
 cum vacuum esse proposui: isq; paulatim indu-
 rescens interiori potētiae se opponit. Vitūq; eius
 plures species sunt, quædam sanabiles, quædam
 quæ curationem non admittunt. Nam si exigua
 suffusio est, si immobilis, colorē verò habet ma-
 rinae aquæ, vel ferri nitentis, et à latere sensum
 aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si ma-
 gna est, si nigra pars oculi amissa naturali figu-
 ra in aliā vertit, si suffusioni color cæruleus est,
 aut auro similis, si labat, et hac atq; illac mo-
 uetur, vix vnquam succurritur. Fere verò peior
 est,

est, quo ex grauiore morbo, maioribus'ue capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo vitio tamen aciem hebetem habet. At ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. Oculus quoque curationi neq; exiguus, neque concauus satis opportunus est, atq; ipsius suffusionis quædam maturitas est. Expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quædam concreuisse videatur. Ante curationem autem modico cibo vti, bibere aquam triduo debet, pridie ab omnibus abstinere. Post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso, sic vt contra medicus paulo altius sedeat. A posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. Nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus qui curabitur, immobilior faciendus est, super alterũ lana imposita & deligata. Curari verò sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admouenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda. Sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrũ oculi et angulum temporis propiorẽ è regione mediæ suffusionis, sic ne qua vena ledatur. Neq; tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad quem cum ventũ est, ne mediocriter quidẽ peritus falli potest, quia prementi nihil renititur. Vbi eo ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionẽ est. Leuiterq;

D ibi

ibi uerti & paulatim eam deducere infra regionem pupillæ debet: ubi deinde eam transit, vehementius imprimi ut inferiori parti insidat. Si hæsit, curatio expleta est. Si subinde redit, eadē acus magis cōcidēda, et in plures partes dissipāda est, quæ singulæ & facilius cōduntur, et minus late efficiunt. Post hæc educēda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptū oui album, & supra, quod inflammationē coërceat, atq; ita deuinciendū. Post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorū inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primū liquido ne maxillæ laborent, deinde inflammatione finita, tali, qualis in vulneribus propositus est. Quibus ut aqua quoq; diutius bibatur, necessario accedit.

De Pituita oculorum.

DE pituita quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamētis agendum est, iam explicui. Nunc ad ea veniam, quæ curationem ex manu postulant. Animaduertimus autē quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere, quæ res aspritudinem continuat, ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines excitat, totam deniq; vitam hominis infestat. Idq; in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. Ac primum superuacua curatio est in his qui ab infantibus id vitium habent, quia necessario mansurum

surum est usque mortis diem. Deinde non necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. Si quidem manu nihil adiuuantur, medicamentis, & victus ratione, quæ crassiorē pituitam reddit, ad sanitatē perueniunt. Lata etiam capita vix medicinæ patent. Tum interest venæ pituitam emittant, quæ inter caluariam & cutē sunt, an quæ inter membranā cerebri, & caluariam. Superiores ferè per tēpora oculos rigant, inferiores per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt, non potest his, quæ sub osse. Ac ne his quidem succurritur, quibus pituita utrinque descendit, quia leuata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à supercilijs usque ad verticem illini debent. Si sicci oculi esse cœperunt, apparet per eas venas, quæ sub cute sunt, irrigari. Si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. Si est humor, sed leuior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venæ exerceant, ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Græcia tantummodo, sed in alijs quoque gentibus celebre est, adeo ut nulla medicinæ pars magis per nationes quoque exposita sit. Reperti in Græcia sunt, qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in occipitio rectis, vna super eas transversa, dein duabus

bus super aures, vna inter eas item transversa, tribus inter verticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerēt, cognitisq; ex motu maxillarū musculorum initijs, leuiter super eos cutem inciderent, inductisq; per retusos hamos oris infererēt linamenta, vt neq; inter se cutis antiqui fines cōmitterentur, & in medio caro increfceret, quæ venis ex quibus humor ad oculos transiret, astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerūt à media aure ad mediam alteram aurem, deinde à naribus ad verticem. Tum vbi lineæ committebantur, scalpello inciderūt, & pōst sanguine fuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem & in temporibus, & inter frontem atq; caluariam eminentibus venis idem candens ferrum admouerunt. Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quæ fere quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen vt inflentur magisq; se ostendant, ceruix antè modice deliganda est: tenuibusq; ferramentis, & retusis uenæ adurenda, donec in oculis pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum est quasi excacatorū itinerum, per quæ humor ferebatur. Valentior tamen medicina est, vbi tenues conditæq; venæ, ideoq; legi non possunt. Eodem modo ceruice deligata, retentoq; ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora & inter ceruicem, ac frontem, deinde ceruice resoluta, quæ notæ sunt, venas incidere, & sanguinē mittere.

Vbi

Vbi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. Contra tempora quidem, timide, ne subiecti musculi, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem verò & verticem, vehementer, vt sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem vsque ad os adurunt, sic vt squamam remittat. Sed nihil melius est, quàm quod in Gallia quoq; Comata fit, vbi venas in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Adusta quomodo curanda sint, iam explicui. Nunc illud adijcio, neq; vt crustæ decidant, neq; vt vlcus impleatur adustis venis esse properandum, ne uel sanguis erumpat, uel cito pus supprimatur, cum per hoc siccescere eas partes opus sit, per illud exhauriri opus non sit. Si quando tamē sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. Quemadmodum autem venæ deligendæ sint, quidq; lectis his faciendum sit, cum venero ad crurum varices, dicam.

De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur.

CAP. VIII.

Verum vt oculi multiplicē curationē, etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt, quæ in hac medicinae parte tractentur. Solet tamen euenire vel à prima natali die protinus, vel postea facta exulceratione per cicatricem aure repleta, vt foramen in ea nullum sit, ideoq; audiendi vsu careat. Quod vbi incidit, specillo tentandum est, alte ne id repletum,

D 3 an

an in summo tantum glutinatum sit. Nam si altè est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur nervorum, & ex ea mortis periculum sit. Hoc facile curatur. Nam quia cauum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumq; id patefactum, & iam vlcus purum est, injicienda eò pinna est, illita medicamento cicatricè inducente: circaq; idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit ut ea remota, postea facultas audiendi sit. At ubi aures, in viro puta, perforatae sunt, & offendunt, trajcere id cauum celeriter candente acu satis, ut leniter eius ora exulcerentur, aut etiam adurente medicamento idem exulcerare, postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est (sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt) incidere quod superest ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire: quæ res cum in labris quoq; & naribus fieri possit, eandem etiam rationem habeat, simul explicanda est.

Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo sarciri, & curari possint.

CAP. IX.

Curta

Curta igitur in his tribus, ac si qua parua
paria sunt, curari possunt. Si qua maiora
sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc
ipsam deformantur, ut minus indecora antè fue-
rint. Atq; in aure quidem & naribus deformi-
tas sola timeri potest. In labris verò si nimium
contracta sunt, usus quoq; necessarij iactura fit,
quia minus facile & cibus assumitur, & sermo
explicatur. Neq; enim creatur ibi corpus, sed ex
vicino adducitur: quod in leui mutatione, &
nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna
non potest. Neq; senile autem corpus, neq; quod
mali habitus est, neq; in quo difficulter vlcera
sanescunt, huic medicinae idoneum est, quia nus-
quam celerius cancer occupat, aut difficilius tol-
litur. Ratio curationis eiusmodi est. Id quod cu-
ratur est, in quadratum redigere, ab interioribus
eius angulis lineas transversas incidere, quæ ci-
teriore partem ab ulteriore ex toto diducant:
deinde ea quæ sic*repositimus, in unum adducere. *resolui
Si non satis iunguntur, ultra lineas, quas antè mus
fecimus alias duas lunatas, & ad plagam con-
uersas immittere, quibus summa tantæ cutis di-
ducatur. Sic enim fit, ut facilius quod adducitur,
sequi possit: quod non vi cogendum est, sed ita
adducendum, ut ex facili subsequatur, & *di- *demiss
missum non multum recedat. Interdum autem ab
altera parte cutis haud omnino adducta, defor-
mem quem reliquit locum, reddit. Huiusmodi lo-
ci altera pars incidenda, altera intacta habenda
D 4 est.

est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso imis venarum partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Vtrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. Quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. Sed eadem ratio curandi est, si cartilago in eo quod incisum est eminet, exciderda est. Neque enim aut glutinatur, aut acutò traicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras libera cutis, utrinque coitus puris fieri possit. Tum iunctæ oræ inter se suendæ sunt, utrinque cute apprehensa, & quæ priores lineæ sunt, eà quoque suturæ injiciendæ sunt. Siccis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. In vltiores verò lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut caro increscens vulnus impleat, summaq; cura quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fouendum erit uapore aquæ calidæ, rursusq; idem medicamentum injiciendum, fereq; septimo die glutinatum est. Tum suturæ eximi, & vlcus ad sanitatem perducere debent.

De Polypi curatione per ferrum. CAP. X.

Polypum uerò, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam aliàs posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spathe factò resolvere ab osse oportet: adhibita diligentia

tia, ne infrà cartilago ledatur, in qua difficilis curatio est. Vbi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoq; nares leniter implende. Sanguine suppresso, linamento vulnus purgandum est. Vbi purum est, eò pinna eodem modo, quo in aure suprà positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De Ozæna.

CAP. XI.

ID autem vitium, quod ὀζαίνα à Græcis vocatur, si medicamenti non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit, cum aliquod in ipsa curatione tormentū habeat. Apud quosdam tamen positū est vel sutilem fistulam, vel enodem scriptorium calamū in narem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentū candens dandum esse ad ipsum os, deinde adustum locū purgandum esse æruginē & melle. Vbi purus est, lycio ad sanitatē perducendū. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentū admoueri. Tum sui narem debere, & adustum quidē ulcus eadē ratione curari. Sutura verò illini uel spuma argēti, vel alio glutinante.

De oris vitijs, quæ manu & ferro curantur.

CAP. XII.

D 5 De

IN ore quoq; quædam manu curantur. Vbi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingiuarū arefcentium uitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingiuis admouere, ut leuiter attingat, non ut incidat. Adusta gingiua melle illinenda, & mulso eluenda sunt. Ut pura vlcera esse cæperunt, arida medicamenta infricanda sunt ex his quæ reprimunt. Si verò dens dolores mouet, exiniq; eum, quia medicamenta nihil adiuuant, placuit, circumradi debet, ut gingiua ab eo resoluiatur. Tum is concutiendus est. Eaq; facienda, donec bene moveatur. Nam dens hæres cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. Idq; etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculos'ue concutere. Tum si fieri potest manu, si minus, forfice, dens excipiendus est. Ac si exesus est, antè id foramen vel linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forfice confringatur. Recta verò forfex ducenda est, ne inflexis radicibus os earum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. Neq; ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices habent. Sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingiuae prehēdit & frangit. Proptinus autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet,

licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo
conquirenda est testa, quæ recessit, & volsella
protrahenda est. Si non sequitur, incidi gingiva
debet, donec labans ossis testa recipiatur. Quod si
fractum statim non est, indurescit extrinsecus
maxilla, ut is hiare non possit. Sed imponendum
calidum ex farina & fico cataplasma est, donec
ibi pus moveatur. Tum incidi gingiva debet.
Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est.
Itaque etiam tum id extrahi convenit. Nonnun-
quam etiam eo leso, fistula fit, quæ eradi debet.
Dens autem scaber, qua parte niger est, raden-
dus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gal-
læ quarta pars, & altera myrrhæ sit adiecta.
Continendumque ore crebro vinum meracius. Atque
in eo casu velandum caput, ambulatione multa,
frictione capitis, cibo non acri utendum est. At
si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, au-
ro cum his qui bene hærent vincendi sunt. Con-
tinendaque ore reprimentia, ut vinum in quo ma-
licorium decoctum, aut in quo galla candens con-
iecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens
nascitur quam prior excidat, is qui cadere de-
buit, circum purgandus & euellendus est, is qui
natus est in locum prioris quotidie digito adur-
gendus, donec ad iustam magnitudinem perue-
niat. Quotiescunque dente exempto radix relicta
est, protinus ea quoque ad id facta forfice, quam rhi-
zan Græci vocant, eximenda est. Tonsillas autem,
quæ post inflammationes induruerunt, & uti adis
autem

autem à Græcis appellantur, cum sub leui tunica sint, oportet digito circūradere & euellere: si ne sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere, tum vlcus aceto eluere, et illinere vulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De Vua.

Vasi cum inflāmatione descendit, doloriq; est & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest. Solet enim multum sanguinē effundere. Itaq; melius est his vti, quæ aliās proposita sunt. Si verò inflammatio quidē nulla est, nihilominus autem ea vltra iustum modū à pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. Itemq; si ima, liuida, & crassa, summa, tenuis est. Neq; quicquā cōmodius est, quā vofella prehendere, sub eaq; quod volumus excidere. Neq; enim vllum periculum est, ne plus minus'ue præcidatur, cum liceat tantum infra vofellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est, idq; præcidere quo longior vua est, quā esse naturaliter debet. Post curationē eadē facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

De Lingua.

Lingua verò quibusdā cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidē possunt. Horum extrema lingua vofella prehenda est, sub eaq; mēbrana incidenda, magna cura habita, ne venæ quæ iuxtā sunt, violentur, & profusione sanguinis noceāt. Reliqua curatio vulneris, in prioribus posita est. Et pleriq;

pleriq; quidem ubi confanuerunt, loquuntur. Ego autem cognoui, qui succisa lingua cum abunde super dentes eam premeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est, id quod sequi conuenit.

De Abscessu sub lingua.

Sub lingua quoq; interdum aliquid abscedit, quod serè consistit in tunica; doloresq; magnos mouet: quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est, deinde utrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica vndique circumdata liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior vena incidatur.

De Labris.

Labra autem sæpe finduntur, eaq; res habet cum dolore etiam hanc molestiā, quod sermo prohibetur, qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare cōmodius est, quæ ad vlcera oris fiunt. Si verò altius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spathe simile quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea faciendæ eadem sunt, quæ in auribus adustis exposita sunt.

De Ceruicis vitiis, & curatione. CAP. XIII.

At in ceruice inter cutem et asperam arteriam tumor increfcit, βγογχοκίλην Græci vocant, qua modo caro hebes, modo humor aliquis

quis melli aquæ'ue similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pili immisti. Ex quibus quicquid est, quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica * exeritur. Quo facto, siue humor est, profluit: siue quid densius, digitis educitur, tum vlcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore vna linea inciditur vsq; ad tunicā. Deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusq; cum velamento suo eximitur. Tum aceto cui vel salē vel nitrū aliquis adiecit, eluitur, oræq; vna sutura iunguntur, ceteraq; eadē quæ in alijs suturis superinijciuntur. Leniter deinde, ne fauces vrgeat, deligatur: si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurētia, linamentisq; id curandū est, ceteris pue mouentibus.

De Umbilici vitiis.

C A P. XIII.

Sunt etiā circa Umbilicū plura vitia, de quibus propter raritatē inter autores parū constat. Verisimile est autem id à quoq; prætermisum, quod ipse non cognouerat, à nullo id quod non viderat, fictū. Cōmune omnibus est, umbilicum indecore prominere. Causæ requirūtur. Mleges tres has posuit. Modo intestinum eo irrumperet, modo omentum, modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adiecit, carnem ibi interdum increescere, eamq; modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoq; omenti mentionem omisit. Sed eadem tria

tria causatus, spiritum quoq; interdum eò dixit
irrumperè. Hieron omnibus his quatuor positis,
& omenti mentionem habuit, & eius quod si-
mul & omentum & intestinum habuerit. Quid
autem horum sit, his indicijis cognoscitur. Vbi in-
testinum prolapsum est, tumor neq; durus, neq;
mollis est, omni frigore comminuitur: non solum
sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit.
Sonat interdum, atq; vbi resupinatus est aliquis
delapso intestino ipse desidit. Vbi verò omentum
est, cetera similia sunt, tumor mollior ab * ima * vna
parte, latus extenuatum in ventrem est, si quis
apprehendit, elabitur. Vbi vtrunq; est, indicia
quoq; mista sunt, & inter vtrunq; molities. At
caro durior est, semperq; etiam resupinato corpo-
re tumet, prementiq; non cedit, prioribus facile
cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet,
quas in carcinomate exposui. Humor autem si
premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit,
sed protinus redit, resupinato quoq; corpore tu-
morem in eadem figura tenet. Ex his id quod ex
spiritu vitium est, medicinam non admittit. Ca-
ro quoque carcinomati similis cum periculo tra-
ctatur. Itaq; omittenda est. Sana excidi debet,
idq; vulnus linamentis curari. Humorem quidā
vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus
ijsdem linamentis curant. In reliquis variæ sen-
tentiae sunt. Ac resupinandū quidem corpus esse
res ipsa testatur, vt in vterum siue intestinum,
siue omentum est, delabatur. Sinus verò umbi-
lici

lici tum vacuus à quibusdā duabus regulis exce-
 ptus est, vehementerq; earum capitibus deliga-
 id vitiū tis, ibi emoritur. A quibusdam ad imum acu-
 traiectatur, duo lina ducente, deinde utriusq; li-
 ni duobus capitibus diuersæ partes astringuntur.
 Quod in vna quoq; oculi fit. Nam sic id quod su-
 pra vinculum est, moritur. Adiecerunt quidā,
 vt antequam vincirent, summum vna linea in-
 cideret, exciderentq; quo facilius digito, demis-
 so, quod illuc irrupisset, depellerent, tum deinde
 uinxerunt. Sed abunde est, iubere spiritū cōtine-
 re, vt tumor quātus maximus esse potest, se osten-
 dat, tum imam basim eius atramento notare, re-
 supinatoq; homine digitis tumorem eum preme-
 re, vt si quid delapsum non est, manu cogatur.
 Posthac vmbilicū attrahere, & quā nota atra-
 menti est, lino vehementer astringere. Deinde
 partem superiorem aut medicamentis, aut ferro
 adurere donec emoriatur, atque vt cetera vsta
 vlcus nutrire. Idq; non solum vbi intestinū vel
 omentū uel utrūq; est, sed etiam vbi humor est,
 optime proficit. Sed antè quædam visenda sunt,
 ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curatio-
 ni neq; infans, neq; aut robustus annis, aut senex
 aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartum-
 decimum. Deinde ei corpus idoneū est id, quod
 integrum est. At quod mali habitus est, quodq;
 papulas, impetigines, similiaq; habet, idoneum
 non est. Lenibus quoq; tumoribus facile subue-
 nitur. At in eorum, qui nimis magni sunt, cura-
 tione

tione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, et hybernium vitandum est. Ver idoneū maxime est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc abstinere pridie debet. neq; id satis est. Sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra aluum confidant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

C A P. XV.

Aquam his qui hydropici sunt emitti oportere aliās dixi. Nunc quemadmodum id fiat, dicendum. Quidam autem sub umbilico fere quatuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato, facere consuerunt. Quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso, quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. Ferramentū autem demittitur, magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, ut ferè tertiā digiti partem latitudo mucronis impleat. Demittendumq; ita est, ut membranā quoq; transeat, qua caro ab interiore parte finitur, eò tum plumbea aut anea fistula injicienda est, vel recuruatis in exteriorē partem labris, vel in media circū surgente* quodam nodo, ne tota intus delabi possit, huius ea mora pars quæ intrā, paulò longior esse debet, quàm quæ extrā, ut ultra vltiorem membranā procedat. Per hanc effundendus humor est. Atque ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est, & in vulnere, si id ustū non est, relinquenda. Deinde per insequētes dies

B circa

circa singulas heminas emittendū, donec nullum aque vestigiū appareat. Quidā tamen etiā non vsta cute protinus fistulā recipiūt, & super vulnus spongiā expressā deligāt. Deinde, postero die rursus fistulā demittunt, quod recens vulnus paulū diductū patitur, vt si quid humoris superest, emittatur. Idq; bis ita fecisse contenti sunt.

De intestinorum vulneratorum curationibus.

C A P. XVI.

Nonnunquā autem venter ictu aliquo perforatur, sequiturq; vt intestina euoluantur. Quod vbi incidit, protinus considerandū est, an integra ea sint, deinde an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatū est, nihil profici posse iam retuli. Latius intestini sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod dubia spes certa desperatione sit potior. Interdū enim glutinatur. Tum si vtrūlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoq; necessario accedit, vt sensu careat, medicina omnis inanis est. Si verò adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est. Momento enim alienātur externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. Et si angustius vulnus est, quā vt intestina commode refundantur, incidendum est donec satis pateat. Ac si iam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulum admodum olei sit adiectum. Tum minister oras vulneris leniter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis

hamis membranae interiori iniectis debet, medicus priora semper intestina quae posteriora prolapsa sunt, condere, sic ut orbium singulorum locum seruet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. Quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, & inibi concidant. His conditis omentum quoque considerandum est, ex quo si quid iam nigri & emortui est, forfice excidi debet. Si quid integrum est, leniter super intestina diduci: sutura autem neque summae cutis, neque interioris membranae per se satis proficit, sed utriusque. Et quidem duobus lineis vincienda est spissior, quam alibi: quia rumpi & facilius motu ventris potest, & non aequè magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duabus acubus fila traiecienda, eaque duabus manibus tenenda, et prius interiori membranae sutura iniicienda est, sic ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. Quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acum longè sit, quae retusa est. Semel utraque parte traiecta permutandae acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quae fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit. Iterumque eodem modo per oras immittendae sunt. Atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Posthaec eadem fila, eademque acus ad cutem transferenda. Similique ratione ei quoque parti utraque sutura

B 2 inijc

inijcienda, semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus traiectis. Dein glutinātia inijcienda. Quibus aut spongiā, aut succidā lanam ex aceto impressam accedere debere manifestius est, quā ut semper dicendū sit. Impositis his leuiter deligari venter debet.

De Interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit. C A P. XVII.

Interdum tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra, rumpitur. Quod fœminis quoque ex vtero saepe euenire consuevit, sit q; præcipue circa ilia, sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisq; intenta cutis indecore intumescat. Atq; id quoq; aliter ab alijs curatur. Quidam enim per acum duobus lineis ad imam basim immisissis, sic vtrinque deuinciunt, quemadmodum & in vmbilico, & in vna positum est, ut quicquid super vinculum est, emoriatur: quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folij, quod semper eodem modo seruandū esse iam posui, & tum oras sutura iungunt. Commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quāq; integra est, ea magis obnitatur, tum qua rupta videbitur, immittendæ
 due li- scalpello due tunice sunt, ut exciso medio interior membrana vtrinque recentem plagam habeat,

beat, quia quod vetus est, sutura non coit, loco patefacto. Si qua parte membrana non nouam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quæ tantum ora eius exulceret. Cætera, quæ ad suturæ reliquam curationem pertinent, suprâ comprehensa sunt.

De Varicibus ventris.

PRæter hæc euenit, vt in quorundâ ventribus varices sint, quarû quia nulla alia curatio est, quàm quæ in cruribus esse cõsuevit, tum eam partẽ explanaturus, hanc quoq; eò differo.

De Testiculorum natura, & morbis eorum.

CAP. XVIII.

Venio autẽ ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent, quæ quo facilius explicẽ, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam medullis habent. Nam sanguinẽ non emittunt, & omni sensu carent. Dolẽt autẽ in ictibus & inflammationibus tunica, quibus hi continentur. Depẽdẽt verò ab inguinib. per singulos nervos, quos νεμῶνες Græci nominant, cum quorum utroq; bina descendunt & venæ & arteriæ. Hæ autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ* ἐγυργειδὺς à Græcis nominatur: super eam valentior tunica est, quæ in-
teriori vehementer ima parte inheret, Darton Græci vocant. Multæ deinde membranulæ venas & arterias, eosq; nervos comprehendunt. Atq; inter duas quoque tunicas superioribus parti-

bus leues, paruulaq; sunt. Haftenus propria v-
 triq; testiculo & velamenta & auxilia sunt.
 Cōmunis deinde vtriq; , omnibusq; interioribus
 sinus est, qui iam cōspicitur à nobis, δσχεδὺ Græ-
 ci, scrotum nostri vocant, isq; ab ima parte me-
 dijs tunicis leuiter innexus est, à superiore tan-
 tum circumdatus est. Sub hoc igitur plura vitia
 esse consuerunt. Quæ modo ruptis tunicis, quæ ab
 inguinibus incipere proposui, modò his integris
 fiunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum
 inflammatur, deinde postea pondere abrumpi-
 tur, vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tuni-
 ca, quæ diducere ab inferioribus partibus inte-
 stina debuit, tñ pondere eò deuoluitur, aut omen-
 tum, aut etiam intestinum. Atq; ibi reperta via,
 paulatim ab inguinibus in inferiores quoq; par-
 tes* demissum, subinde neruosas tunicas, & ob
 id eius rei patientes diducit, ἐντὶ σπονκίαν &
 ἐπιπλοκίαν Græci vocant, apud nos indecorū,
 sed commune his Herniæ nomen est. Deinde, si
 descendit omentum, nunquam in scroto tumor
 tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc illuc' ve
 conuersum, aut aliquo modo collocatum. Itemq;
 si retentus est spiritus, nō magnopere increscit,
 tactu verò inequalis est, & mollis, & lubricus.
 At si intestinum quoq; descendit,* tumor is sine
 inflammatione modò minuitur, modò increscit.
 Estq; ferè sine dolore, & cum conquiescit ali-
 quis, aut iacet, interdū ex toto desidit, interdum
 sic diuiditur, vt in scroto exiguae reliquæ ma-
 neant.

scrotum.

*nifum

Hernia.

*humor

is

neant. At si clamore & satietate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit, frigore omni contrahitur, calore diffunditur. Estq; tum scrotum & rotundum, & tactu leue, idq; quod subest, lubricum est: si pressum est, ad inguen reuertitur, dimissumq; iterum cum quodam quasi murmure deuoluitur. Et id quide in leuioribus malis euenit. Nonnunquam autem, stercore accepto vastius tumet, retroq; compelli non potest: adfert tum dolorem & scroto, & inguinibus, et abdomini: nonnunquam stomachus quoq; affectus, primum ruffam bilem per os reddit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram. Integris vero membranis interdum eam partem humor distringit. Atq; eius quoq; species due sunt. Nam vel inter tunicas is increscit, vel in membranis, quae ibi circa venas et arterias sunt, ubi ha grauata occaluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, una sedes est. Nam modo inter summam & mediam, modo inter mediam & imam consistit. Graeci communi nomine quicquid est, ὑδρόκλις appellant: nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoq; sub eodem nomine, quo priora habent. Signa autem quaedam communia sunt, quaedam propria. Communia, quibus humor deprehenditur. Propria, quibus locis humorem subesse dicimus: si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum leuior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeq; in pueris, isq; moris est, si

non nimius humor subest. At si is vehementer increuit, renititur sic, ut vter repletus, & arte astrictus. Venæ quoq; in scroto inflantur, & si digito pressimus, cedit humor, circumfluensq; id quod non premitur, attollit, & tanquam in vitro cornu' re per scrotum apparet, isq; (quantum in ipso est) sine dolore est. Sedes autem eius sic deprehenditur: Si inter summam mediamq; tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertēs subit, scrotum ipsius albidius est. Si ducitur, aut nihil, aut paruulū intenditur, testiculus ea parte neq; visu, neq; tactu sentitur. At si sub media tunica est, intētum scrotum magis se attollit, adeo, ut superior coles sub tumore eo delitefcet. Præter hæc æque integris tunicis ramex innascitur κισσονίαν Græci appellant, cum venæ intumescunt. Hæ quoq; intortæ conglomeratæq; ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam. Interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculū neruumq; eius increfcunt. Ex his eæ quæ in ipso scroto sunt, oculis patent: hæ verò quæ mediæ imæ' ve tunicæ insident, ut magis conditæ, non æquè quidem cernuntur, sed tamen etiam visui subiectæ sunt, præterquàm quòd & tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo: & id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum toros inæquale est: & qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. Cum verò etiam super ipsum testiculum
neruumq;

neruumq; eius, id malum increuit, aliquāto longius testiculus ipse descendit, minorq; altero fit, utpote alimento amisso. Raro, sed aliquando caro quoque inter tunicas increfcit, σαρκονήλην Græci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoq; adfert, & nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina atq; ilia peruenit, partesq; hæ intumescunt: neruus ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulq; indurefcit: super hæc inguen quoq; nonnunquam varices implent, βεβρωμήλην appellant.

De testiculorum curationibus communibus, & primò de incisione & curatione inguinis, vel scroti.

CAP. XIX.

HIs cognitis, de curatione dicendum est, in qua quedam cōmunia omnium sunt, quedam propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. Nam quæ vel sanari nō possint, vel aliter nutriri debeant, dicendum erit, simul ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In vtraq; curatione, homo ante triduum bibere aquam, pridie abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus: deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube contegitur, antè radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunica inferiores committuntur. Ape-

E 5 riendum

riendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perueniaturq; ad eam, qua media est plaga facta. Foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistra manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis simul laxet. Minister autem sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quammaximè ab inguinibus abducere: primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito deducere non potest, scalpello abscindat. Deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoq; inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multe venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores verò antè longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sanguinem fundat. Si media tunica vexata erit, aut sub ea malum increuerit, excidenda erit, sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. Infra tamen non tota demenda est. Nam quod ad basim testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. Itaq; ibi relinquendum est. Idem in ima quoq; tunica, si lesa est, faciendum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra paulum ea abscindenda, ne lesa abdominis membrana inflammationes moueat. Neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne post

ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præstet. Purgatus ita testiculus per ipsam plagam, cum venis & arterijs, & nervo suo leuiter demittendus est, videndumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne' ve concretus aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit: lina quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt, quæ pure orto sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagæ injicienda duæ fibulae sunt, & insuper medicamentum quo glutinentur. Solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leuiter tantis ponenda sunt, supraq; ea quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto vellana succida vel sponsia. Cætera eadem quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. At cum infra incidi oportet, resupinato homine subiicienda sub scroto sinistra manus est, deinde id vehementer apprehendendum, et incidendum. Si parvulum est quod nocet, modice, ut tertia pars integra ad sustinendum testiculum infra relinquatur. Si maius est, etiam amplius, ut paulum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus, quamleuissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat. Tum inclinandus mucro est, ut transversa membrana secet, quæ inter summam mediamq; tunicam sunt. At si vitium in proximo est, mediam
tunicam

tunicam attingi non oportet. Si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est, sic ut tertia quoque, si illa vitium tegit. Vbiq; repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubriolo, vel scalpello diductam inferiorem partem tunica extra collocare: deinde eam ferramento, quod ad similitudinem curuum vocant, incidere, sic ut in eandem intrare duo digiti, index & medius possint. His deinde coniectis, excipienda reliqua pars tunice, & inter digitos scalpellus immittendus est, eximendumq; aut effundendum quicquid est noxium. Quancumq; autem tunicam quis violauit, illam quoque debet excidere, ac mediam quidem (ut supra dixi) quam altissime ab inguine, imam autem paulo infra. Caterum antequam excidantur, he quoque vinciri lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relinquenda sunt, sicut in alijs quoque venis, quae id requisierint. Eo facto testiculus intus reponendus est, oraq; scroti suturis inter se committenda, neq; paucis, ne parum glutinentur, et longior fiat curatio, neq; multis, ne inflammationem augeant. Atq; hic quoque videndum est, ne quid in scroto sanguinis maneat. Tum imponenda glutinamenta sunt. Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, incidi subter id debet, purgatoq; eo sponsa acri aceto madens circumdari. Deligatur autem vulnus omne, quod ex his causis factum est. Si
dolor

dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluendum, sed bis die tantum aceto irroranda lana vel spōgia. Si dolor est, tertia die resoluendum, & ubi fibulae sunt, hae incidendae, ubi linamentum, id mutandum est: rosaque & vino madesaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increscit, adijciendum prioribus cataplasma ex lenticula et melle, vel ex malicorio, quod in austero vino coctum sit, vel ex his mistis. Si sub his inflammatio non conquierit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fouendum, donec scrotum ipsum & extenuetur, & rugosius fiat. Tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. Quae ipsa si robustus curatur, ex aceto si tener, ex melle coquenda sunt. Neque dubium est, quodcumque initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quae prius mouent, imponenda sint. Quod si prius in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur. Linamentumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Haec proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. Cetera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quae in alio quoque vulnerum genere praecipimus.

De Intestini curatione.

CAP. XX.

His propositis ad singulas species veniendum est, ac si cui paruulo puero intestinum descendit ante scalpellum experienda iunctura est.

est. Fascia eius rei causa fit, cui imo loco pila as-
futa est ex panniculis facta, quæ ad repellendum
intestinum ipsi illi subijcitur, deinde reliqua fa-
scia pars arcte circumdatur, sub quo sæpe & in-
tus compellitur intestinum, & inter se tunicæ
glutinantur. Rursus si ætas processit, multumq;
intestini descendisse ex tumore magno patet, ad-
ijciunturq; dolor & vomitus, quæ ex stercore,
& ex cruditate eò delapso ferè accidunt, scal-
pellum adhiberi sine pernicio non posse manife-
stum est. Levandum tantummodo malum, &
per alias curationes extrahendum est. Sanguis
mitti ex brachio debet, deinde, si vires patiun-
tur, imperanda tridui abstinencia est: si minus,
certe pro vi corporis quamlongissime. Eodẽ verò
tempore supèr habendum cataplasma ex lini se-
mine, quod antè aliquis ex mulso decoxerit. Post
hæc & farina hordeacea cum resina injicienda,
& is demittendus in solium aquæ calidæ, cui o-
leum quoq; adiectum sit, dandumq; aliquid cibi
lenis calidi. Quidam etiam aluum ducunt. Id du-
cere aliquid in scrotum potest, educere ex eo nõ
potest. Per ea verò, quæ suprà scripta sunt, leua-
to malo, si quando aliàs dolor reuerterit, eadem
erunt facienda. Sine dolore quoq; si multa inte-
stina prolapsa sunt, secari superuacuum est, non
quòd excludi à scroto non possint, nisi tamen id
inflammatio prohibuit, sed quò repulsa inguini-
bus immorentur, ibiq; tumorem excitent, atque
ita fiat mali non finis, sed mutatio. At in eo quẽ
scalpello

scalpello curari oportebit, simulatq; ad mediam tunicam vulnus in inguine factum peruenerit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. Neq; enim cum periculo leditur, quæ excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. Vbi deducta autem erit, ab inguine usq; ad testiculum incidi debet, sic, ne ipse ledatur, tum excidi. Ferè tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit. Si vir robustus est, maiusq; id vitium est, extrahi testiculus nõ debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usq; ad mediam tunicam scalpello aperitur, eaq; tunica eodem modo duobus hamis excipitur, sic ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tñ ea tunica deorsum versus scalpello inciditur, sub eaq; index digitus sinistrae manus ad imum testiculum demittitur, eumq; ad plagam cõpellit. Deinde dexterae manus duo digiti pollex atq; index, venam & arteriam & neruum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. Quod si aliquæ membranulae prohibent, scalpello resoluuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. Excisis quæ excidenda sunt, repositoq; testiculo, ab ora quoq; eius vulneris, quod in inguine est: demenda habenula paulò latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

De

AT si omentum descendit, eodē quidem modo, quo suprà scriptum est, aperiendum inguen, diducendæq; tunicae sunt. Cōsiderandum autē est, maior ne is modus, an exiguus sit. Nam quod paruulum est, super inguen in aluum vel digito vel auerso specillo repellendum est. Si plus est, sinere oportet dependere, quantum ex vtero prolapsum est, idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur & excidat. Quidam hic quoq; duo lina acu trañciunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. Sub quo æque, sed tardius emoriatur. Adycitur tamen hic quoq; celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis quæ sic exedunt, ^{* οὐπ' α'.} ne erodant, οὐπ' α' Græci vocant. Fuerunt etiā qui omentum forfice præciderent, quod in paruulo non est necessarium. Si maius est, potest profusionem sanguinis facere. Siquidem omentum quoq; venis quibusdam etiam maioribus illigatū est. Neq; verò si discussso ventre id prolapsum forfice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius auelli nō possit, inde huc exemplum transferendum est. Vulnus autem curari, si relictum omentum est, futura debet. Si id amplius fuit, & extrā emortuum est, excisis oris, sicut suprà propositum est. Si verò humor intus est, incidendum est, in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet; in viris verò & vbicunq; multus humor subest.

subest, scrotum. Deinde si inguen incisum est, eò protractis tunicis humor effundi debet. Si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quàm humor est effundendus, abscindendaq; membranæ sunt, si quæ eum cōtinuerūt: deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adiectū, vel nitrum habeat: si sub media, ima'ue tunica, totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæq; sunt.

De Ramicis curatione.

CAP. XXII.

Ramex autem, si super ipsum scrotum est, radurendus est tenuibus & acutis feramentis, quæ ipsis uenis infigantur, cum eo ne amplius quàm has vrant, maximeq; vbi inter se implicatæ glomerantur, eò ferrum id admouendum est, tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est, vtendumq; eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. Tertio die lenticula cum melle imponenda est, post eiectis crustis vlcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus uerò super mediam tunicā uenæ tument, incidendū inguen est, atq; tunica promouēda, ab eaq; venæ digito vel manubriolo scalpelli separanda. Qua parte verò inhærebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vinciendæ, tum sub ipsis vinculis præcidendæ, reponēdusq; testiculus est. At vbi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si duæ tres'ue venæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, vt maiore vitio vacet, idem facien-

F

dum

dum quod supra scriptum est, ut ab inguine & à testiculo deligatae venae praecidantur, usque con-
datur. Sin totum id ramex obsederit, per pla-
gam demittendus digitus index erit, subyicien-
dusque venis, sic ut paulatim protrahat aequè ad-
ducendo, donec is testiculus par alteri fiat. Tum
fibulae oris sic vinciendae, ut simul eas quoque ve-
nas comprehendant. Id hoc modo fit: Acus ab
exteriore parte oram vulneris perforat. Tum
non per ipsam venam, sed per membranam eius
immittitur, per eamque in alteram oram compul-
latur. Venae vulnerari non debent, ne sanguinem
fundant. Membrana semper inter has venas est,
ac neque periculum affert, & filo comprehensas
illas abunde tenet. Itaque etiam satis est, duas
fibulas esse: tum venae quaecunque protractae sunt
in ipsum inguen, aduerso specillo comprehendi
debent: soluendi fibulas tempus inflammatione
finita & purgato vulnere est, *ut vna simul &
oras & venas cicatrix deuinciat. Vbi verò
inter imam tunicam & ipsum testiculum ner-
uumque eius ramex ortus est, vna curatio est, quae
totum testiculum abscindit. Nam neque ad gene-
rationem quicquam is confert, & omnibus inde-
core, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed
tum quoque inguen incidendum, media tunica
promenda, atque excidenda est, idem in ima fa-
ciendum, neruusque ex quo testiculus dependet,
praecidendus. Post id venae & arteriae ad in-
guen lino deligandae, & infra uinculum abscin-
dendae

denda sunt.

De Carne quæ inter tunicas testiculorum concreuit, & de nervo indurato. CAP. XXIII.

Caro quoq; si quando inter tunicas concreuit, nihil dubij est, quin eximenda sit, sed id ipso scroto inciso fieri comodius est. At si nervus induruit, curari res neq; manu neq; medicamento potest. Urgent enim febres ardentes, & aut virides aut nigri vomitus: præter hæc ingens sitis, & linguae aspritudo, fereq; à die tertio spumās bilis aluo cum rofione redditur. Atq; neq; assumi facile cibus, neq; cōtineri potest, neq; multo pōst extremæ partes frigesçūt, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur, deinde in fronte frigidus sudor, eumq; mors sequitur.

De Ramice inguinis.

CAP. XXIIII.

Vbi verò in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, semel incidi: si maior duabus lineis debet, vt medium excidatur: deinde non extracto testiculo, sicut intestinis quoq; prolapsis interdum fieri docui, colligendæ venæ vinciendæq; vbi tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidendæ sunt. Neq; quicquam novi curationis vulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis, si nuda est.

CAP. XXV.

Ab his ad ea transeundum est, quæ in colipso sunt, in quo si glans nuda est, vultq; aliquis eam decoris caussa tegere, fieri potest, sed

F 2

exped

expeditius in puero quàm in viro. In eo cui id naturale est, quàm in eo, qui quarundam gentium more circuncisus est. In eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uerò ipse coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, eiusmodi est: Cutis circa glandem apprehenditur & extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem tergus inciditur, donec coles nudetur, magnaq; cura cauetur ne vel urinae iter, vel venæ, quæ ibi sunt, incidantur. Eo facto cutis ad vinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem velut circulus, eoq; linamēta dantur, ut caro increseat & id impleat, satisq; velamenti supra latitudo plagæ præstat. Sed donec cicatrix sit, vinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguò urinae itinere. At in eo qui circuncisus est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita dolet, quia summo soluto, deduci deorsum vsque ad pubem manu potest. Neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. Tum multa frigida aqua fouetur, emplastrumq; circa datur, quod valentem inflammationem reprimat, proximisq; diebus ut propè à fame uictus est, ne forte eam partem satietas excitet. Vbi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube vsq; circulum. Super glandem autem aduerso emplastro imposito induci. Sic enim fit, ut inferior pars glutinetur, superior ita sanescat,

nescat, ne inhaereat.

Quomodo glans penis contecta aperiri possit.

Contra si glans ita contecta est, ut nudari non possit, quod vitium Græci *φύμωσις* appellant, aperienda est. Quod hoc modo fit: Subter à summa ora cutis inciditur recta linea usque ad frænum, atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est, sic ut vertex eius ad frænum basis in tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est donec cicatrix sit conquiescere. Nam ambulatio atterendo ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoque adolescentulos interdum uocis, interdum valetudinis causa quidam consuerunt. Eiusque hæc ratio est. Cutis quæ super glandem est extenditur, notaturque utrinque à lateribus atramento quæ perforatur, deinde remittitur. Si super glandem notæ reuertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet. Si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est. Tum quæ notæ sunt, cutis acu filum ducente transuitur, eiusque fili capita inter se deligantur, quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatricula fiant. Vbi hæc confirmatæ, exempto filo fibula additur, quæ quo melior, eo lenior est. Sed

F 3

hoc

hoc quidem sæpius inter superuacua, quam inter necessaria est.

De urinae reddendæ difficultate, & de Calculo,
rationibusq; eorum. CAP. XXVI.

R Es verò interdū cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. At mediocris quoque inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. Idq; non in viris tantummodo, sed in fœminis quoque interdum necessarium est. Ergo aeneæ fistulae fiunt, quæ ut omni corpori ampliori minoriq; sufficiant, ad maiores tres, ad fœminas due medico habendæ sunt. Ex virilibus maxima decem & quinque est digitorum: media, duodecim: minima, novem. Ex muliebribus, maior novem: minor, sex. Incuruas verò esse eas paulum, sed magis viriles oportet, leuesq; admodum: ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. Homo tum resupinus, eo modo quo incuratione ani figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra verò fistulam demittere in iter urinae debet. Atq; ubi ad cervicem vesicæ ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Fœmina brevius urinae similiter & rectius iter habet, quod mammula simile interimas oras super naturale positū, non minus sæpe
auxil

auxilio eget, aliquanto minus difficultatis exigit. Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longè ab exitu inhaerescit. Eum si fieri potest, oportet vellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quamplurimum attrahenda, & condita glande lino vincienda est, deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est, tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis conegat, & vrina naturaliter profluat.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Cum vesicæ verò calculi q; facta mentio sit, locus ipse exigere videtur, ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum præceptis sit, nullo modo conuenit: ac neq; omni tempore, neq; in omni ætate, neque in omni vitio id experiendū est, sed solo vere, in eo corpore, quod iam nouem annos, nondum quatuordecim excessit, & si tantum mali subest, ut neq; medicamentis vinci possit, neq; etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat, sed quo sæpius utiq; in hoc fallat, in quo plura & genera & tēpora periculi sunt. Quæ simul cum ipsa curatione proponam. Igitur ubi vltima experiri statutū est, antè aliquot diebus victu corpus preparandum est, ut modi-

cos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi verò inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicæ cervicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Vbi eius res fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur: Homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumq; eum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis comprehendit, reductisq; eius cruribus, ipsum quoque iubet manibus ad suos poplites datis eos quam maxime possit attrahere, simulq; ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo ualentes insidunt, quo & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter prout consedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulq; ipse poplites suos attrahit. Siue autem unus, siue duo continent, super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc etiamnum à lateribus duo ualentes obijciuntur, qui circumstantes leuare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde diligenter ungibus circuncisis, atque sinistra manu duos eius digitos,

to, indicem et medium, leniter prius vnum, de-
inde alterum in anum eius demittit, dextraq;
digitos super anum abdomen leniter imponit, ne
si vtrinq; digiti circa calculum vehementer con-
currerint, vesicam ledant. Neq; verò festinan-
ter in hac re, vt in plerisq;, agendum est, sed ita,
vt quammaxime id tuto fiat. Nam lesa vesica
neruorum distentiones cum periculo mortis ex-
citât. Ac primum circa ceruicem quæritur cal-
culus. Ibi repertus minore negotio expellitur.
Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc
indicijs suis cognitum est. Si verò aut ibi non
fuit, aut recessit retro, digiti ad vltimam vesi-
cam dantur, paulatimq; dextra quoque manus
eius vltra translata subsequitur. Atque vbi re-
pertus est calculus, qui necesse est in manus in-
cidat, eo curiosius deducitur, quo minor leuiorq;
est, ne effugiat, id est, ne sæpius agitanda vesica
sit. Ergo vltra calculum dextra semper manus
eius opponitur, sinistra digiti deorsum eum
compellunt, donec ad ceruicem peruenitur. In-
quam si oblongus est, sic compellendus est, vt
pronus exeat: si planus, sic, vt transuersus sit:
si quadratus, vt duobus angulis sedeat: si altera
parte plenior, sic vt prius ea, qua tenuior sit,
euadat. In rotundo nihil interesse ex ipsa figu-
ra patet, nisi si leuior altera parte est, vt ea an-
tecedebat. Cum iam eò venit, vt incidi super ve-
sicæ ceruicē iuxta anum cutis plaga lunata usq;
ad ceruicem vesicæ debeat, cornibus ad coxas,

spectantibus paulum, deinde ea parte qua stri-
 etior ima plaga est, etiamnum sub cute altera
 transversa plaga facienda est, qua cervix ape-
 riatur, donec urine iter pateat, sic ut plaga pau-
 * meatum lo maior, quam calculus sit. Nam qui * metu fi-
 * χοριάδα stula, quam illo loco * ἔκθραρ Græci vocant, pa-
 vel ἔκθρα- rum patefaciunt, cum maiore eodem periculo re-
 δα uoluntur, quia calculus iter, cum vi promitur,
 facit, nisi accipit. Idq; etiam perniciosius est, si
 figura quoque calculi vel aspritudo aliquid eò
 contulit. Ex quo et sanguinis profusio, et dis-
 sentio nervorum fieri potest. Quæ si quis evasit,
 multo tamē patientiorem fistulam habiturus est,
 rupta ceruice, quam habuisset incisa. Cum verò
 patefacta est, in conspectum calculus venit, in
 cuius corpore nullum discrimen est. Ipse si exi-
 guus est, digitis ab altera parte propelli, ab alte-
 ra protrahi potest. Si maior, injiciendus à supe-
 riore ei parte vncus est, eius rei causa factus.
 Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem
 retusa latitudinis, ab exteriori parte levis qua
 corpori iungitur, ab interiori asper, qua calcu-
 lum attingit. Isq; longior potius esse debet. Nam
 brevis extrahendi vim habet. Vbi injectus est,
 in utrunque latus inclinandus est, ut appareat
 calculus, et teneatur, quia si apprehensus est,
 ille simul inclinatur. Ideoq; eo minimo opus est,
 ne cum adduci vncus cœperit, calculus intus
 effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamq;
 convulneret. In qua re quod periculum esset, iam
 supra

suprà proposui. Vbi satis teneri calculum patet, eodem penè momento triplex motus adhibendus est, in vtrunque latus, deinde extra, sic tamen, vt leniter id fiat, paulumq; primo calculus attrahatur: quo facto, attollendus vnus extremus est, vt intus magis maneat, faciliusq; illum producat. Quod si aliquando à superiore parte calculus parum commode comprehendatur, à latere erit apprehendendus. Hæc est simplicissima curatio. Sed varietas rerum quasdam etiamnum animaduersiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervicem, sine vllò periculo eximuntur. In vesica verò non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur, quoniam vbi illam conuulnerant, ex distensione nervorum mortem maturant: multoq; magis, si spina aliqua vesicæ inhæret, eamq; cum ducetur, duplicavit. Colligitur autem eo, quòd difficilius vrina redditur, in cervice calculum esse: eo quòd cruenta destillat, illum esse spinosum, maximeq; id sub digitis quoque experiendum est, neq; adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoq; leniter intus digiti obijciendi, ne uiolenter promouendo conuulnerent, tum incidendi. Multi hic quoq; scalpello vsi sunt. Meles (quoniam is infirmior est, potestq; in aliqua prominentia incidere, incisoq; super illam corpore, quæ cauum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum, in sum-

ma parte labrosum, in ima semicirculatum acutumq;. Id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo cum sequebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo cervix ea parte facta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet, nulla propter festinationem vi admota.

Signa calculorum, vel arenosorum,
vel mollium.

AT calculus arenosus, & ante manifestus est, quoniam & urina quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione, quoniã inter subiectos digitos neq; æque leniter renititur, & insuper dilatatur. Item mollis calculus, & ex pluribus minutisq;, sed inter se parum astrictis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas. Hos omnes leniter permutatis subinde digitorum vicibus sic oportet abducere, ne vesicam ledant, ne'ue intus aliqua dissipata reliquia maneat, quæ postmodum curationi difficultatem faciat. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis vel vnco eximendum est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi delectant, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter inuenitur, inuentusq; celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica leditur, excitatq; inflammationes

tiones mortiferas, adeo ut quidam secti, cum diu frustra; per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiā quod exiguus calculus, ad plagam vrina postea promouente, excidit. Si quando autem is maior, non videtur, nisi rupta ceruice extrahi posse, findendus est. Cuius repertor Ammonius, ob id Lithotomos cognominatus est. Id hoc modo fit. Vncus inijcitur calculo, sic ut facile eum concussum quoque teneat, ne is retro reuoluatur. Tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotū calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De Calculis fœminarum.

Hæc vero curationes in fœminis quoque similes sunt, de quibus tamen parum proprie quædam dicenda sunt. Siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus superuacuus est, quia is urinam in ceruicem non compellit, que & breuior, quàm in maribus, et laxior est. Ergo & per se sepe excidit, & si in primo quod est angustius inhaeret, eodem tamen vnco sine vlla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subijci digiti tanquam masculo: mulieri per naturalia eius debet. Tum virgini quidem sub ima sinisteriore ora. Mulieri verò inter vrinae iter & os pubis incidendū est, sic ut utroque loco pla-

ga

462
ga transversa sit: neq; terreri conuenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quæ curatio calculo euulso habenda sit.

Calculo euulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atq; ingredi quoq; eum paulum non alienū est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus ne vis omnis intereat, suppressi debet. Idq; protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem ut distentione neruorum periclitatur aliquis, dum vesica eius agitur: sic alter metus excipitur remotis medicaminibus, ne tantū sanguinis profluat ut occidat. Quod ne incidat, desiderare is debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. Sub quo & sanguis fere conquiescit, & astringitur vesica, ideoq; minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est & inguinibus & coxis, & super pubem. Vbi iam satis vel euocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est, sic ut caput humile sit, coxæ paulum excitentur: ac super vlcus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde interpositis duabus horis in solum is aquæ calidæ resupinus demittendus est, sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cetera vestimentis circumdata sint, manibus tantummodo pedibusq; nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat.

maneat. Ex quo sudor multus oriri solet, qui
 spongia subinde facile detergendus est, finisq;
 eius fomenti est, donec infirmando offendat. Tum
 multo is oleo perungendus, inducendusq; * hapsus
 lane mollis, tepido oleo repletus, qui pubem &
 coxas & inguina, & plagam ipsam contacta
 eodem ante se linteolo protegat, isq; subinde oleo
 tepido madefaciendus est, ut neq; frigus ad ve-
 sicam admittat, & nervos leniter molliat. Qui-
 dam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. Ea
 plus pondere nocent, quae vesicam urgendo vul-
 nus irritant, quam calore proficiunt. Ergo ne vin-
 culum quidem ullum necessarium est. Proximo
 die, si spiritus difficiliter redditur, si vrina non
 excedit, si locus circa pubem mature intumuit,
 scire licet in vesica sanguinem concretum reman-
 sisse. Igitur demissis eodem modo digitis leniter
 pertractanda vesica est, & discutienda si qua
 coierunt. Quo fit, ut per vulnus postea proce-
 dant. Non alienum etiam est, oriculario clystere
 acetum nitro mistum per plagam in vesicam com-
 pellere. Nam sic quoq; discutiuntur, si qua cruen-
 ta coierunt. Ea q; facere etiam primo die conue-
 nit. Si timemus, ne quid intus sit, maximeq; ubi
 ambulando id elicere imbecillitas prohibuit, cæ-
 tera eadem facienda sunt: ut demittatur in so-
 lium, ut eodem modo panniculus, eadem lana
 superinjiciatur. Sed neque sepe, neque tandiu in
 aqua calida puer habendus, quam adolescens
 est: infirmus, quam valens: leui, quam gra-
 viore

*Hapsus id
 latinis di-
 ci videtur,
 Græcis
 πᾶν, quod
 Suidas expo-
 nit πᾶν, Hesy-
 chius ὅν-
 θηρ signifi-
 cat autem
 vel saccu-
 lum, crume-
 nam, vel hu-
 iusmodi al-
 quid, aut
 testoriū,
 aut vela-
 men, aut
 cingulum,
 sacculi, aut
 crumenæ
 modo fa-
 ctum.

uiore inflammatione adfectus : is cuius corpus
digeritur, quam is cuius astrictum est. Inter hæc
verò si somnus est, & æqualis spiritus, & ma-
dens lingua, & sitis modica, & venter imus,
sed & mediocris est cum febre modica dolor, sci-
re licet recte procedere curationem. Atq; in his
inflammatio fere quinto vel septimo die finitur.
Qua leuata, solum superuacuum est. Supini tan-
tummodo vulnus aqua calida fouendum est, vt
si quid vrinae rodet, abluatur. Imponenda autem
medicamenta sunt pus mouentia, & si purgan-
dum vlcus videbitur melle linendum. Id si rodet,
rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum
videtur Enneapharmacum emplastrum. Nam
& seuum habet ad pus mouendum, & mel ad
vlcus repurgandum : medulla etiam maximeq;
vitulina, quod in id ne fistula relinquatur, præ-
cipue proficit. Linamenta verò tum super ul-
cus non sunt necessaria, super medicamentum ad
id continendum, recte imponuntur. At vbi ul-
cus purgatum est, puro linamento ad cicatricem
perducendum est. Quibus temporibus tamen, si
felix curatio non fuit, varia circa pericula oriun-
tur. Quæ præfagire protinus licet, si continua vi-
gilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida
est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vul-
nus hiat, si *trans-
fluens similiter ante tertium diem quædam liuida ex-
cidunt, si is aut nihil, aut tarde respondet, si ve-
hementes dolores sunt, si post diem quintum ma-
gne

gnæ febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem iocundius est. Nihil tamen prius est distentione nervorum, & ante nonum diem vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abſtinentia, modicis & tempeſtius cibis, inter hæc fomentis, de quibus ſuprà ſcripſimus, oportet.

De cancro qui exciſa veſica naſcitur, & qua curatione uti deceat. C A P. XXVII.

Proximus canceri metus eſt: is cognoscitur, ſi & per vulnus, & per ipſum colem fluit ſanies mali odoris, cumq; eo quædam à concreto ſanguine non abhorrentia, tenuesq; carunculae lanulus ſimiles: præter hæc ſi oræ vulneris aride ſunt, ſi dolent inguina, ſi febris non deſuit, eaq; in noctem augetur, ſi inordinati horrores accedunt. Conſiderandum autem eſt, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indureſcit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat, teſticuliq; intumeſcunt. Si in ipſam veſicam, ani dolor ſequitur, coxæ dureſcunt, non facile crura extendi poſſunt. At ſi in alterutrum latus, oculis id expoſitum eſt, paresq; vtrinque eaſdem notas, ſed minores habet. Primum autem ad rem pertinet, corpus recte iacere, ut ſuperior pars ſemper eadem ſit, in quam vitium fertur: ita ſi ad colem it, ſupinus is collocari debet: ſi ad veſicam, in ventrem: ſi in latus, in id quod integrius eſt. Deinde ubi vêtum fuerit ad curationem,

nem, homo in aquam demittetur, in qua marrubii decoctus sit, aut cupressus aut myrtus, idemque humor clystere intus adijciatur. Tum super ponetur lenticula cum malicorio mista, quæ utraq; ex vino decocta sint: vel rubus aut olea folia, eodem modo decocta, aliaque; medicamenta, quæ ad cohibendos purgandosque; cancos proposuimus, ex quibus, si quæ erunt arida, per scriptorium calaminum inspirabuntur. Vbi stare cœperit cancer, mulso vulnus eluetur. Vitabiturque; eo tempore ceratum, quod ad recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum vino iungetur, superque; idem linteo illitum imponetur. Sub quibus perueniri ad sanitatem potest, cum eo tamen quod non ignoremus, orto Cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica quoddam consortium est, exque; eo fieri, ut neque; retineatur cibus, neque; si quis retentus est, concoquatur, neque; corpus alatur: ideoque; ne vulnus quidem aut purgari, aut ali possit, quæ necessario mortem miant: sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curationis est. In qua quædam observatio ad cibum quoque; potionemque; pertinens necessaria est. Nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. Vbi vlcus purgatum est, ex media materia. olera & salsamenta semper aliena sunt. Potione opus est non modica. Nam si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & vis corporis minuitur. Si plus æquo assumitur, subinde vesica implet

impletur, eoq; irritatur. Non nisi aqua autem bibendam esse manifestius est, quam ut subinde dicendum sit. Solet verò sub eiusmodi victu venire, ut alius non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel fœnum græcū vel malua decocta sit. Idem humor rosa mistus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus est, ubi id rodit vrina, neque purgari patitur. Fere verò primo per vulnus exit hæc, deinde eo sanescēte diuiditur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur, quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoq; anno fit. Neq; desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ magnæq; caruncule, simulq; nervosa aliqua exciderunt. Sed ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricē vulnus * tendit ex- *intendit tentis iacere feminibus, & cruribus oportet, nisi tamen molles, arenosiue calculi fuerunt. Sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoq; diutius plagam patere necessarium est, & tum demum ubi iam nihil tale extrahitur, ad cicatricem perducitur: quod si antequam vesica purgata est, ora se glutinarunt, dolorq; & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel aduerso specillo diducendū est, ut torquentibus exitus detur, hisq; effusis tum diutius pura vrina descendat. Tum demum quæ cicatricē inducant, imponenda sunt,

G 2 extend

extendi q̄; vt supra docui, pedes quàm maxime
vineli. Quòd si fistula metus ex his causis, quas
proposui, subesse videbitur, quo facilius clauda-
tur ea, vel certè coangustetur, in anum quoque
danda plumbea fistula est: extentis q̄; cruribus,
femina tali q̄; inter se deligenda sunt, donec qua-
lis futura est, cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non ad-
mittunt, quomodo curari conueniat.

C A P. XXVIII.

ET hoc quidem commune esse maribus &
foeminis potest. Proprie verò quaedam ad
foeminas pertinent, vt in primis quòd earū natu-
ralia nonnunquā inter se glutinatis oris, cōcubi-
tum non admittunt. Id q̄; interdū euenit protinus
in vtero matris, interdum exulceratione in his
partibus facta, & per malam curationē his oris
sanescendo iunctis. Si ex vtero est, membrana ori
vulvae opposita est. Si ex vlcere, caro id reple-
uit. Oportet autem membranā duabus lineis in-
ter se transuersis incidere ad similitudinē literæ
X, magna cura habita, ne vrina iter violetur.
Deinde vndiq; eam membranā excidere: ac si
caro increuit, necessarium est recta linea patefa-
cere. Tum ab ora vel volsella vel hamo apprehen-
sam, tanquam habenulā excidere: & intus im-
plicitum in longitudinē linamentum, ἀμύσιον
Graci vocant, in aceto tinctū demittere, supra q̄;
succidam lanam aceto madētem deligare. Tertio
die soluere vlcus, & sicut alia vlcera curare.
Cum q̄;

LIBER VII. 409
Cumq; iam ad sanitatē tendet, plumbeā fistulam
medicamēto cicatricem inducente illinere, eamq;
intus dare. Supraq; idem medicamentum inijce-
re, donec ad cicatricem plaga perueniat.

Qua curatione partus emortuus ex utero ex-
cutiatur.

C A P. XXIX.

Vbi concipit autem aliqua, si iam propè ma-
turus partus intus emortuus est, neq; ex-
cidere per se potest, adhibēda curatio est, quæ nu-
merari inter difficilimas potest. Nam et summā
prudentiam moderationemq; desiderat, & ma-
ximum periculum affert. Sed ante omnia vuluæ
natura mirabilis, cum in multis alijs, tum in hac
re quoq; facile cognoscitur. Oportet autem ante
omnia resupinā mulierem trāsverso lecto sic col-
locare, vt feminibus eius ipsius ilia comprimantur.
Quo fit, vt & imus venter in cōspectu me-
dici sit, & infans ad os vuluæ compellatur, quæ
emortuo partu id comprimit, ex interuallo verò
paulum dehiscere. Hac occasione vsus medicus,
vnctæ manus indicem digitum primum debet
inserere, atque ibi continere, donec iterum ad os
aperiatur, rursusq; alterum digitum demitte-
re debet, & per easdem occasiones alios, do-
nec tota esse intus manus possit. Ad cuius rei
facultatem multum confert, & magnitudo vul-
uæ, & vis nervorum eius, & corporis totius ha-
bitus, & mentis etiam robur, cum præsertim in-
tus nonnunquā etiam duæ manus dari debeant.

G 3

Pert

Pertinet etiam ad rem quamcalidissimum esse
dum in- inum ventrem, & extrema corporis, neq; *cum
lamma- inflammatione incepisse, sed recenti re protinus
ionē cæ- adhiberi medicinam. Nam si corpus iam intus
nisse, muir, neq; demitti manus, neq; educi infans, nisi
agerrime potest, sequiturq; saepe cum vomitu
& cum tremore mortifera nervorum distentio.
Verū intus emortuo corpori manus iniecta, pro-
tinus habitum eius sentit. Nam aut in caput aut
in pedes conuersum est, aut in transuersum ia-
cet, fere tamen sic vt vel manus eius vel pes in
propinquo sit. Medici verò propositū est, vt eum
manus manu dirigat, vel in caput, vel etiam in pedes,
si fortē aliter compositus est: ac si nihil aliud est,
manus vel pes apprehensus, corpus rectius red-
dit: nam manus in caput, pes in pedes eum con-
uertet. Tum si caput proximum est, demitti de-
bet vncus vndiq; lauis, acuminis brevis, qui vel
oculo, vel auri, vel ori, interdū etiam fronti re-
cte inijcitur, deinde attractus infantem educit,
neq; tamen quolibet is tempore extrahi debet.
Nam si compresso vuluæ ore id tentatum est,
non emittente eo infans abrumpitur, & vnci
acumen in ipsum os vuluæ delabitur, sequiturq;
nervorum distentio, & ingens periculum mor-
tis. Igitur compressa vulua, conquiescere: hiantē,
leniter trahere oportet, & per has occasiones
paulatim eum educere. Trahere autem dextra
manus vncum, sinistra intus posita infantem
ipsum, simulq; dirigere eum debet. Solet etiam
euenire,

euenire, vt is infans humore distendatur, exq;
eo profluat fœdi odoris sanies. Si quid tale est,
indice digito corpus illud forandum est, vt effu-
so humore extenuetur. Tum id leniter per ipsas
manus recipiendum est, nam vncus iniectus
facile hebeti corpusculo eleuabitur. In quo quid
periculi sit, supra positum. Sed in pedes quoq; con-
uersus infans non difficulter extrahitur, quibus
apprehensis per ipsas manus commode educi-
tur. Si verò transversus est, neq; dirigi potuit,
vncus alæ iniiciendus, paulatimq; attrahendus
est. Sub quo fere cervix replicatur, retroq; caput
ac reliquum corpus spectat. Remedio est, cervix
præcisa, vt separatim utraq; pars auferatur. Id
vncus fit, qui priori similis in interiorem tantum
partem per totâ aciem exacuitur. Tum id agen-
dum est, vt antè caput, deinde reliqua pars au-
feratur, quia fere maiore parte extracta, caput
in vacuam vuluam prolabitur: extrahiq; sine
summo periculo non potest, si tamen id incidit,
super ventrem mulieris duplici panniculo inie-
cto, valens homo non imperitus à sinistro latere
eius debet assistere, & super imum ventrem e-
ius duas manus imponere, alteraq; alteram pre-
mere. Quo fit, vt illud caput ad os vuluæ com-
pellatur. Idq; eadem ratione quæ supra posita est,
vncus extrahitur. At si pes alter iuxta repertus
est, alter retro cum corpore est, quicquid pro-
tractum est, paulatim abscindendum est: & si
clunes os vuluæ urgere cœperunt, iterum retro

repellenda sunt, conquisitusq; pes eius adducen-
 dus. Aliaq; etiamnum difficultates faciunt, ut
 qui solidus non exit, cōcisus eximi debeat. Quo-
 ties autem infans protractus est, tradendus mi-
 nistro est. Is eum supinis manibus sustinere, me-
 dicus deinde sinistra manu leniter trahere um-
 bilicum debet, ita ne abrumpat, dextraq; eum
 Secunda. sequi vsq; ad eas, quas secundas vocant, quod
 velamentum infantis intus fuit, hisq; ultimis ap-
 prehensis venulas membranulasq; omnes eadem
 ratione manu diducere à vulua, totumq; illud
 extrahere, & si quid intus præterea concreti
 sanguinis remanet. Tum compressis in vnum fe-
 minibus, illa in cōclavi collocanda est, modicum
 calorem sine ullo perflatu habente. Super imum
 ventrem eius imponenda lana succida in aceto
 & rosa tineta. Reliqua curatio talis esse debet,
 qualis in inflammationibus, & in his vulneri-
 bus, quæ in nervosis locis sunt, adhibeatur.

De Ani vitijs, & eorum curatione.

C A P. XXX.

ANi quoque vitia ubi medicamentis non
 vincuntur, manus auxilium desiderant.
 Ergo, si qua scissa in eo vetustate induruerunt,
 iamq; callum habent, commodissimum est duce-
 re aluum, tum spongiam calidam admovere, ut
 relaxentur illa, & foras prodeant. Vbi in con-
 spectu sunt, scalpello singula excidere, & vlce-
 remone- ra*renouare, deinde imponere linamentum mol-
 le, et super linteolum illitum melle, locumq; eum
 molli

molli lana implere, & ita vincire altero die. deincepsq; ceteris lenibus medicamentis uti, quæ ad recentia eadē vitia necessaria esse aliās proposui, & utiq; per primos dies sorbitionibus eū sustinere, paulatim deinde cibis adijcere aliquid, generis tamen eius: quod eodem loco præceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est, ne anus ipse suppuret. Neq; tamen antè properandum est: nam si crudum incisum est, inflammationis multum accedit, et puris aliquanto amplius concitatur. His quoq; vulneribus, lenibus cibis, iisdemq; medicamentis opus est.

De condylomatū curatione.

AT tubercula, quæ condylomata appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur: Aluus ante omnia ducitur, tum vossella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. Tantummodo si quid increscit, squama aris coercendum est. Ora etiam venarum fundentia sanguinem sic tolluntur: Vbi sanguini qui effluit, sanies adijcitur, aluus acrius ducitur, quo magis ora promoveantur. Eoq; fit, ut *omnia vela, *omnes quasi capitula conspicua sint. Tum si capitulum venæ exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum supra est quàm ubi cum ana committitur. Imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. Deinde aut ungue, aut scal-

G s pello

pello supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur, interdum etiam urinae difficultas. Si id maius est, & basis latior, hamulo vno aut altero excipendum est, paulumq; supra basim incidendum, neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano demendum est. Quod consequitur is, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. Qua incisum est, acus debet immitti, infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo tria ve sunt, imum quodq; primum curandum est. Si plura, non omnia simul, ne tempore eodem vndiq; tenerae cicatrices sint: si sanguis profluit, excipendus est spongia, deinde linamentum imponendum. Ungenda femina & inguina, et quicquid iuxta vlcus est, ceratumq; superdandum est. Farina hordeacea calida implendus is locus est: sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemq; cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, ceruices ac femina liquido cerato perungenda sunt, tepidoq; is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda. Si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. Tum lenibus medicamentis, ysdemq; quae alibi posui, vlcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, iam alias superius exposui.

A De varicum curatione. C A P. XXXI.
 B his ad crura proximus transitus est, in quibus

quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum quæ in capite nocent, & eorum varicum qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quavis transversa, tamen simplex, si modica est, melius aduritur. Si curua est, & velut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se involuntur, utilius eximere est. Adurendi ratio hæc est: Cutis superinciditur, tum patefacta vena tenui & retuso ferramento candente modice premitur, vitaturq; ne plagæ ipsius oræ adurantur, quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit, & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo: Cute eadē ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur, scalpelloq; vndiq; à corpore vena deducitur, caueturq; ne inter hæc ipsa ledatur, eiq; retusus hamulus subijcitur, impositoq; eodem fere spatio quod supra positum est, in eadem vena idem fit, quæ quò tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Vbi iam idem, quacunq; varices sunt, factum est, vno loco adducta per hamulum vena præciditur, deinde quæ proximus hamus est, attrahitur & euellitur, ibi rursus abscinditur. Ac sic vndiq; varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans inijcitur.

Curatio

AT si digiti vel in vtero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohaeserunt, scalpello diducuntur, dein separatim vterq; non pingui emplastro circumdatur. Atq; ita per se vterq; sanescit. Si verò fit ulcus in digito, posteaq; male induc[t]a cicatrix curuum eum reddit, primum malagma tentandum est. Dein, si id nihil prodest (quod & in veteri cicatrice, & vbi nerui l[es]i sunt, euenire c[on]suevit) videre oportet, nerui ne id vitium, an cutis sit. Si nerui est, attingi non debet, neq; enim sanabile est: si cutis, tota cicatrix excidenda est, quae ferè callosa efficit vt extendi digitum non patiatur, tum rectus sic ad nouam cicatricem perduendus est.

De Gangraenae curatione. CAP. XXXIII.

Gangrena inter vngues alasq; aut inguina nasci, & si quando medicamenta vincuntur, membri præcidi oportere, alio loco mihi dictum est. Sed id quoq; cum periculo summo fit. Nam saepe in ipso opere, vel profusione sanguinis, vel animae defectione moriuntur. Verum hic quoq; nihil interest an satis tutum praesidium sit, quod vnicum est. Igitur inter sanam vitiatamq; partem incidenda scalpello caro vsq; ad os est: sic vt neq; contra ipsum articulū id fiat: & potius ex sana parte aliquid excidatur, quàm ex agra relinquatur. Vbi ad os ventum est, reducenda ab eo sa

eo sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid os nudetur: dein id serrula praevidendum est, quam proxime sanæ carni etiam inhaerenti: actum frons ossis quam serrula exasperavit, levanda est, supraque inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatiõe laxa esse debet, ut quam maxime undique os contegat. Quò cutis inducenda non fuerit, id linamentis erit contegendum, & super id spongia ex aceto deliganda. Cætera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus moveri debet, præceptum est.

LIBER VIII.

De positu & figura totius humani corporis.
CAP. I.

SUPEREST ea pars quæ ad ossa pertinet, quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figurasque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque levis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillū gignente contegitur. Eaque simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in verticē à fronte est. Ossaque eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interque ea venæ discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est: rarò autem calvaria solida sine suturis est. Locis tamen æstuosius facilius inveniuntur. Et id caput firmissimum, atque à dolore tutissi-

tutissimum est: ex ceteris, quo suturae pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. Neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Ferè tamen duae super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. Tertia ad aures per verticem tendens occipitium à summo capite diducit. Quarta ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit, eaque modo sub imo capillo desinit, modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his ceterae quidem suturae in unguem committuntur. Haec verò quae super aures transuersae sunt, totis oris paulatim extenuantur, atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Crassissimum verò in capite os post aurem est, quia capillus, ut verisimile est, ob id ipsum non gignitur. Sub his quoque musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatam positum est. At facies suturam habet maximam, quae à tempore incipiens, per medios oculos naresque transuersa peruenit ad alterum tempus. A qua breues duae sub interioribus angulis deorsum spectant. Et male quoque in summa parte singulis transuersas suturas habent. A medijsque naribus aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit, aliaque transuersa idem palatum secat. Et suturae quidem in plurimis haec sunt. Foramina autem intra caput maxima oculorum sunt, deinde narium, tum quae in auribus habemus. Ex his quae oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. Narium duo

duo foramina osse medio discernuntur. Siquidem
 hac primum à supercilijs angulisq; oculorum osse
 inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in
 cartilagine versa quo propius ori descendunt, eo
 magis caruncula quoq; molliuntur. Sed ea fora-
 mina, quæ à summis ad imas nares simplicia
 sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. Aliaq;
 ex his ad fauces peruia spiritum & reddunt et
 accipiunt, alia ad cerebrum tendunt. In vltima
 parte in multa & tenuia foramina dissipantur,
 per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoq;
 primo rectum & simplex iter procedendo fle-
 xuosum fit, quod ipsum iuxta cerebrum in mul-
 ta & tenuia foramina diducitur, per quæ facul-
 tas audiendi est: iuxta ea duo paruuli quasi si-
 nus sunt, superq; eos finitur os, quod transuer-
 sum à genis tendens ab inferiorioribus ossibus
 sustinetur, iugale appellari potest, ab eadem si- Iugale,
 militudine, à qua id Græci *ζυγωδες* appellant.
 Maxilla verò est molle os, eaq; vna est, cuius
 eadem & media & etiam ima pars mentum
 est, à quo vtrinq; procedit ad tempora, solaq; ea
 mouetur. Nam mala cum toto osse, quod supe-
 riores dentes*exigit, immobiles sunt. Verum ipsi- *excipit
 us maxille partes extremae quasi bicornes sunt.
 Alter processus intra latior, vertice ipso tenua-
 tur, longiusq; procedens sub osse iugali subit &
 super id temporum musculis illigatur. Alter bre-
 uior & rotundior, & in eo sinu qui iuxta fora-
 mina auris est cardinis modo fit: ibiq; huc &
 illuc

illuc se inclinās maxillæ facultatem motus præ-
 stat. Duriores osse dētes sunt, quorum pars ma-
 xillæ, pars superiori ossi malarum hæret. Ex his
 *τεμνι- quaterni primi quia secant, *τομνοὶ à Græcis
 νοὶ nominantur, hi deinde quatuor caninis dentibus
 Canini. ex omni parte cinguntur. Vltima quos utrinq; fe-
 Maxilla- re maxillares quaterni sunt, præterquam in his
 res. in quibus tres vltimi qui sero gigni solent, non
 increuerunt. Ex his priores singulis radicibus,
 maxillares utiq; binis, quidā etiam ternis qua-
 ternis ve nituntur. Fereq; longior radix breuior-
 em dentem edit, rectiq; dentis recta etiam ra-
 dix, curui flexa est: ex eadem radice in pueris
 novus dens subit, qui multo sæpius priorem ex-
 pellit, interdum tamen supra infra ve eum se o-
 stendit. Caput autem spina excipit. Ea constat
 ex vertebriis quatuor & viginti. Septem in cer-
 uice sunt, duodecim ad costas, reliquæ quinque
 sunt proximæ costis. Hæ teretes brevesq; ab v-
 troq; latere, processus duos exigunt: mediæ per-
 foratæ, quæ spinæ medulla cerebro commissæ de-
 scendit, circa quoq; per duos processus tenuibus
 cauis perviæ, per quæ à membrana cerebri simi-
 les membranule deducuntur. Omnesq; vertebrae
 exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis
 processibus parvis desidentes sinus habent, ab in-
 feriore alios deorsum versus processus exigunt.
 Summa igitur protinus caput sustinet, per du-
 os sinus receptis exiguis eius processibus. Qua
 fit, ut caput sursum deorsum versus tuberibus
 exasper

exasperetur, secunda superiori parti inferiore. Quod ad circuitum pertinet, pars summa angustiore orbe finitur. Itaque superior summa circumdata, in latera quoque caput moueri sinit. Tertia eodem modo secundam excipit. Ex quo facilis cervici mobilitas est. Ac ne sustinere quidem caput posset, nisi utrinque recti valentesque nervi collum continerent, quos **ναρῶτας* Græci appellant. Siquidem horum inter omnes flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. Iamque vertebra tertia tubercula quæ inferiori inserantur, excipit. Cæteræ processibus deorsum spectantibus, in inferiores insinuantur, ac per sinus quos utrinque habent, superiores accipiunt, multisque nervis & multa cartilagine continentur. Ac sic vno flexu modico in promptum dato cæteris negotiis homo & rectus insistit, & alioqui ad necessaria opera curvatur. Infra cervicem verò summa costæ contra humeros sita est, inde undecim inferiores usque ad imum pectus perveniunt, hæque primis partibus rotundæ & leniter quasi capitulatæ, vertebrarum transversis processibus ibi quoque paulum insinuatæ inhaerent. Inde patefcunt, & in exteriorem partem recurvatæ, paulatim in cartilaginem degenerant. Eaque parte rursus in interiora leniter flexæ committuntur cum osse pectoris. Quod valens ac durum à faucibus incipit, ab utroque latere lunatum, & à præcordiis iam ipsum quoque cartilagine mollitum terminatur: sub costis

*Sic quidē
hos nervos
Ludonicus
Cælius di-
cendoseffe
contendit,
tamē Her-
mo. Barb.
Tenuōtas ap-
pellandos
putavit.

H verò

**poas* verò prioribus quinque, quas* *Nóthas* Græci nominant, breues tenuioresq; , atq; ipsæ quoq; paulatim in cartilaginem versæ , extremis abdominalibus partibus inhaerescunt , imaq; ex his maiorem iam parte nihil nisi cartilago est. Rursus à ceruice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt, nostri *scoptula* *operta* *ωμοπλάτας* Græci nominant. Ea in summis verticibus sinuata , ab his triangula, paulatimq; lateſcentia ad spinam tendunt, & quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atq; ipsa quoque in imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhaerescunt. Ibi verò validis musculis nervisq; constricta sunt. At à summa costâ paulo interius quàm ubi ea media est, os excreſcit, ibi quidem tenue, procedens verò quo propius lato scapulari ossi fit, eo plenius latiusq; & paulatim in exteriora curuatur : quod propius altera verticis parte modice intumescens, sustinet iugulum. Id autem ipsum recuruum ac neque inter durissima ossa numerandum , altero capite in eo quod posui, altero in exiguo sinus pectoralis ossis insidit : paulumq; motu brachij mouetur, & cum lato osse scapularum infra caput eius, nervis & cartilagini connectitur. Hinc humerus incipit , extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, cartilaginofus : medius teres, durus, medullosus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, interiorem, & anteriorem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore

403

pectore est, posterior quæ ab scapulis, interior
 quæ ad latus tendit, exterior quæ ab eo recedit,
 quod ad omnes articulos pertinere in vltiori-
 bus patebit. Superius autem humeri caput ro-
 tundius, quàm cætera ossa, de quibus adhuc dixi,
 * verticulatis scapularum ossibus paruo excessu * vertic
 inseritur, ac maiore parte ex transitu nervis de- latis
 ligatur. At inferius duos processus habet, inter
 quos quod mediū est, magis etiā extremis par-
 tibus sinuatur. Quæ res sedem brachio præstat,
 quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem Radius.
 ῥαδια Græci appellant, superior breuiorq; &
 primo tenuior, rotundo & leniter cauo capite
 exiguum humeri tuberculum recipit, atque ibi
 nervis & cartilagine continetur. Cubitus infe-
 rior longiorq; & primo plenior in summo capi-
 te, duobus quasi verticibus extantibus in sinu
 humeri, quem inter duos processus eius esse pro-
 posui, se inserit. Primo verò duobus radijs bra-
 chij ossa iuncta paulatim dirimuntur, rursusq;
 ad manum cœunt, modo crassitudinis mutato.
 Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum
 tenuis est. Dein radius in caput cartilaginosum
 consurgens, in verticem eius sinuatur. Cubitus Cubitus.
 rotundus in extremo, parte altera paulum pro-
 cedit. Ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari
 non oportet, plurima ossa in cartilaginem * desi- * desine
 dere, nullum articulum non sic finiri. neque enim
 aut moveri posset, nisi leui inniteretur, aut cum
 carne nervisq; coniungi, nisi ea media quædam

H 2 mater

materia committeret. In manu verò prima palme pars ex multis minutisq; ossibus constat, quorū numerus incertus est. Sed oblonga omnia & triangula structura quadam inter se connectuntur, cum inuicem superior alterius angulus, alterius planities sit, eoq; sit ex his vnus ossis paulum in interiora concavi species. Verum ex manu duo exigui processus in sinus radij coniunguntur. Tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à quibus ipsi digiti oriuntur, qui ex ossibus ternis constant, omniumq; eadem ratio est. Interius os in verticem sinuatur, recipitq; exterioris exiguum tuberculum, neruiq; ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. Ideoq; non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. Ima verò spina in coxarū ossē desidit, quod transversum longeq; valentissimum, vuluam, vesicam, rectum intestinum tuetur, idq; ab exteriori parte gibbum, ad spinam resupinatum, à lateribus, id est, in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os, quod pectinem vocant, idq; super intestina sub pube transversum uentrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in femina. minis, ne partum prohibeat. Inde femina oriuntur, quorum capita rotundiora etiam quàm humerorum sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. Infrà verò duos processus à priore & à posteriore parte habent. Dein dura, & medullosa

Pecten.

Femina.

Et ab exteriori parte gibba: rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in sinus coxae, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniunguntur, tum infra introrsus leniter tendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint. Quae commissura, osse paruo, molli, cartilaginoso tegitur, patellam vocant. Hæc su- Patella.
per innatans, nec ulli ossi inherens, sed carne et nervis deligata, pauloq; magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur. Ipsum autem crus est ex ossibus duobus. Etenim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est: adeo ut habitus quoq; et decor alterius ex altero cognoscatur, quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoq; Sura rectè nominatur. Id breuius, supraq; tenuius ad ipsos talos intumescit. Alterum à priore parte positum, cui Tibiæ nomen est, longius et in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur, sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa infra supraq; coniuncta media, ut in brachio dehiscunt. Excipitur autem crus infra ossa ex transverso talorum, idq; ipsum super os calcis situm est, quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, et procedentia ex talo recipit, et in sinum eius inseritur. Idq; sine medulla durum, magisq; in
H 3 poster

posteriores partem proiectum, teretem ibi figuram repræsentat. Cetera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Plantæ palmis, digiti digitis, ungues unguibus, respondent.

Ossa vitata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur. CAP. II.

O Ne autem os, ubi iniuria accessit, aut vitatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. Id quod vitatum est, primo fere pingue fit, deinde vel nigrum uel cariosum. Quæ super natis grauibz ulceribus aut fistulis, hisq; vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius vitium est, quam vlcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os vndiq; pateat: tum id quod pingue est, semel iterumue satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo statu secedat: aut eradere donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ integrioris nota est. Nam necesse est aridum sit, id quod vitatum est. Idem in cartilagine quoq; lesa faciendum est. Siquidem ea quoq; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquitur. Deinde si vel os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt ubi caries, nigritiesue in summo osse est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum vel radendum est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut

Et agat aliquid, et maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum uentum est. Albo finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descenderit, utrumlibet dubium est. In carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramen demittitur, quod magis minusue intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore et ex febre. Quae ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra fit. Nam finis vitij est, ubi scobis nigra esse desunt. Igitur si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quae altitudine vitium aequent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post haec et resoluetur ab inferiore osse, quodcumque vitiatum est, et is sinus carne replebitur: et humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. Sed quod totum vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, eatenus quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariiosa est, inutilis vitio est, et excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui osse nudato,

diem tertium expectant, vt tunc excidant. Ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaq; quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni vitio liberandum est. Longeq; perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia uix etiam si recte cessit, curatio veram sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur: & de Modiolo, & Terebra, ferramentis ad id paratis. CAP. III.

EXciditur verò os duobus modis. Si paruum est, quod laesum est, modiolo, quem *χοι-
νίου* Græci vocant: Si spatiosum, terebris. Vtriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum teres est, imis oris ferratū, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrariū autem duo genera sunt: Alterum simile ei, quo fabri vtuntur. Alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit, atq; iterū ab alio principio paulo minus quàm equaliter sursum procedit. Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. Et si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, vt eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. Deinde is habena quasi terebra cōuertitur. Est q; quidam premendi modus, vt & foretur, & circumagatur, quia si leuiter imprimitur, parum proficit: Si graui-
ter, non mouetur. Neque alienum est instillare paulum

paulum rose, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. Quod ipsum tamen si^{*} obtusius est, ^{*copiosius} acie a ferramenti hebetat: at ubi iam iter modulo pressum est, medius clauus educitur, & ille per se agitur. Deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur: at si latius vitium est, quàm vt illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso fine vitiosi ossis atq; integri, deinde alterum non ita longè, tertiumq; donec totus is locus qui excidendus est, his cauis cinctus sit, atque ibi quoq; quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tunc excisorius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adactus, id quod inter vtrunq; medium est, excidit: ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modulo imprimitur. Vtro modo verò id circumductum est, idem excisorius scalper in osse corrupto planus summam quanq; testam læsit, donec integrum os relinquatur. Vix vnquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit, maximeq; ubi vitiosa caluaria est. Id quoq; signi specillo significatur, qui depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet, & ob id renitens aliquid inuenit, & madens exit. Si peruium inuenit, altius descendens inter os & membranam nihil oppositum inuenit, educiturq; siccus, non quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniam ibi vt in latiore sede diffusa sit. Siue autè nigrities, quam terebra detexit, siue caries, quam specillum ostendit, os

H 6 transit,

transit, modiolus quidē vsus fere superuacuuus est, quia latius pateat necesse est, quod iam alte processit. Terebra verò ea, quam secundo loco posui, vtendū, eaq; ne nimis incalescat, subinde in aquā frigidā demittēda est. Sed tum maiore cura agendū est, cum iam aut simplex os dimidiū perforatū est, aut in duplici, superius. Illud, spatium ipsum: hoc, sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena suspendendaq; magis sinistra manus est, & sepius attollēda, & foraminis altitudo consideranda: vt quandocunq; os perrumpitur, sentiamus: neq; periclitemur, ne mucrone cerebri membrana ledatur. Ex quo graues inflammationes cum periculo mortis oriuntur. Factis foraminibus eodem modo media saepe, sed multo circumspectius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandē membranā violet, donec fiat aditus, per quem membrane custos immittatur *μυρρινοφύλακτα* Græci vocant. Lamina aenea est, firma, paulum resima ab exteriori parte leuis, quæ demissa est, vt exterior pars eius cerebro propior sit, subinde ei subicitur, quod scalpro discutiendū est: ac si excipit eius angulū, vltra transire non patitur, eoq; & audacius et tutius scalpri mallole subinde medicus ferit, donec excisum vndiq; os eadē lamina leuetur, tolliq; sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totū os eiectum est, circumradendæ leuandæq; sunt ora, & si quis scobis membrane insedit, colligendum. Vbi superiori parte sublata, inferior relicta est, non ora tantum, sed

os

os quoq; totum lauandum est, vt sine noxa postea cutis increseat, quæ aspero osse innascēs protinus non sanitatē, sed nouos dolores mouet. Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa peruenero. Si basis aliqua seruata est, sup̄ imponēda sunt medicamenta non pinguia, quæ recentibus vulneribus accommodantur, supraq; imponēda lana succida oleo atq; aceto madens. Vbi tempus processit, ab ipso ore caro increscit, eaq; factū manu sinum complet. Si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ quod abscessit, expellat, eaq; fere quia testa tenuis & angusta est, squama est, id λεπίς à Græcis nominatur. Potest etiam euenire, vt ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur, sed summū tamē collidatur, exaspereturq;. Quod vbi incidit, radi & lauari satis est. Hæc quamuis maxime fiunt in capite, tamē cæteris quoq; ossibus communia sunt, vt ubicunque idem incidet, eodem remedio sit vtendum. Atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione.

CAP. IIII.

Igitur vbi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilem is homo vomuerit, num oculi eius obcæcati sint, num obmutuerit, num per nares aures uel sanguis ei effluerit, num cōciderit,

num

num sine sensu quasi dormiens iacuerit. Hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. Atque ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationem esse. Si verò etiam torpor accessit, si mens non constat, si nervorum vel resolutio vel distentio secuta est, verisimile est etiam cerebri membranam esse violatam, eoq; in angusto magis spes est. At si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari, an os fractum sit. Et protinus considerandum est, lapide an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit, & hoc ipso leni an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leniter. Quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quam certiore id nota explorare. Ergo quæ plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum, ne cum in quosdam sinus naturales inciderit opinionem, fracti ossis frustra faciat, neq; nimis plenum, ne paruulæ rimulæ fallant. Vbi specillum ad os venit, nihil nisi lene & lubricum occurrit, integrum id videri potest. Si quid asperi est, utiq; quæ suturæ non sint, fractum os esse testatur. A suturis se deceptum esse, Hippocrates memoriæ prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciâ magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaq; nihilominus habituro, conuenit etiâ simplex veri erroris confessio, precipueq; in eo ministerio quod utilitatis causâ posteris traditur,

tur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis antè deceptus est. Sed hac quidem alioquin memoria magni professoris, uti interponeremus, effecit. Potest autem sutura eo nomine fallere, quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esse, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet, sed os aperire tutissimum est. Nam neque utiq; certa sedes, ut supra posui, suturarum est, & potest idem, & naturaliter commissum, & ictu fissum esse, iuxta'ue aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit vehementior, quamvis specillo nihil inuenitur, tamen aperire commodius est. At si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id detrahendum. Nigritiem enim continet, si quid fissum est. Solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. Itaq; si grauiter aliquis percussus est, si mala indicia subsecuta sunt, neq; ea parte qua cutis discussa est, rima reperitur, non incommodum est parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, & tumeat, eumq; aperire. Siquidem ibi fissum os reperietur, nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra defecta est. Os fractum nisi succursum est, grauib; inflammationibus afficit, difficiliusq; postea tractatur. Raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus verò ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta
aliquid

aliquid sanguinis mittat, isq; ibi concretus magnos dolores moueat, oculos quibus obcæcet. Sed fere contra id dolor est, & eo loco cute incisa pallidum os reperitur. Ideoq; id quoque os excidendum est. Quacumq; autem de causa curatio hæc necessaria est: si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum est in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. Siquidem hæc scalpro terebris'ue lacerata, vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transuersis lineis literæ x figurâ accepit, ut deinde à singulis procedentibus* singulis cutis subsequatur. Inter quæ si sanguis fertur, sponsia subinde in aceto tincta cohibendus est, occupandusq; obiectis linamentis, & caput altius excitandum. Neque id vitium vllum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, adfert, sed ibi quoq; nihil tutius fit. In omni verò fisso fracto'ue osse protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id excideret. Sed multo melius est, antè emplastra experiri, quæ caluariæ causâ componuntur. Eorumq; aliquid oportet ex aceto molitum, per se super fissum fractum'ue os imponere, deinde super id aliquanto latius quàm vulnus est,

* alij, lingulis: alij, ligulis legunt.

est, eodem medicamento illitum linteolum, & praterea succidam lanam aceto tinctam. Tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere, similiterq; curare vsq; ad diem quintū. A sexto die, etiam vapore aquæ calidæ per spongiam fovere, cetera ex eadem facere. Quod si carūcula incre- scere cœperit, et febricula aut soluta erit, aut le- uior, & cupiditas cibi reuerterit, satisq; somni accedet, in eodem medicamento erit perseveran- dum. Procedente deinde tempore, emolliendum id emplastrum adiecto cerato ex rosa factō, quo facilius carnem producat. nam per se reprimen- di vim habet. Hac ratione sepe rimæ callo quo- dam implentur, estq; ea ossis velut cicatrix, & latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebāt, eodem callo glutinantur, estq; aliquanto melius velamentum cerebro, quàm caro quæ exciso osse incre- scit. Si verò sub prima curatione febris in- tenditur, breuesq; somni & ijdem per somnia tumultuosi sunt, vlcus madet, neque alitur, & in ceruicibus glandulæ oriuntur, magni dolores sunt, cibiq; super hac fastidium incre- scit, tum demum ad manum scalprumq; veniendum est. Duo verò sub ictu caluariæ pericula sunt, ne vel findatur, vel medium desidat: si fissum est, possunt oræ esse compressæ, vel quia altera super alteram excessit, vel etiam quia vehementer rursus se commiserunt. Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem descēdat, exitum verò non habeat, ac sic eam irriter, et graues inflāma-
tiones

tiones moueat. Vbi medium desedit, eandē cerebri membranā os vrget, interdum etiam ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, vt tamen quam minimum ex osse dematur. Ergo si ora alteri insedit, satis est id quod eminet, plano scalpro excidere, quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. At si ora inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spatio terebra foramen faciendum est, ab eoq; scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem C literæ, sic vt vertex eius à foramine basis ad rimas sit. Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debebit, & ita nihil latens in eo osse concavum est, abundeq; exitus datur intus ludentibus. Ne si fractum quidē os desedit, totum excidi necesse est. Sed siue totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ caluariæ inheret exigua parte, ab eo quod naturaliter se habet, scalpro diuidendum est: deinde in eo quod desedit iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. Si in angusto noxa est, duo: si latius patet, tria: septaq; eorum excidenda: & tum scalper vtrinque ad rimam agendus, sic vt luna tum sinum faciat, imaq; pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Deinde, si qua labent, & ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam instant. Si id ex facili fieri non potest subiicienda lamina

lamina est, quam custodem eius membrana esse
proposui, et super eam quicquid spinosum est, &
intus eminet, excidendum est: eadē lamina quic-
quid deorsum insedit attollendum. Hoc genus cu-
rationis efficit, ut qua parte fracta ossa tamē in-
herent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine
ullo tormento sub medicamento tēpore excidant,
spatiumq; inter hæc satis illi magnū ad extrahen-
dam sanie relinquantur, plusq; in osse propugna-
culi cerebrum habeat, quā habiturum fuit eo
exciso. His factis, ea membrana acri aceto resper-
genda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea pro-
fluit, colhibeatur: siue intus concretus cruor rema-
net, discutiatur. Tum idem medicamentū eodem
modo, qui suprapositus est, mollitum, ipsi mem-
brana imponendū est. Ceteraq; eodem modo fa-
cienda sunt, quæ ad linteolum illitum & lanam
succidam pertinent, collocandusq; is loco in tepi-
do, & curandum quotidie vulnus, bis etiā aста-
te. Quod si membrana per inflammationem in-
tumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si vsq; eo
tumebit, ut super ossa quoq; emineat, coërcebit
eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita,
& cum recenti vel butyro vel adipe anserino
mista, cervixq; molliri debebit, liquido cerato
ex irino facto. At si parū pura membrana vi-
debitur, par modus eius emplastri & mellis mi-
scendus erit, idq; super infundendū, eiusq; conti-
nendi causa unū aut alterū linamentū inijci-
dum, & super linteolo cui emplastrū illitum sit,
conteg

contegendum. Vbi plus pura membrana est, eadem ratione adiiciendū emplastro ceratū, vt carnem producat. Quod ad abstinentiā verò & primos vltioresq; cibos potionesq; pertinet, eadē quae in vulneribus praecepi, seruāda sunt: eò magis, quò periculosius haec pars afficitur. Quinetiā cum iam non solum sustineri, sed ali his quoque apparebūt, tamen erunt vitanda quaecunq; mandanda sunt, item fūmus, & quicquid excitat sternutamentū. Spem verò certam faciunt membrana* mobilis ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillae atq; ceruicis. Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorū vel resolutio, vel distentio, caro livida, maxillarū rigor, atq; ceruicis. Ceteraq; quae ad somnū, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem quae in ceteris vulneribus, vel salutaria vel mortifera sunt: vbi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana: vel si os eo loco duplex est, inde quoque caro increscere, eaq; id quod inter ossa vacuum est, replet, nonnunquam etiam super calvariā excrescit. Quod si incidit, inspergenda squama aeris est, vt id reprimat, cohibeatq; ea carni superdādo, quae ad cicatricem perducant. Omnibusq; ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quae paulum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, vt per omnem aetatem sit exulceratio, quae linteolo medicamentum habente contegenda sit.

fit. Illa utiq; capite fracto seruanda sunt, vt donec iam valida cicatrix erit, soluenda vitentur, frequens balneum, maior vini modus.

De narium fractarum curatione. C A P. V.

IN nariibus verò & os & cartilago frangi solet, & quidem modo aduersa, modo à latere si aduersa facta sunt, alterum'ue ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur: si à latere os fractum est, is locus cauus est: si cartilago, in alteram partem nares declinatur. Quicquid in cartilaginem incidit, excitandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis. Deinde in longitudinem implicata linamenta & molli pellicula cincta circumfutaq; , intus adijcienda sunt. Aut eodem modo compositū aliquid ex arido penicillo. Aut grandis pinna, gummi vel fabrili glutine illita, & molli pellicula circundata, quæ desidere cartilaginem non sinat. Sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraq; naris implenda est. Si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua nasus iacet, ab altera tenuius, id quod inseritur. Extrinsecus autem circundanda habena est mollis, media illita mistis inter se similia & thuris fuligine, eaq; ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutināda est. Id enim corpori quasi gluten inhaerescit, & cum induruit, nares cōmode continet. Sin quod intus inditum est ledit, sicut maxime fit, vbi interior cartilago perfracta est, excicat & nares eadē tantūmodo habena

continenda sunt. Deinde, post quatuordecim dies idipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida, eaq; tum is locus quotidie fouendus est. Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atq; vbi aduersum id ictum est, vtraque naris implenda est: vbi à latere, ea inquam os impulsum est, imponendumq; ceratum, & paulo vehementius deligandum est, quia callus eo loco non ad sanitatē tantummodo, sed etiam ad tumorē increscit. A tertio die fouendum id aqua calida est, tantoq; magis, quanto propius esse sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda, imponendaq; extrinsecus eadem habena, & super eam ceratum, neque vltra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum vndique resolutum cum ceteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere fertur, volsella verò extrahetur. Finitisq; inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt. Peius est, vbi aut ossi, aut cartilagini fracta, cutis quoque vulnus accessit. Id admodum raro fit: si incidit illa quidem, nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. Cuti verò superimponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata sunt, sed insuper nullo vinculo deligandum est.

De aurium fractarum curatione. C A P. VI.

In

IN aure quoq; interdum rumpitur cartilago: quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentū est. Sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem cōfirmat. Illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem increescere, solidariq; cum locum. Itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis vtrinq; suitur. Nunc autē de ea dico, quæ cute integra frangitur. In ea vero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contrā lunata plaga excidenda est. Deinde vtendum est medicamento leniter supprimente, quale lyciū est aqua dilutū, donec sanguis fluere desinat. Tum imponēdum linteolum cum emplastro: sic vt pingue omne vitetur, & à parte posteriore lana mollis auri subiicienda est, quæ quod est inter hanc & caput compleat. Tum ea leniter deliganda est, & à tertio die vapore, vt in naribus posui, fouenda. Atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. C. A. P. VII.

AB his ad maxillā vēturus, indicāda quædam puto cōmuniter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadē dicenda sint. Omne igitur os modò rectum vt lignum in longitudinē finditur, modò frangitur transuersum, interdum obliquum: atq; id ipsum nonnunquā retusa habet ca-

pita, nonnunquam acuta. Quod genus pessimum est, quia neq; facile committuntur, quæ nulli re-
tuso innituntur, & carnem vulnerât, interdum
neruum quoq; aut musculû. Quinetiam aliquan-
do plura fragmenta à fragmento fiunt. Sed in
alijs quidem ossibus ex toto sepe fragmentum à
fragmento recedit. Maxilla verò semper aliqua
parte etiam vexata, ossa inter se coherêt. Igitur
in primis digitis duobus vtrinq; prementibus, et
ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem
compellenda sunt. Deinde si transversa maxilla
fracta est, sub quo casu ferè dens super proximû
dentem excedit, vbi ea in suam sedem collocata
est, duo proximi dentes: aut si hi labant, vltorio-
res inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere
fracturæ superuacuum est. Cætera eadem facienda
sunt. Nam linteolû duplex madens vino & oleo
superiniiciendû, cum eadem simila, & eadẽ thu-
ris fuligine est. Deinde aut fascia, aut mollis ha-
bena media in longitudinem incisa, vt vtrinq;
mentum cõplectatur, & inde capita eius supra
caput adducta ibi deligantur. Illud quoq; ad o-
mnia ossa pertinēs dictû erit, famem primû esse
necessariam: deinde à die tertio humidû cibum,
sublata inflammatione paulo pleniorẽ, eumq;
qui carnẽ alat: per omne tempus vinû esse alie-
num. Deinde tertio die resolui debere: foueriq;
per spongiã vapore aquæ calidæ, eademq; quæ
primo fuerûnt superdari. Idem die quinto fieri, et
donec inflammatio finiatur, quæ vel octauo die,
vel

vel septimo fere resoluitur. Ea sublata rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. Neq; id esse soluendum, nisi due partes eius temporis, intra quod quæq; ossa conferunt, transierint. Fere verò intra quartumdecimum & vñ & vigesimum diem sanescunt, maxilla, mala, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarū, os tali, calx, manus, planta. Inter vigesimū & trigesimū diem crura, brachiaq;. Inter septimū & vigesimū & quadragesimum, humeri & femina. Sed in maxilla illud quoq; adiiciendum est, quòd humidus cibus diu assumendus est. Atq; etiā cum tempus processit, in lagano, similibusq; alijs perseverandum, donec ex toto maxillā callus firmarit. Item utiq; primis diebus habendum silentium.

De Iuguli fracti curatione. CAP. VIII.

Iugulum verò si trāsuersum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit, & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. Nonnunquam verò, maximeq; vbi motum est, elabitur, fereq; id quod à pectore sub id quod ab humero est, in posteriorem partē inclinatur. Cuius ea ratio est, quod per se non mouetur, sed cum humeri motu consentit. Itaq; eo subsistente, sub id humerus agitur. Raro verò admodum in priorem partem iugulum inclinatur, adeo ut magni professores nunquam se vidisse memorie mandarint. Sed locuples tamen eius rei autor Hippocrates est. Verum ut dissimilis vterq; casus est, sic quedam

disimilia requirit. Vbi ad scapulas iugulum tendit, simul extra manū plane propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. Vbi ad pectus conuersum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partē adducendus est. Ac si is inferior est, nō id quod à pectore est, deprimendū est, quia immobile est, sed humerus ipse attollendus. Si casu superior est, id quod à pectore est, implendum lana, et humerus ad pectus deligendus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi cōtrā cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, praeidenda sunt: tūc retusa ossa cōmittēda sunt. Si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est, in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula factō canaliculo, eodemq; intus incerato, ne fascia diducatur, quæ iugulo composito circundanda est sæpius potius, quàm valentius. Quod ipsum quoq; in omnibus ossibus fractis perpetuum est. A dextro verò iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram, à sinistro ad dexteram. Rursusq; sub ala sua fasciari debet. Post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus: si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. Supinusq; homo collocandus, cæteraq; eadem faciēda, quæ supra comprehensa sunt. Sunt verò plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel finduntur, vt male, pectus, latus, os scapularum costæ,,

costa, spina costarum, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. Quo sanescente rimas quoque ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. Si cutis integra est, & os lesum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum, imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fracturarum curatione. CAP. IX.

Proprie tamen quaedam de costa dicenda sunt, quia iuxta viscera est, grauioribusque periculis is locus expositus est. Hec quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quae rara est, laedatur: interdum sic, ut eam totam is casus pertrahat. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est, tactu tamen is locus leniter indolescit, abunde est eadem quae supra scripta sunt, facere, & à media fasciā incipere deligare, ne in alterutram partem haec cistem inclinet. Ab vno vero & vigesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum. Cibis vberioribus est utendum, ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius os vestiat, quod illo loco tenerum adhuc iniuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, puluis, & quicquid

quid vel tussim vel sternutamentum mouet, ne spiritum quidem magnopere continere expedit. At si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graues inflammationes, & febris & suppuratio, & sepe vitæ periculum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo si vires patiuntur, ab eo brachio quod super eam costam est, sanguis mittendus est. Si non patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducenda est, diutiusque inedia pugnandum. Panis verò ante septimum diem non assumendus, sed vna sorbitione viuendum, imponendumque ei loco ceratum ex lino factum, cui cocta quoque resina adiecta sit, aut Polyarchi malagma, aut panaces ex vino & rosa & oleo, superque imponenda lana succida mollis, & duæ fasciæ à medijs orse, minimeque adstrictæ. Multo verò magis omnia vitanda, quæ supra posui, adeo, ut ne spiritus quidem sepius mouendus sit. Quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stæchade, vel ex cumino & pipere. Grauioribus verò doloribus urgentibus, cataplasma imponi quoque conueniet vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. Et id quidem interdum superiacebit. Noctu verò idem aut ceratum, aut malagma, aut panni, quia potest cataplasma * quæque decidere. Ergo quotidie * quoque resoluetur, donec iam cerato aut malagmate possumus esse contenti, et decem quidem diebus extenuabitur fame corpus, ab undecimo verò ali incipiet. Ideoque
etiam

etiam laxior quàm primo fascia circumligabitur, fereq; ea curatio ad quadragesimū diem perueniet: quæ si modus erit suppurationis, plus malagma quàm ceratum ad digerendū proficiet. Si suppuratio ricerit, neque per quæ suprà scripta sunt discuti potuerit, omnis mora vitanda erit, ne os infrà vitietur: sed qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat, idq; effundēdū. Si nusquam caput se ostendit, vbi maxime pus subit, sic intelligimus: creta similia totum locum illinimus, & siccare patiemur: quo loco maximè humor in ea perseverauit, ibi pus proximum erit, eaq; vri debeat. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandū, demittendū erit linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit deuinctum, vt facile educatur. Reliqua eadem, quæ in cæteris adustis facienda sunt. Vbi purum erit vlcus, ali corpus debeat, ne tabes perniciofa futura id malum subsequatur. Nonnunquam etiam leuius ipso osse adfecto, & inter initia neglecto, nō pus, sed humor quidam muccis similis, intus coit, mollescitq; contrà cutis, in qua simili vstione vtendum est.

De spinæ curatione.

IN spina quoq; est quod proprie notemus. Nā si id ex vertebra excidit, aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit, punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. Quo fit, vt homo in interioribus

rem partem subinde nitatur. Hæc noscendæ rei
caussa sunt. Medicamentis verò iisdem opus est,
quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

De humerorum, brachiorum, femorum, cru-
rum, digitorum fractorum vel euulso-
rum, communibus curationibus.

C A P. X.

Similes rursus ex magna parte casus cura-
tionesq; sunt humeris & femoribus. Comu-
nia etiam quedam humeris, brachijs, femoribus,
cruribus, digitis. Siquidem ea minime periculose
media franguntur. Quo propior fractura capiti
vel superiori vel inferiori est, eo peior est. Nam
& maiores dolores adfert, & difficilior cura-
tur. Ea maxime tolerabilis est simplex, trans-
uersa: peior, ubi fragmēta, atq; ubi obliqua: pes-
simum ubi eadē acuta. Nonnunquam aut fracta
in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius
excidunt, aliudq; super aliud effertur. Idq; ante
omnia considerari debet, & sunt notæ certæ. Si
suis sedibus mota, resima, pūctionisq; sensum re-
præsentant, tactu inequalia sunt. Si verò non
aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit ubi loco
suo non sunt, membrum id altero latere breuius
est, & musculi eius tument. Ergo si hoc depres-
sum est, protinus id mēbrum oportet extendere.
Nam nerui, musculiq; intenti per ossa contra-
huntur, neq; in suū locum veniunt, nisi illos per
rim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id
omissum est, inflammatio oritur. Sub qua &
difficile & periculose vis neruis adhibetur. Nam
distentio

distentio neruorum, vel cancer sequitur, vel certum, vt ^{*}diutissime alatur, pus. Itaq; si antè re- ^{*}mitissim-
posita ossa non sunt, postea reponenda sunt. In- me
tendere autem digitū vel aliud quoq; membrum,
si adhuc tenerū est, etiam vnus homo potest, cum
alteram partē dextra, alteram sinistra prendit.
Valentius membrum duobus eget, qui in diuersa
contendant. Si firmiores nerui sunt, vt in viris
robustis, maximeq; eorum feminibus & cruri-
bus euenit, habenis quoq; vel linteis fascijs v-
trinq; capita articulorum deliganda, et per plu-
res in diuersa ducenda sunt. Vbi paulò longius
quàm naturaliter esse debet, membrum vis fecit:
tum demum ossa manibus in suam sedem com-
pellenda sunt, indiciumq; ossis repositi est, dolor
sublatus. Et membrum alteri parti equatum in-
uoluendum duplicibus triplicibus' ve pannis, &
in vino & oleo tinctis, quos linteos esse commo-
dius est. Ferè verò fascijs sex opus est. Prima
breuissima adhibenda, quæ circa fracturam ter
voluta sursum versum feratur, & quasi in co-
chlea serpat, satisq; est eam ter hoc quoq; modo
circuire. Altera dimidio longiore, eaq; qua par-
te os emmet, ab ea si totum æquale est, vndelibet
super fracturam debet incipere priori aduersa,
deorsumq; tendere, atq; iterum de fractura re-
uersa in superiore vltra priorem fasciam desi-
nere. Super has iniiciendum latiore linteo cera-
tum est, quod eas contineat, ac si qua parte os
eminet, triplex ea pannis obijciendus, eodem vi-
no &

no & oleo madens. Hæc tertia fascia comprehendenda sunt, quartaq; sic ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia tantum in inferiore *faciant parte, tres in superiore *finiant, quia satius est sepius circuire, quam adstringi. Siquidem id quod adstrictum est, alienatur, & cancro opportunum est: articulum autem quàmminime vincire opus est. Sed si iuxta hunc os fractum est, necesse est. Deligatum verò membrum in diem tertium continendum est. Eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa sit, secundo laxior, tertio iam penè resoluta. Ergo tum rursus id membrum deligandum, adyiciendaq; prioribus quinta fascia, iterumq; quinto resoluendum est, et sexto fasciis inuoluendum, sic ut tertia & quinta infrà, ceteræ suprà finiantur. Quotiescūq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendū est. Sed si iuxta articulum fractura est, diu instillandū vinum est, exigua parte olei adiecta, eadēq; omnia facien-
 * adeò da donec * ab eo inflammatio soluatur, vel leuius quoq; quàm ex consuetudine id membrum fiat. Quod si septimus dies nō dedit, certè nonus exhibet. Tum facillime ossa tractantur. Rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. Si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponēda sunt. Deinde eodē modo membrum deligādū, ferulaq; superaccommodāda sunt, quæ fissæ circumpositæq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinat, ab ea latior, valentiorq; ferula impon

imponenda est. Easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hūc ledant, nec vltra astrin-
gi, quā vt ossa contineant: & cum spatio la-
xentur, tertio quoq; die paulū habenis suis coar-
tari: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic ma-
nere donec duæ partes eius temporis quod os
quoq; conseruet compleantur, postea leuius aqua
calida fouere, quia primo digeri materiam opus
est, tum euocari. Ergo cerato quoque liquido id
*leniter est vngendū, perfricandāq; summa cu- *pleniter
tis est, laxiusq; id deligandum est. Tertio quoq;
die soluendum sic, vt remota calida aqua, cetera
eadem fiant. Tantummodo singulæ fasciæ quoties
resolutæ fuerint, subtrahantur.

De fracti humeri curatione.

Hæc communia sunt. Illa propria. Siqui-
dem humerus fractus, non sic, vt mēbrum
aliud intenditur. Sed homo collocatur alto sedili,
medicus autem humiliore aduersus. Vna fascia
brachium amplexa ex ceruice ipsius qui latus
est, id sustineat. Altera ab altera parte super ca-
put data, ibi accipit nodū. Tertia iuncto imo hu-
mero deorsum demittitur, ibi quoq; capitibus
eius inter se iunctis. Deinde ab occipitio ipsius,
minister sub ea fascia quam secundo loco posui,
correpto: si dexter humerus ducendus est, dex-
tro: si sinister, sinistro brachio, demissum inter
femina eius qui curatur baculum tenet: medicus
super eam fasciam de qua tertio loco dixi *pal- *planam
mam inijcit. dextrā: si sinister, sinistra: si dexter
humerus

humerus sumatur, simulq; alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fasciis verò, si medium aut imum os fractum est, brevioribus opus est: si summum, longioribus, ut ab eo sub altera quoq; ala per pectus & scapulas porrigantur. Protinus verò brachium cum deligatur, sic inclinandum est id quod afficit, ut ante fascias quoq; sic figurandū sit: ne postea suspensum aliter, aliter cum deligabatur, humerū inclinet. Brachioq; suspenso, ipse quoq; humerus ad latus leniter deligandus est. Per quæ fit, ut minime moveatur, ideoq; ossa sic se habēt, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent, à lacerto breviores, sed sub ala brevissimæ. Sæpius eæ resoluendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiant. Quoties solutæ sunt, fractura manu continenda, cubitus aqua calida fouendus, & molli cerato perfricandus, feruleq; vel omnino non imponendæ cōtra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sunt.

De brachij fracti curatione.

AT si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrunque comminutum sit, non quòd alia in eiusmodi casu curatio adinvenienda, sed primū, ut valentius extendatur, si utrunq; os fractum est: quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosq;

eosq; intendente. Deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fascijs, ferulisq; est. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato. Siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit, idq; inuolutum mitella commodissime excipitur, quæ latitudine ipsi brachio, per angustis capitibus collo inijcitur, atque ita commodè brachium ex ceruice suspensum est. Idq; paulum supra cubiti alterius regionē pendere oportet. Quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id vinciendo alienum est. Fit enim brachium immobile, ac si nihil aliud quam dolori occursum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumq; fractorum curatione.

IN crure æquè ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune verò ei femoriq; est, quod ubi deligatum est, in canalem coniiciendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habet, per quæ si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur: & à lateribus caua, per quæ loris datis mora quidem crus femurq;, ut collocatum est, detineat. Esse etiam is debet à planta, si crus fractum est, circa poplite: si femur, usq; ad coxam: si iuxta superius caput femoris, sic ut ipsa quoq; ei coxa sit. Neq; tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum

K

revert

reuertitur, summiq; digitis postea cruris eius insisti, sed multa tamen femori debilitas est, ubi fortuna negligentia quoq; accessit.

De fracti digiti curatione.

^{*furculū} **D**igitum satis est ad unum*furunculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; contrafactos, pertinentes.

His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum iam increfcere callum oportet, liberalius alimentum, longa à vino abſtinentia, fomentum aque calidae, dum inflammatio eſt, liberale, cum ea deſit, modicum. Tum etiam longior vltterioribus è liquido cerato membris, & mollis tamen vntio. Neq; protinus exercendum id membrum, ſed ad antiquos vſus reducendum eſt. Grauius aliquanto eſt, cum oſſis fracture carnis quoque vulnus acceſſit, maximeq; ſi id muſculi femoris aut humeri ſenſerunt. Nam & inflammationes multo grauiores & promptiores caneros habent. Ac femur quidem, ſi oſſa inter ſe ceſſerunt, ſerè præcidi neceſſe eſt. Humerus verò quoque in periculum venit, ſed facilius conſeruatur. Quibus periculis etiam magis id expoſitū, quod iuxta ipſos articulos iſtum eſt. Curioſius igitur agendum eſt, & muſculus quidem per mediam plagam tranſuerſus præcidendus. Sanguis verò, ſi parum fluxit, mittendus: corpus inedia extenuandū, ac reliqua quidem

dem membra lentius intendenda, & lenius in
 his ossa in suam sedem reponenda sunt. His verò
 neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis ex-
 pedit. Ipsiq; homini permittendum est, vt sic ea
 collocata habeat, quemadmodū minime lædunt.
 Omnibus autē his vulneribus imponendum pri-
 mo linamentū est vino madens, cui rosæ paulum
 admodum adiectum sit: cætera eadem deligan-
 da fascijs sunt aliquanto quàm vulnus latiori-
 bus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset,
 quanto facilius & alienari & occupari cancro
 vulnus potest, * numeris potius fasciarum id * nume-
 agendum est, vt laxæ quoque æquè contineant.
 Quod in femore humeroq; sic fiet, si ossa forte re-
 ctè concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus
 circumdari fascia debet, vt impositum medica-
 mentū contineat. Cætera eadē quæ suprà scripsi,
 faciendæ sunt, præterquam quòd neq; ferulis, neq;
 canalibus, inter quæ vulnus sanescere non potest,
 sed pluribus tantummodo & latioribus fascijs
 opus est, ingerendumq; subinde in eas est cali-
 dum oleum & vinum, magisq; in * principio fa- * primo
 me vtendū, vulnus calida aqua fouendū, frigusq;
 omni ratione vitandum est, & transeundum ad
 medicamenta, quæ puri mouendo sunt, maiorq;
 vulneri quàm ossi cura agenda. Ergo quotidie
 soluendum nutriendumq; est. Inter quæ si quod
 paruulum fragmentum ossis eminet, id si retu-
 sum est, in suam sedem dandum: si acutum, antè
 acumen eius longius est præcidendum: si bre-
 uius,

uius, limandum, & vtrinque scalpro limandum,
tum ipsum recondendum est: ac si id manus fa-
cere non potest, volsella, quali fabri vtuntur, in-
ijcienda est, recte se habenti capite ab ea parte
qua sima est, vt ea parte qua gibba est, eminens
os in suam sedē compellat. Si id maius est, mem-
branulisque cinguntur, sinere oportet ea sub medi-
camentis resolui, idque os, vbi iam nudatum est,
abscindere: quod maturius scilicet faciendum est,
prodestque ea ratione & os coire, & vulnus sa-
nescere. Illud suo tempore, hoc prout se habet.
Nonnunquam etiam in magno vulnere euenit,
vt fragmenta quedam velut emoriantur, neque
cum ceteris coeant. Quod hic quoque ex modo
fluentis humoris colligitur. Quo magis necessa-
rium est, sepius vlcus resolvere atque nutrire. Se-
quitur verò, vt id os per se post aliquot dies ex-
cidat, cum tam misera antea conditio vulneris sit,
tamen id interdum maius diutiusque facies. Saepe
enim integra cutis osse abrumpitur, protinusque
prurigo & dolor oritur. Quae soluere, si accidit,
maturius oportet, & fouere aqua per aestatē fri-
gida, per hyemem egelida: deinde ceratum myr-
teum imponere. Interdum fractura quibusdam,
velut aculeis carnem vexat, quo à prurigine &
punctionibus cognito, aperire id melius, eosque
aculeos praecidere necesse habet. Reliqua verò
curatio in vtroque hoc casu eadem est, quae vbi
ictus protinus intulit puro iam vlcere. Cibis hic
quoque vtendum est carnem producentibus, si
breuius

breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quàm leuissimi generis inter ea demitti debet, sic vt capite paulum supra vlcus emineat, isq; quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est, cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hedera, aliæ'ue similes verbenæ sint: illinendumq; medicamentum quod siccet, et magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. Si quando verò ossa non conferbuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est: possunt enim coire. Si vetustas occupauit, membrum extendendum est, vt aliquid ledatur. Ossa inter se manu diuidenda, ut concurrendo exasperentur, vt si quid pingue est, eradatur, totumq; id quasi recens fiat. Magna tamen cura habita, ne nerui musculi'ue ledantur. Tum vino fouendum est, in quo malicorium decoctū sit, imponendumq; id ipsum oui albo mistum. Tertio die resoluendum, fouendumq; aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. Quinto die idem faciendum, feruleq; circumdandæ. Cætera & antè & post eadem faciendæ, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa & coherere. Eoq; * conferu
& breuius membrum & indecorum fit: & si re: vel co
capite acutiora sunt, adsiue punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa & di-
rigi debent. id hoc modo fit: Calida aqua multa
alefcere

membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurq;: & inter hæc medicus pertractans ossa: vt adhuc tenero callo manibus eddiducit, compellitq; id, quod eminet in suam sedem: & si parum valuit, ab ea parte, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obijcit. Atq; ita deligando assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Nonnunquam autem recte quidem ossa cœperunt, superincreuit verò nimis callus, ideoq; locus intumuit. Quod vbi incidit, diu leniterq; id membrum perfricandum est ex oleo & sale & nitro, multumq; aqua calida salsa fouendum, & imponendum malagma quod digerat, astringensq; alligandum, oleribusq; & præterea vomitu vtendum. Per quæ cum carne callus quoq; extenuatur, confertq; aliquid de sinapi, quod cum ficu in alterum pariter membrum impostum, donec id paulum erodat, eoq; euocet materiam. Vbi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus.

CAP. XI.

AC de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modò quæ iuncta sunt inter se dehiscunt, vt cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à sura, interdum à saltu, calcis os à talo, quod raro tamen fit. Modò articuli suis sedibus excidunt. Antè de prioribus dicam. Quorum vbi aliquid incidit, protinus is locus cauius est,

est, depressusq; digitus sinum inuenit. Deinde
grauis inflammatio oritur, atque in talis prae-
cipua. Siquidem febres quoque & caneros &
neruorum vel distentiones vel rigores, qui ca-
put scapulis annectunt, mouere consuevit. Quo-
rum vitandorum causa facienda eadem sunt,
quae in ossibus mollibus laesis: ubi aliquid inci-
dit, protinus his locis proposita sunt, ut dolor tu-
morq; per ea tollantur. Nam diducta ossa nun-
quam rursus inter se iunguntur, & ut aliquid
decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. Maxil-
la verò & vertebra omnesq; articuli cum vali-
dis nervis comprehendantur, excidunt: aut vi
expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis vel in-
firmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis,
quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in prio-
rem & in exteriorem partem, quidam omnibus
modis, quidam certis. Suntq; quaedam communia
omnium signa, quaedam propria sunt cuiusq;. Si-
quidem semper ea parte tumor est, in qua os pro-
rumpit: ea sinus, à qua recessit. Et haec quidem
in omnibus deprehenduntur, alia verò si in singu-
lulis. Quae simulatq; de quoq; dicam, proponen-
da erunt. Sed ut excidere omnes articuli non
possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim
nonnunquam compellitur, neque in spina verte-
bra, neq; ea maxilla quae utraq; parte prolapsa
antequam reponeretur, inflammationem mouit.
Rursum qui neruorum vitio prolapsi sunt, com-
puli quoque in suas sedes iterum excidunt. At

quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt, minus quàm ceteri crescunt. Omniumq; , quæ loco suo non sunt , caro ea increfcit , magisq; in proximo membro, quàm in vltiore. Vtputa si humerus loco suo non est , maior in eo ipso fit, quàm in brachio : maior in hoc, quàm in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt , aut maior aut minor vsus eius membri relinquitur : quoq; in eo plus vsus superest , eo minus id extenuatur. Quicquid autem loco suo motum est , ante inflammationem reponendum est. Si illa occupauit, tum conquiescat, lacescendum non est : vbi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & neruorum habitus. Nam si corpus tenue, si humidum est, si nerui infirmi, expeditius os reponitur. Sed & primo facilius excidit , & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent. Sed id quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem leuare , super succida lana ex aceto imposita. A cibo , si valentioris articuli casus est, triduo : interdum etiam quinque diebus abstinere debet. Bibere aquam calidam dum sitim finiat. Curiosiusq; hæc facere his ossibus motis , quæ validis plenisq; musculis continentur : si verò etiam febris accessit , multo magis : deinde ex die quinto fouere aqua calida, remotaq; lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adiecto donec omnis inflammatio

matio finiatur. Tunc infriktionem ei membro adhibere, eibis vti bonis, vti vino modice, iamq; ad vsus quoque suos id membrum promouere: quia motus vt in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus corpori est. Hæc communia sunt, nunc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione. C A P. XII.

Maxilla in priorem partem propellitur, sed modò altera parte, modò vtraque. Si altera, in contrariam partem ipsa, mentumq; inclinatur, dentes paribus non respondent, sed sub his qui secant canini sunt. At si vtraque, totum mentum in exteriorem partem promouetur, inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt, intentiq; super muscoli apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic vt minister à posteriore parte caput eius contineat: vel sic, vt iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorteo puluino duro: eoq; caput per ministrum vrgeatur, quo sit immobilius. Tum medici digiti pollices linteolis vel fascijs, ne dilabantur, inuoluti in os eius coniungiendi: ceteri extrinsecus admo- uendi sunt. Vbi vehementer maxilla apprehensa est, si vna parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic vt omnia penè vno momento fiant. Si in vtraq; parte prolapsa est, ea-

K 5 dem

dem omnia facienda, sed aequaliter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus verò quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conveniat, tum his precipue, adeo ut sermo quoque frequenti motu oris per nervos ledat.

De capite luxato.

CAP. XIII.

CApud duobus processibus in duos sinus summa vertebra demissa, super cervicem contineri in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt, quo fit, ut nervus sub occipitio extendatur, mentum petiori adglutinetur, neque bibere, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. Quibus celerrime mors superuenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei vlla sit, sed ut res indicijs cognosceretur, & non putaret sibi medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

De spina lnxata.

CAP. XIII.

Idem casus manet eos, quorum in spina vertebra exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi ex medulla, quae per medium, & duabus membranulis, quae per duos à lateribus processus feruntur, & nervis, qui continent, ruptis. Excidunt autem & in posteriorem partem, & in priorem, & supra septum transversum, & infra. Si in utranque partem exciderint, à posteriore parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super septum
id

id incidit, manus resolvitur, vomitus aut distentio nervorum insequitur, spiritus difficulter movetur, dolor urget, & aures obtusae sunt. Si sub septo, femina resolvuntur, urina supprimitur, interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex eiusmodi casibus, ut tardius quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. Nam quod Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem partem prolapsa, primum hominem collocandū esse, & extendendū, tum calce aliquem super ipsam debere consistere, id intus impellere: in his accipiendum est, quae paulum excesserunt, non in his, quae toto loco mutatae sunt. Nonnunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut quamvis non exciderit vertebra, paulum tamen in priorē partem promineat. Id non iugulat, sed ab interiore parte non contingit quidem posse: ab exteriore si propulsum est, plerumque iterum redit: nisi, quod admodum rarum est, vis nervis restituta est.

De humero luxato.

CAP. XV.

Humerus autem modo in alā excidit, modo in partem priorē. Si in alā delapsus est, & victus cubitus recedit ab latere, rursum iuxta eiusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorē partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam naturaliter, difficiliusque in priorē partem quam in posteriorē cubitus porrigitur. Igitur si in alā humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus vel molle, certe

certe & imbecilibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili, & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat, alteri ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem humerum sub ala eius cogere, simulq; & latum os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. At si vastius corpus nervi ne robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos pervenit. In qua summâ capitulū est rotundum, & leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea bina foramina tribus locis sunt inter se spatio distantibus, inq; ea lora mollia coniunguntur. Ea q; spatha fascia involuta, quo minus tactu ledat, ad alam à brachio dirigitur, sic ut caput eius summa ala subiiciatur. Deinde, loris suis ad brachium deligatur, vno loco paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio supra manū. Cui rei protinus interuallatunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scale gallinariae gradum traicitur, ita alte, ut consistere homo ipse non possit, simulq; in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur. Eo q; fit ut capite ligni caput humeri impulsus, in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est vno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est.

ta est. At si in priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est, fasciaq; aut habena media ala circundanda est, capitaq; eius post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq;, ut ille habenam, hic brachium extendat. Deinde, medicus caput quidem hominis sinistra debet repellere, dextra verò cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere, faciliusq; id in hoc casu, quàm in priore reuertitur. Reposito humero, lana alæ subijcienda est. Si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur. Si in priore parte, ut tamen commodius deligetur. Tum fascia primum sub ala obvoluta, caput eius debet comprehendere, deinde profectus ad alteram alam, ab eaq; ad scapulis, rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. Sapiusq; ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vinctus hac ratione humerus commodius continetur. Si adductus ad latus sit, ad id quoque fascia deligatur.

De Cubiti luxati curatione. CAP. XVI.

IN cubito autē tria coire ossa, humeri, & radij & cubiti ipsius, ex his quæ prima parte huius voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus qui innexus humero est ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes verò quatuor partes excidere cubitus potest: sed si in priorem prolapsus est, extensum brachium est, neq; recurvatur. Si in posteriorem, brachium curvum est, neque extend

extenditur, breuiusq; altero est. Interdū febrem vomitumq; bilis mouet. Si in exteriorē interiorēue brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio vna est. Neq; in cubito tantum est, sed in omnibus quoq; mēbris longis, quæ per articulum longa testā iunguntur. Vtrunq; membrū in diuersas partes extendere, denec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte, in quā prolapsus est, in cōtrariam impellere. Extendendi tamen alia atq; alia genera sunt, prout nerui valent, aut ossa huc illucue sederunt. Ac modò manibus solis vtendum est, modò quadam alia adhibēda. Ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habentis inieclis satis est. Deinde rotundum aliquid à lacerati parte ponēdum est, & super id repente cubitus ad lumerum impellendus est. At in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ fracto cubito suprā posita est, & tum ossa reponere. Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum & sæpius id resoluendum est, multoq; magis aqua calida fouendum, diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quàm in vllō alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus circundatur, isq; si per quietem increnit, flexus illius postea prohibet.

De Manu luxata.

C A P. XVII.

Manus

Manus quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut pollicem, aut ad minimum digitum convertitur. Reponi non difficilime potest. Super durum locum & renitentē ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet, sic ut prona sit: si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorem, si in anteriorem exteriorē ue, in latus. Vbi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. At his, quæ in priorem posteriorem ue partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid, idq; supra prominens os manu urgendum est, per quod vis adiecta facilius in suam sedem compellit.

De Palma.

CAP. XVIII.

IN palma quoq; ossa interdū suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. In latus enim moueri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est, tumor ab ea, in quam os venit: sinus ab ea, à qua recessit. Sed sine intentione digitorum, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

De digitis.

CAP. XIX.

AT in digitis totidem ferè casus, eademq; signa sunt, quæ in manibus. Sed in his extendendis non æque vi opus est, cum & articuli breuior

breuiiores, & nerui minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem, vel in posteriorem partem exciderunt, tum iam palma compelli, atque id quod in latus elapsum est, digitis restitui.

De Femore.

C A P. XX.

Cum de his dixerim, de his quoque quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse. Si quidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori & humero, & tibiæ & cubito, pedi & manui. Quedam tamen separatim quoque de his dicenda sunt. Femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpiissime in interiorem, deinde in exteriorē, raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crus longius altero & vastius est: extrā enim pes ultimus spectat. Si in exteriorē, breuius rarumque fit, & intus inclinatur, calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu fert, minusque baculo eget. Si in priorē crus extensum est, implicarique non potest, alteri cruri ad calcem par est: sed ima planta minus in priorem partem inclinatur, dolorque in hoc casu præcipuus est, & maxime vrina supprimitur. Vbi cum dolore inflammatio quieuit, commode ingrediuntur, totusque eorum pes est. Sed & si in posteriorē extendi non potest crus, breuiusque est, ubi constitit, calx quoque terram non contingit. Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter

ter reponatur, vel repositū rursus excidat. Quidā iterum semper excidere contendunt, sed Hippocrates & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriae prodiderūt. Neq; tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, Andreas Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoq; quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hæc falsa opinio est, sic illud verum est. Cum ibi valentissimi nerui, musculiq; sint, si suum robur habent, vix admittere: si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alterā à genu intendi. Si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligarint: tumq; eorum fustium imas partes oppositæ moræ obiecerint, superioresq; ad se utraq; manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrū super scamnū, cui ab utraq; parte axes sunt, ad quos habenæ illæ deligantur, qui ut in torcularibus conuersi, rumpere quoq; si quis perseuerauerit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus: sic ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est: ea etiam inferior, à qua recessit. Nervis extentis in priorem os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum, subitoq; super id,

L genu

genu adducendum est eodem modo, eademq; de causa, qua idem in brachio fit, protinusq; si complicari femur potest, intus est. In cæteris verò casibus, ubi ossa per vim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet, retro cogere, minister contrà inde coxam propellere. Posito ossè, nihil aliud novi curatio requirit, quàm ut diutius is in lecto detineatur, ne si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

De Genu.

CAP. XXI.

Genu quoq; & in exteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere notissimū est, in priorem non prolabi pleriq; scripserunt. Potestq; id verò proximū esse: cum idem opposita patella, ipsa quoq; caput tibiæ cõtineat. Meles tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoriæ prodidit. In his casibus intendi nervi rationibus iisdem quas in femore retuli, possunt. Et id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoq; eo crure reconditur. Cætera verò manibus simul, tum ossa in diuersas partes compelluntur.

De Tallo.

CAP. XXII.

Talus in omnes partes prolabitur. Vbi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem cõuertitur. Vbi huic contrarius talus, contrariū etiam signum extat. Si in priorem partem erūpit, à posteriore latus nervus durus & insanus est, minusq; is opus est: si
in

in posteriorem, calx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem is quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. Et in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseuerandum est, ne is talus, qui totum corpus sustinet, parum cōfirmatis neruis ferendo oneri cedat, rursusq; prorumpat. Calceamētis quoq; humilioribus primo tempore vtendum, ne iunctura talum ipsum ledat.

De Planta.

CAP. XXIII.

PLantæ ossa iisdem modis quibus in manu, prodeunt, iisdemq; conduntur. Fascia tantummodo calcem quoq; debet comprehendere: ne cum mediam plantam imumq; eius vinciri necesse est, libertalus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat, ideoq; suppuret.

De Digitis.

CAP. XXIIII.

IN digitis nihil vltra fieri debet, quàm quod in his qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo cōtineri. Hæc faciendæ sunt in his casibus, vbi sine vulnere ossa exciderūt. Hic quoq; & ingens periculum est: & eo grauius, quo maius membrum est, quo'ue validioribus neruis aut musculis continetur. Ideoq; humeris, femoribusq; metus mortis est, ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoq; maior in vtroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse, præter digitos & plantas & manus dixit, atque in his quoq;

L 2

dilig

diligenter esse agendum, ne precipitarent. Quidam brachia quoque & crura reposuerunt. Et ne cancri, distentionesque nervorum orirentur, sub quibus in eiusmodi casu fieret mors matura, sanguinem ex brachio miserunt. Verum ne digitus quidem in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet ante inflammationem, aut postea cum iam vetus res est. Si reposito quoque osse nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic iacere conuenit, ut maxime cubantem iuuat, tantum ne moueatur, neque dependeat. In omni quoque tali morbo magnum ex longa fame praesidium est. Deinde ex curatione eadem quae proposita est, ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. Id quod excedit, abscindendum est. Imponendaque super arida linamenta sunt & medicamenta non pinguia, donec quae sola esse in eiusmodi re sanitas potest, veniat. Nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur, quae necesse est facile noxae postea pateat.

F I N I S.


Q. SERENI
SAMONICI
VITA.

Q. Serenus Samonicus Gordiani iunioris praeceptor fuit: cuius meminit Spartianus in Caracalla, his verbis: Occisi sunt & in balneis plures, & in cœnis: inter quos Samonicus Serenus, cuius libri plurimi ad doctrinam extant. Macrobius quoq; Saturnalium tertio, carmina quaedam de urbibus de-nouendis in libro quinto Reconditorum Samonici Sereni reperisse se ait. Superfunt hodie hi hexametri,
præcepta Medicinae continentes.

L 3

Q. SERENI S A-
MONICI DE ME-
DICINA PRAE-
CEPTA SALV-
BERRI-
MA,

Antonij Molinij Matiscenensis opera, di-
ligenter emaculata.



MEMBRORVM series certo de-
ducta tenore

Ut stet, & assimilis medicinae de-
fluat ordo,

Principio celsa de corporis arce loquamur.

Phœbe salutiferū, quod pangimus, asserere carmē,

Inuentumq; tuum prompto comitare fauore.

Tuq; potens artis, reduces qui tradere vitas

Noſti, & in cælum manes reuocare sepultos,

Qui colis Aegeas, qui Pergama, quiq; Epidaurū,

Qui quondam placidi tectus sub pelle draconis,

*tecta Tarpeias arces, atq; inclyta*templa petiſti,

Depellens tetros præſenti numine morbos,

*locutus Huc ades, & quicquid cupido mihi ſepe*rogati

Firmaſti, cum lum teneris expone papyris.

Capiti medendo.

B Alſama ſi geminis inſtillans auribus ad-
das,

Tum poteris alacrem capitis reparare vigorem.

Vel

Vel quæ septenis censentur gramina nodis,
Viiliter vectis, vel corno ex arbore sertum,
Pulegium' ve potens vna super aure locabis,
Aut illud misto*recoquens clementer aceto, *coctum
Cauta nare trahes: seu visco lintea nexo
Induces fronti: seu trita gramina mente.
Spōgia cum tepidis annexa liquoribus hymbis
Profuit: aut hedera ex oleo*colata vetusto. *decocta
Profuit & cochleis frontem tractare minutis.
Si nocuit cerebro violentia solis aperto:
Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore
Sanavit: profunt & amica papauera somno,
Si prius in lento madefacta*terantur oliuo. *coquan

Hemicranio medendo.

Portio si capitis morbo tentetur acuto,
Allia diuersam lana contecta per aurem
Inducta profunt, & eodem balsama pacto.
Allia vel ternis piperis terna addita granis,
Trita lines: certam dabit hæc tibi cura salutem.

Porrigini depellendæ.

Est insensibilis morbus, sed noxia forma,
Cum caput immesa pexu porrigine ningit,
Copia farris vti freudentibus edita saxis.
Hanc poterit malue radix decocta leuare.
Aut tu sceniculum, nitrumq;, & sulphura vna
Contere, deinde caput permistis ablue cunctis:
Furfuribus' ve nouis durum miscebis acetum,
Ut varios crines tali des vngvine puros.
Prodest & tarda demptus testudine sanguis.

L 4

Et

Et prodest cedro demissus ab arbore succus.
Desinet interea glomerari farrea nubes,
Cessabitq; grauis crebra porriginis humber.

Capillo tingendo.

Q Vos pudet atatis longa, quos scilicet senectus
Offedit, cupiunt pperos abscondere canos,
Et nigrum crinem fūco simulare doloſo,
His prodest acri contrita cupressus aceto,
Vel frons lentisci, vel tristia poma sabuci:
Lumbrici quoq; terre stres miscentur oliuo,
Et iuuenem praestant rediuiuo flore capillum.
Praeterea niueum poterit depellere crinem,
Resina ex facili cara viscoq; coacta.
Ad rutilam speciem nigros flauescere crines,
Vnguento cineris praedixit Tullius autor.
Si pragnans artus captiui soricis edit,
Dicuntur foetus nigranti lumina fingi.

Phthiriasi arcenda.

N Oxia corporibus quadam de corpore nostro
Progeniuit natura, volens abruptere somnos
Sensibus, et monitis vigiles incendere curas.

Plin. li. 7. Sed quis non paueat Pherecydis fata tragædi,
cap. 31. Qui nimio sudore fluens animalia tetra

Eduxit, turpi miserum quæ morte tulerunt.

Plin. li. 7. Sylla quoq; infelix tali languore peresus
cap. 44. Corruit, et fædo se vidit ab agmine vinci.

Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi,
Vel nitro ac sale permistis, acidoq; liquore
Laxatis (ut sint simul allia) tangere corpus,

Aut

Aut lacrymis hederæ, aut succo*perducere cedri *perfun-
 Quin etiam furfur misto medicatur aceto. dere
 Vnda maris lendes capiti deducit iniquas,
 Et quicquid cerebri defendit sylua capilli.

Prurigini, papulis, ac scabiei arcendis.

Illotus sudor, vel copia nobilis escæ
 Sæpe graui scabie correptos asperat artus.
 Ergo lutum prodest membris adhibere fricatis,
 Quod facit ex asino siccatus corporis humor.
 Nec pudeat tractare finum, quem bucula fudit.
 Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis,
 Sic pavidum corpus dextra parcente foueto.
 Proderit ox oleo pulvis, quem congerit alte
 Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.
 Conuenit hinc tepido lita tradere corpora soli.
 Feruentes papulas*oleo curato liquenti, *papyro
 Aut acido Baccho miscebis farra lupini,
 Atq; hinc in calido percurres membra lauacro,
 Pruritus autem salsos leuat humor aceti,
 Sive maris*rabidi sudor, cochleæq; minuta, *auidi
 Quarum contactu perimetur acerba libido.

Phrenesi, & capiti purgando.

EX vitio cerebri Phrenesis furiosa mouet,
 Amissasq; refert frendens amētia vires,
 Sive calens febris iactatos exedit artus,
 Sive meri gustus, seu frigoris efficit aura,
 Conueniet calidis pecudum pulmonibus aptè
 Tempora languentis medica redimire corona.
 Illotis etiam lanis suffire memento.

Ceritum sepe horrendi medicantur odores,
 Atq; ideo sanos etiam curarier est par.
 Purgatur cerebrum mansa radice pyrethri,
 Ungitur & succis, dederit quos parua sabucus,
 Expressusq; hederæ mandatur naribus humor.
 Aut mistum rutæ cerebro instillatur acetum.
 Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo
 Cura magis prodest venturis obuia morbis.

De fluore capillorum, & maculis
 capitis tollendis.

D Esluit expulsus morbo latitante capillus,
 Si raro lauitur, seu vis epota veneni,
 Seu salamandra potens, nullisq; obnoxia flâmis,
 Eximium capitis tactu deiecit honorem.
 Nonnunquã variant maculæ, paruisq; parumper
 Orbibus aspersum ducit noua vulnera tempus,
 apponi. Vipereæ pellis cinerem his* addito rebus,
 Roboreas' ve pilas vrsino iungito seuo,
 Vel testudineo mala permulceto cruore.

Humoribus, & perfrictionibus
 medendis.

S Aepe ita puadit vis frigoris, ac tenet artus,
 Vt vix quæsito medicamine pulsa recedat.
 Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem,
 Membra foue: parili sanat ratione rigorem
 Vrticæ semen, perceptaq; frigora vincit.
 Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.
 Decoctum raphani semen cum melle vorabis,
 Sine fel vrsinum tepefacta dilue lymphæ.
 Proderit

Proderit hoc potu, seu cassis ostrea testis
 Vsta dabit cinerem, qui pro sale sumptus in escis
 Decutiet gelidum calefacto vertice virus.
 Nonnullus liquidum sumit mulsumq; sinapi,
 Atq; palato agitat retinensq; vomensq;
 Allia nonnulli mandunt, olei'ue liquore
 Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.
 Quidam lactuce credunt prodesse sapes,
 Curandi modus hic & suavis & utilis idē est.

Elephantiasi propellendā.

Est elephas morbus tristi quoq; noīe dirus,
 Non solum turpans infandis ora papillis,
 Sed cita præcipitans funesto fata veneno.
 Huic erit aduersus cedri de cortice succus,
 Musteleq; cinis, vel fusus sanguis ab illa.
 Nonnulli dixere serum prodesse bibendo.
 Mentastri folium potu, apposituq; salubre est.
 Nec frustra bulbos & sulphura iungis aceto.
 Præterea nitrum debes cum melle iugatum
 Spargere lacte bouis, varias sic ungere frontes.
 Cerussam, & chartā, quā gens Aegyptia mittit,
 *Thure simul misceq; oleū, quod flore rosarum *Tunde
 Conditum est: line sic faciē, sic redde salutem.

Cutis & faciei vitijs propellendis.

Inuida si maculet faciē lentigo decoram,
 Nec prodesse valent naturæ dona benignæ,
 Erucam atq; acidum laticem simul illine malis.
 Proderit & bulbus mellis dulcedine victus,
 Cruda'ue dulcacido miscebis rapa liquori.

Sanguis

Sanguine vel leporis morbus delabitur oris.
 Frons salicis cum flore suo contrita medetur.
 *sanant Sepiolæ cineres ex ossibus omnia*tollunt.
 Cygneos adipēs, hilari misceto Lyæo,
 Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.
 Horrebit si liuor atrox, aut nigra cicatrix,
 Attrito saponē genas purgare memento
 Rugarum sulcos lentisci mastice tendens.
 Si verò vitium est quod ducit ab impete nomen,
 Hoc matutina poteris cohibere salina,
 Seu folio platani, quod mansum mane vorabis.
 Fæda fluunt curui quæ purgamenta cameli,
 Vrentur, cineremq; dabunt, iungentur aceto
 Mascula thura simul, diuinaq; cura valebit.

Aurium vitij succurrendis.

C Vm seu uulneras dolor alte sauciat aures,
 Fraxinea in flāmis fundit quæ talea succio
 Instilles, siue obscænos ex virgine rores,
 Aut succum ex folio, dederit quæ populus alba.
 Sæpe chelidonia rapidum sociatur acetum,
 Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.
 Mentastri liquor expressus conducere fertur,
 Infectum violis oleum bene consulit auri.
 Annosa rubros si legeris arbore vermes,
 Ex oleo tere, sic tepidos infunde dolenti.
 *moriēt Si verò obtusa sensus*remoretur in aure,
 Lumbricos terræ, seuumq; ex anserē rauco
 Excoque: sic veterem poteris depellere morbum.
 Felq; bouis surdis etiam prodesse loquuntur,
 Si iun

Si iungas olide graue quod minxere capellæ.
 Si vero* incautus animal penetrauerit aures, *in patu
las
 Proderit admisto pauidi fel muris aceto.
 At si lymphæ nocens peruaserit, anseris aptus
 Immittetur adeps ceparum non sine succo:
 Qui grauis est oculis, sensum tamē auribus auget.
 Vis & Phæbigenæ diuinam discere curam,
 Sitq; vel annosis confecta doloribus auris,
 Allia tum septem numero, septemq; lupinos
 Cretaceam dabis in testam: tum delphica frondis
 Addatur, misto totum feruescat aceto,
 Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

Summa boni est alacres hōi cōtingere visus,
 Quos quasi costodes, defensoresq; pericli
 Prospiciens summa natura locauit in arce:
 Sic tamen vt nullos paterentur desuper ictus,
 Atq; supercilio pauidi tegerentur opaco.
 Sed dolor immeritum lumen si forte laceffit,
 Lana madens oleo noctu connectitur apte,
 Viuentis ve nepæ lumen gestatur amicum.
 Ex folio caulis cineres, confractaq; thura
 Et laticem Bacchi fætæ cum lacte capellæ
 Desuper induces, atq; vna nocte probabis.
 Hyblæi mellis succi cum felle caprino
 Subueniunt oculis dira caligine pressis.
 Vettonicæ mansus siccabit lumina succus.
 Si tenebras oculis obducit pigra senectus,
 Expressæ marathro guttæ cum melle liquenti

Deter

Detergere malum poterunt, vel vulturis atrī
 Fella, chelidoniae fuerint quīs gramina mista,
 Hæc etiam annosis poterunt succurrere morbis.
 Fel quoq; de gallo molitum simplice lymphā
 Exacuet pueros dempta caligine visus.
 Siue columbarum fimus miscetur aceto,
 Seu fel perdicis parili cum pondere mellis.
 Vina Chelidoniae simili ratione iugantur,
 Efficiuntq; suo præclaros vngvine visus.
 Aspera quinetiam mulcent & rupta reducunt.
 Si genas est morbi, miserū quod lumen adurit,
 Hic calor infuso mitescit lacte canino.
 Anguibus ereptos adipēs ærugine misce,
 Hi poterunt ruptas oculorum iungere partes.
 *plūbum Si verò horrēdum ducent glaucomata *peplum,
 Spiritus alterius prodest, qui grana cumini
 Pallentis mandens visus exhalat in ipsos.
 infestat, Si tumor* insolitus typho se tollat inani,
 usos & Turgentes oculos vili circumline cæno.
 discit in
 rbes,

Dentium vitio, & oris fœtori
 medendo.

H Aud facile est acrē dentis tolerare dolorē,
 Quo magis ē equū medicā pnoscere curā.
 Cum Baccho violas decoxeris, ore teneto,
 Mansus item prodest succis oleaster acerbis:
 Hinc oscedo fugit, linguae quoq; vulnera cedunt.
 Cum vino piper & nitro tepidum inde dolenti.
 Sæpe chelidonia succo vel lacte capellæ
 Sanescunt dentes, aut tauri felle iuuantur.

Aut

Aut acidi latices clauso voluntur in ore.
 Manditur apta rubus gingiuis, & bona labris.
 Lentiscus myrtusq; emendant oris odorem.
 Quod verò assumpsit nomen de dente friscando,
 Ceruino ex cornu cinis est, aut ungula porcae
 Torrida, vel cinis ex ouis, sed non sine vino,
 Muricis aut tostis, vel bulbi extincta fauilla.
 Ambitiosa putas, sunt ista salubria cunctis.
 Exesos autem dentes si forte querēs,
 Vre finum muris, patulis & hiatibus adde,
 Vel cinerem dentis ceruini extinguere aceto
 Conuenit, atq; cauis immittere partibus apte.
 Prodest & pulvis lumbrici corpore tosto.
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
 Sæpe etiam gelida gingiuas collue lymphæ,
 Dentibus ut firmum possis seruare vigorem.
 Si verò infandum proserpit ad intima vulnus,
 Permisceto salem parili cum pondere thuris,
 Hinc tractato locū, miram experiere medelam.
 Aut tu sume pilam quæ caudis hæret ouinis:
 Hæc siccata dabit molles, & fracta farinas,
 Huius & attritu tetrum mulcebitur vlcus.

Vux, faucibus, collo, & quæ mollien-
 da sunt, medendis.

A Egrescunt teneræ fauces, cū frigoris atris
 Vis subiit, vel cum ventis agitabilis ær
 Vertitur, atq; ipsas flatus grauis insicit undas:
 Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore
 Planum radit iter. sic est Hortensius olim

Absump

Absumptus causis. etenim confectus agendis
 Obtulit, cum vox domino viuento periret,
 Et nondum extincti moreretur lingua deserti.
 Ergo omni studio quares inhibere dolorem.
 Simplicibus lymphis confunditur aërium mel,
 Additur excussus niuea similagine fursur,
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest
 Vrsino & tauri seuo cerisq; remissis,
 Omnia quæ geminis æquabis lancibus antè.
 Disce etiã miram ex humili medicamine curã.
 Acliaco melli iungas agreste papauer.
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; vorabis.
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur,
 Hinc aqua non feruens voluatur fauce sonora,
 Nec tamẽ in stomachũ descendat gutta patentẽ.
 Si verò adflictam langor deiecerit ruam,
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento,
 Aut illam puluis tostus releuabit anethi,
 Aut cinis ex cochlea, vel torrida brassica flãmis.
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum,
 Quod refert clauso versatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT si ceruices, duratq; colla rigeant,
 Mira loquar, geminus mulcebit vnguine
 Hic longũ pariter nervos medicina seq̃t, (poples,
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis.
 Illinitur valido multum lens cocta in aceto,
 Aut capræ simus, et bulbi, aut ceruina medulla,
 Hoc

Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.
Quos autem vocitant tolles, attingere dextra
Debebis, qua Gryllus erit pressante peremptus.

Tussi, & cholericis medendis.

NOxia si penitus cholerum seuire venena
Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.

Proderit & caules assumere sæpe madentes.

Interdum fauces tussi quatiuntur atroci,

Alliatum sumes decocta, & melle peruncta,

Semina vel raphani permisto dulcia melle.

Aut si fraxinea semen de fronde reuellis,

* Interiora vora vetitus contingere dcnte.

* Integrio

Ouum melle teres domitum feruentibus vndis, ra

Marrubiiue potēs, hæc faucibus optima sumes,

Franabisq; gravem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho medendo.

Qui stomachum regem totius corporis esse
Contendunt, vera niti ratione videntur.

Huius enim validus firmat tenor omnia mēbra:

At contrā eiusdem franguntur cuncta dolore.

Quin etiam (nisi cura iuuat) vitare cerebrum

Fertur, & integros illinc auertere sensus.

Lactucæ semen nigræ quod lignea pila

Triuerit, admisto ieiunus sumito melle,

Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit vno,

Aut tritum semen raphani, mulsumq; iuuabit:

Sive duæ partes absynthi, & tertia rutæ

Decoctis potantur aquis, siliquæq; madentes,

Semina vel marathri foeta cum lacte capellæ.

M

Puleg

Pulegium quoq; decoctum curabit amicè.
 Et potu, & fotu stomacho conducit acetum.
 Seu cochleas vndis calefactas ac propè vietas
 Suppositis torre prunis, vinoq; garoq;
 Perfusas cape, sed prodest magis esse marinas.
 At male digestis si crapula scuiet escis,
 Ex pipere, & calida florem de rore marino
 Ebibe, seu salibus piper adde, & tenue cumini.

*tanges Quæ coctis*tinges epulis, & rapta vorabis.
 *aceti Aut cubitum pergens succū cape tristis*anethi.
 Ventriculis mergi raptus sal tritus & vstus
 Tosto pane super, piperis quoq; puluere multo
 Miscentur, capies diuinum munus in istis.
 Proderit hoc stomacho, vietas & cōcoquet escas,
 Grana peregrini piperis diffindito quinq;
 Niliaco melli, quæ mane inserta capeffes.

Felli, vomitui, vel phthisi arcendis.

L Vtea si crescunt, & cunctis noxia fella,
 Allia parua nouē, piperis tot pmole grana,
 Quæ cyatho diluta gari mandesq; bibesq;.
 Hæc iterum septena capis, post deniq; quina.
 Præterea caules, frondet si parua sabucus,
 Decoctos sale permisces, ac iungis oliuo.
 Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.
 Profunt & pelagi latices, quos pondere iusto
 Dulcibus associas lymphis, melliq; liquenti.
 Et niuens prodest ex vbere succus asellæ,
 vinum Si tepido vino infundas, ac mella piperq;.
 At vomitum radix narcissi pota mouebit.
 Si verò phthisis annoso sedet improba morbo,

Intritas

Intritas vino cochleas hausisse iuuabit.
 Proderit & veteris seui pila sumpta suilli.
 Carne asina seuoq; caprae medicina salubris.

Mammis sanandis, vel stringendis.

V Bera foecundo multum lactantia succo
 Sepe sibi noxae nimium manando fuerunt:

Fece igitur valida duri reprimuntur aceti.

Post partu tumidas iniuste assurgere mammas

Interdum aspicias, harum mala commemoratur

Murinus finus ex pluuiio sedare liquore.

Sin autem clausas penitus dolor angit acerbus,

Lumbricis terrae turgentes vnge corymbos.

Si castigatas studium est prestare papillas,

Ex hedera fertis ambas redimire memento

Protinus, & raptas fumis mandare coronas,

Anseris aut seuum pariter cum lacte tepenti,

Aut ouum* illinito tulerit quod garrula perdix. *alias, in

Præterea pluuiio decocta papauera rore

positum

Hærescunt multis post* dissoluenda diebus.

*absoluen

Vis & Phœbigenæ cælestia sumere dona,

da

Vbera cum tetris laniata doloribus*horrent?

*urgent

Naui rametū, et quæ nomine præstion herba est,

Et quæ vulgari sermone Insana vocatur,

Græcos hyoscyamon propria scito dicere lingua,

Nec non & calami radix, lapathiq; legumen

Mista dabunt miras (experto crede) medelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis

*restringendæ.

*abstinen

SI stomachus nondum cōcoctas expuit escas, da.

Et magis atq; magis vitium* reuomendo ualescit, *recolendo

M 2

Allia

Allia cedemus, crebrumq; trahemus odorem.
fertur de Sin etiam rutulus confertur pectore sanguis,*
Sorbitium mentæ, raphanus vel cocta iuuabit.
Sæpe lapis teritur (Specularem nomine dicunt)
Et mistis hauritur aquis, sistitq; cruorem.
robore Vritur interdum raptus de subere cortex,*
Et cinis ex calido prodest epota Lyæo,
*pellis Onorum cinis, aut cochlearum, aut deniq; *melis,*
** Aut ci- * Aut mansus salicum fructus prodesse putatur,*
is salicū Aut platani pilulis acri infundemus aceto,
amis Nullus erit sanguis, quæ non cibus iste moretur.

Iecoris, & lateris vitijis medendis.

Ελελίσ- S I molles iecoris fibras dolor hauriet acer,
** φανθ Protin' ex malsa potada elelispacus herba*
** salua. Sumitur et semē, qd' fraxinus alta pfudit, (est:*
Vulturis atq; iecur vel ius perdicis apricæ.
Præterea simili drachma pix dura piperq;
Franguntur, sic in mollito puluere iuncta
Egelidis miscentur aquis, recreantq; bibentem.
Absynthi quoq; decocti potabitur humor,
Si latus immeritum morbo tentatur acuto,
Accensum tinges lapidem stridentibus vndis,
Hinc bibis, aut aceris radicem tundis, & vnâ
Cum vino capis, hoc præsens medicamē habetur.
** cilonia Quid referam multis composta * Philonia rebus?*
Quid loquar antidotū uarijs? quis ista requirat?
At nos pauperibus præcepta feramus amica.
Nec non & iecoris quæretur fibra lupini,
Iungenturq; simul costum, foliumq; piperq;
Quæ diluta mero dantur potanda Lyæo.

Est

Est & vis morbi, quod telum commemoratur,
 Cum subito dolor insanus furit incitus ictu,
 Persicon huic potum è nuce traditur interiore,
 Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.

Spleni curando.

Q Vado lien tumido circūligat ilia uinclo,
 Et plenū splenis demonstrat mēbra rigore,
 Mollibus ex hedera tornantur pocula lignis,
 Hinc trahet assuetos ager quoscunq; liquores,
 Aut viridis coctorum holerum potabitur vnda.
 Proderit exusto fluuiialis hirudo cruore,
 Siue myrica potens, seu ros cum pane marinus,
 Aut hederae succus potu appositusq; iuuabit.
 Nec non intactam ferro quam videris alnum,
 Huic liber eripitur ferro sine, decoquiturq;,
 Donec victarum pars tertia subsit aquarum.
 Hinc medico potus pulsus dolor omnis abibit.
 Nonnulli memorant consumi posse lienem,
 Eruum si semper ieiuno sumpserit ore.
 Arida ficus item feruente domatur aceto,
 Et trita illinitur, vel splen apponitur hædi.
 Marrubium in vino potum prodesse loquuntur,
 Præterea piper, ac nepetæ cum flore et anethum,
 Capparis atq; apium, buglossaq; iungitur vnâ:
 Horum decoctos latices potare salubre est.
 Pulegium, abrotonū nitida cum mastiche coctum
 Ac thymbræ speciē (quam cōmemorat cephalotē)
 Predixit spleni Deus Idæ posse mederi.
 Dulcia, Plautus ait, grandi minus apta lieni.
 Splen tumidus nocet, et risum tamē addit ineptū,

Vt mihi sardois videatur proximus herbis,
 Irrita quæ miseris permiscet gaudia fati.
 Dicitur exectus faciles auferre cachinnos,
 Perpetuoq; auo frontem præstare seueram.

Præcordijs sanandis.

L Anguida si duro turgēt præcordia morbo,
 Miscetur mulsæ farris sextarius vnus,
 Nec non & lini tunsum, siliquaq; legumen.
 Hæc decocta simul, nondumq; tepentia neçles.
 Aut quæ poma Cydon Cretæis misit ab oris
 *teres Cocta*lines, durum vt possis mollire tumorem.
 Ocyma præterea, bulbi'ue linuntur amari.
 Proderit & lymphis corpus mersare marinis.
 * Quin etiam catulum lactantē apponere membris
 Conuenit, omne malū transcurrere fertur in illū.
 Cui tamen extincto munus debetur humandi.
 Humanos quoq; contactus mala tanta sequuntur,
 Et iunctus vitium ducit de coniuge coniunx.
 trite iun Quod superest*thridaci iunges ramenta carinae,
 es Quod decem ex rebus*confit simul atq; uocatur,
 decator- Mastichis addentur fractæ iam mollia farra.
 homa ri- Talibus auxilijs præcordia tuta resident.

e uocatur

Lumbis, & renibus sanandis.

C Vm seuit penitis hærens iniuria lumbi,
 Igne lapis candēs datur exultatibus undis,
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem,
 Aut pice cum melli nitrum sulphurq; et acetum
 Succida lana rapit contacta calentibus ijsdem,
 Proderit hanc ægris crebro perducere membris.
 Aut caput asparagi cum vino sume vetusto,

Sen

Seu maui appone, modus conducit vterq;
 Aut adipi mistum lumbis inducito sulphur.
 Sæpe chelidoniam cum succo Palladis addes,
 Farraq; quæ tremulis prosunt sudantia flammis.
 Fertur amygdalinæ succus nucis esse bibendus:
 Pinsitur, ac tepidis sorbebitur addita lymphis.
 Aut tres ex vino cochleas feruescere coges,
 Cumq; suis domibus franges, piperis quoq; grana
 Ter quinq; adijcias, potuq; iuuaberis illo.
 Furfur item parca fuerit cum feruidus vnda,
 Post oleo madidus* succis immittitur aptis, *saccis
 Quæ vix passuris* vrentes addito membris. *vrenti
 Prodest ceruinæ* vehemens natura medullæ, iungito
 Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem: *medic
 Aut mistam teneris* maluâ contundito porris, *madi-
 Contritumq; simul cum mastiche cõfer anethum, damq; e
 Quodq; decẽ rebus componi ex nomine clarũ est, lissphaco
 His cõtinge locũ. Deus hæc mihi certa probauit. vndis

Ventris dolori mitigando.

SI dolor insanus tota desinit in aluo,
 Heminiis tribus in lymphæ tu decoque tritũ,
 In vino prius hyssopum, validam quoq; rutam,
 * Aut apium, donec pars duplex desit aquarum. * Atq;
 Potus erit medicus non detractante palato.
 Præterea niuei sterilis tostata vritur oui.
 Quæ postquam in tetrâ fuerit conuersa farinam,
 Ex calidis potatur aquis, & pota medetur.
 Nec non iungenda est vtero noua virga myricæ,
 Illæsa hæc ferro terraq; intacta teratur.
 Aut medio ventris prodest aspergere terram,

M 4

Quam

Quam signauerunt vestigia pressa rotarum.
 Proderit & puluis facili sub cardine raptus.
 Quin etiam ex lymphis tritum potare cuminum
 Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.
 Menta quoq; hoc pacto medicos dabit hausta sa-
 Cœliacos autē recreabis pane salubri, (pores.
 Quem madido farre efficies, ac mollibus ouis:
 Quorum testa fero prius euanescere aceto
 Refert, & teretes bulbos mollire terendo,
 Cumq; his Lenæi durum potare fluentum.

Hydropisi depellende.

Corrupti iecoris vitio, vel splenis, acerbus
 Crescit hydrops, aut cū siccata febre medul-
 Atq; auidæ fauces gelidū traxere liquorē, (le
 Tum lymphæ interius vitio gliscente tumescit,
 Secernens miseram proprio de viscere pellem.
 Conueniet teneræ radix decocta sabuci
 In geminis calidi cyathis potanda Lyæi.
 Nec non & tepidis conuolues corpus arenis.
 Apposituq; lenes nepetæ, gustuq; iuuabunt.
 Helleboro quoq; purgatur lymphaticus error.
 Aut huius vice quod fert semen lenta genista
 Miscetur, mulsis & cautis ducitur undis.
 Sæpe & scyllino pelluntur noxia Baccho.

nitro Est qui præualidum frixo sale miscet acetum.

turgētia Atq; olei succo refricant albentia membra.

Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendū est.

Nec non apposito curantur dropace membra,

filicis Aut calido salicis radicem mollit laccho,

Qui subito raptos ventos, succosq; reuellit.

Vngvine

Vinguine quo frangit vires languoris aquosi.

Ventri molliendo.

Saepe cibi specie, vitio vel corporis ipso,
Potibus aut duris restricta morabitur aluus.

Specie, id
est quali-
tate.

Vincetur talis mora gramine Mercuriali,

Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.

Prunaq; conueniunt, quæ mittit clara Damascus.

Multos præterea medici componere succos

Assuerunt: pretiosa tamen cum veneris emptum

Fallêris, frustra; immensa nomismata fundes.

Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.

Aut igitur tectum lana supponis alumen,

Aut edis in patinis teneræ decocta sabuci,

Vel cum lacte capræ salsum mulsumq; capeffes.

Crede tamen potum meliorem lactis equini.

Dicitur hic validos asinæ peruincere succos.

Syluestris fici lacrymam prodesse loquuntur.

Quodq; satis melius verbis dicemus Horati

Mugilis, & viles pellent obstantia conchæ.

Sed cochleæ prius est vrtica aut fursure pasci,

Purior hinc gustus noxa sine mouerit aluum.

Sæpe thalassomeli* inctum cumulauius hymbri, *adiecto

Hæc purgant, parili fuerint si pondere mista.

Solutioni ventris, & dysenterię
compescendę.

Tam varij casus mortalia secla fatigant,

Vt sint diuersis obnoxia corpora morbis.

Sæpe etenim nimio cursus fluit impetus alui,

Frenat commisto cum feruet brassica vino.

Aut cerasi victum longo iam tempore pomum,

M S Succus

Succus aminæ vitis cum pane medetur,
 Vel bene permistum calida potatur acetum.
 Vile quidem, facile factu, tamen utile opinor.
 Si ledunt medica data purgatoria dextra,
 Adiecto piperis medicatur puluere calda.
 Sin autem longo decurrent intima fluxu,
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,
 Torridus ex vino cortex potabitur oui.
 Ramentum niuei credunt prodesse elephantis.
 Arbore Pyramea cortex direpta coquetur
 Axe sub æthereo, sic nigro mista Lyæo
 Immensum poterit potu retinere fluorem.
 Numinis aut iussu cedrum cum mastiche misces,
 Mollitamq; picē, & rasum de nauibus vnguen,
 Languida quo fidens medicamine mēbra fouebis.
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat,
 Castaneas coxisse nuces, & sorba vetusta,
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta,
 Potio quæ fluidam consumpta morabitur aluum.

Lumbricis & tineis purgandis.

Quid nō aduersum miseris mortalib. addit
 Natura, interno cū uiscere tinea serpens,
 Et lumbricus edax uiuant inimica creanti?
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret,
 Obsessasq; vias vitæ concludit anhele.
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus,
 Vel nepetæ tritum ex vino vel lacte capellæ,
 Nec non & succus medici potatur aceti.
 Prodest præterea cum Baccho persica frondis.

Democ

Democritus memorat mente conducere potum.
 Sumitur abrotonum, necnon et vile melanthum.
 Allia per sese sanant, aut ius coriandri.
 Quin & marrubiū decoctū haustumq; iuuabit,
 Pulegium'ue potens, & agreste iugatur anethū,
 Synthesis hæc prodest vnda mollita calenti.

Colo sedando.

CUm colus inuisū morbi genus itima carpit,
 Mande galeritā volucrē quā noīe dicunt,
 Aut pauidi leporis madesacta coagula pota.
 Sine apio nepetas tereti cum mastiche iunges,
 Nec non & species ambas redolentis anethi,
 Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesicæ, & calculo purgando, & vrinæ
 prouocandæ.

SI cui vesicæ tardus cunctabitur humor,
 Hæc mora rumpetur vino peruicta uetusto,
 Prodest ex paruis acinos potare sabucis,
 Aut hedere succum, aut lacrymosi trita sinapis.
 Nec non resinas ex oricia terebintho
 In speciem eruiliæ paruos glomerabis in orbes,
 Quos ternos tepida mistos hausisse medela est.
 Quondam etiam nimio præceps vrina fluento
 Irrigat exuias, obscænoq; inficit hymbri:
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus.
 Vel nepetæ ex vino tritum vel lacte capellæ.
 Tum leporis cerebrum ex vino potare* decebit. *iuuabit
 Si dolor internam vesicæ concoquit aluum,
 Subueniet radix frondosa epota cypressi,
 Pulegium'ue potens domitū feruentibus vndis.

Si

Si vero in lapides densus conuertitur humor,
 Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequētat,
 Sphōgitē Saxifragam seu*fontigenā succurrere credunt.
 Praterea semen myrti syluestris Iaccho,
 Atq; oleo mistum bibitur, nec desit acetum,
 Vinaq; sumantur fricto condita cumino,
 Siue palumborum capitur finus acre ferorum
 Dulcacidis sparsum succis trituq; solutum,
 Necnon obscænus capræ potabitur humor.
 Obruit hic morbum, labefactaq; saxa remittit.

Conceptioni, & Partui.

IRrita coniugij sterilis si muncra languent,
 Et sobolis spes est, multos iam vana p̄ annos,
 Fæmineo fiat vitio res, nec'ne, silebo:
 Hoc poterit quartus magni monstrare Lucreti.
 Sed natura tamen medicamine victa potenti
 Sæpe dedit foetus studio curante paratos.
 Aut igitur leporis consumit fœmina vuluam,
 Aut ouis in stabulis fractas cū ruminat herbas,
 Pendentem spumam molli deducit ab ore,
 Atq; illam meminit misto potare falerno.
 Mercurialis item capitur communiter herba:
 Sic cubitum noctu coniunx festinet vterq;.
 Atq; vbi iam certum spōdet prægnatio foetus,
 Ut facili vigeat seruata puerpera partu,

Qui, suban
 ti partus.

* Pulegio

admixto ve

nit em -

ryo nect

ceto.

Dictamum bibitur, cochleæ manduntur edules,
 At qui olim mēses minus octo moratus in aluo,
 Irrumpit thalamos, & nexus soluit inertes.
 *Pulegij quoq; purgati tunc conuenit hymbes,
 Cuius opem veram casus mihi sæpe probarunt.

Quin

Quinetiam stercus supponunt vulturis atri,
 Sētiat ut minime partus quā proximus vrget. Sētiat, sul
 Oua etiam rutæ & fragili miscentur anetho, audi fœm
 Quæ diluta simul vino, atq; exhausta medentur. na.

Profluuium cuiusq; sanguinis, & ma-
 trici subueniendæ.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis,
 Subuenit: at nimius cū vita funditur ipsa.
 Quapropter multo naris completa cruore
 Cum fluit, attritus cimex conducit odore.
 Lana oleo madefit, sed nondum lauta rosato,
 Hæc datur in nares, vel claudet densius aures.
 Contritis prodest cochleis * perducere frontem, * obduce.
 Aut galli cerebro, vel sanguine tinge columbæ. re
 Quod nisi supprimit sanguis, potādus et ipse est.
 Præterea Pharijs caput emetire papyris.
 Detrahe quod superest, aliò genitalia necte.
 Fæmineas prodest illinc vincire mamillas,
 Menstruus immenso si profluit impete sanguis.
 Succida lana malos remoratur subdita cursus,
 Mortua quinetiam producit corpora partu.
 Sed quacumq; fluit vis immoderata cruoris,
 * Subereus cortex calidis potatur in vndis * Suber-
 Antè minutatim studio vincente terendus. nus
 Pulegij calido purgatur fœmina potu.
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcūq; bibentur,
 Aut si puniceos fundit vesica liquores,
 Marrubium ex passo tritum persunditur vndis,
 Hi poterunt haustus rutilum purgare colorem.

Relliq

dictami Reliquias partus * eadem tibi detrahit herba.
 etr. Quod si faeminei properabit sanguinis humber,
 Est qui frustra mole percussu decutit vno,
 Quorum aliquot lanis tectum ad praecordia necit,
 Hec simul incantans sisti debere cruorem,
 Ut lapis ille viae solitos iam destitit orbes.

Interneccandis, quae oculos impediunt.

Mobilis hirsutas horret lasciua setas,
 Et gaudet raptu nudari flore pilorum.
 Sed bona nonnunquam vellendi causa videtur,
 Corpora cum releuat, ratio manifesta salutis.
 Namque oculos infesta pilorum tela laceffunt,
 Quodque illis dederat vallum natura tuendis,
 Inde inimica seges proprios desecuit in orbes.

Ergo locum crinis vulsi continge cruore,
 Quae dat aus, tremulis simulat quae pellibus alas.

Procre- Obduce. Præterea quascunque voles auertere setas,
 Atque in perpetuum rediuvina* occludere tela,
 Corporibus vulsis saniem perducito rane,
 Sed quae parva sita est, et rauco garrula questu.
 Necnon quae stagnis cessantibus haesit hirudo
 Sumitur, et vivens samia torretur in olla,
 Hac acidis iungit permixta liquoribus artus,
 Avulsamque vetat rursus* percreescere sylvam.

Omnibus obscenis medendis.

Dicendum, et quae sit membris medicina pudenda.
 Languidus antiquo purgat penis Iaccho,
 Ac super illinitur faecundae felle capellae.
 Mane nouo myrti frondes commandere prodest
 Cui dolet, atque illas in vulnus despuat ipsum.

Feco

Ecce etiam vini genitalia lauta leuantur,
 Et tumidos testes nereia lymphæ coërcet,
 Vel bulbi ex mulso, vel cæra immista cupresso.
 Aut faba cum tepidis Bacchi decocta fluentis.
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem
 Far madidum lymphæ, et ferali fronde cupressi,
 Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.
 Sin autem existit durum tibi glandibus inguen,
 Proderit induci cochleas cum melle minutas.
 Obscenos si pone locos noua vulnera carpent,
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum.
 At si iam veteri succedit fistula morbo,
 Mustele cinere immisso purgabitur vlcus,
 Sanguine seu ricini quem bos gestauerit antè.
 Herba chelidonie fertur cum melle mederi,
 Herbaq; cum seuo folijs de mille vocata.

Ischiæ, & articulari morbo.

Sæpius occultus victa coxendice morbus
 Perfurit, & gressus diro languore moratur,
 Populus alba dabit medicos de cortice potus,
 Necnon & teneræ gracili de fronde geniste.
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes
 Sumere conueniet, rubiam quoq; ducere potu,
 Aut in * amineo cochleas haurire Lyæo.
 Si verò articulos tabes inimica per omnes
 Haferit, ex ficu betas ac melle ligabis,
 Vel pelagi latices simul & baccheia dona
 Sumere curabis, nimio sed parcito vino.
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,
 Hoc vitio tales fertur meruisse dolores.

* aliàs,
 Bithynæ
 vel, irino

Furunc

Furunculo medendo.

CVm sanguis nimius puri cōmistus atroci
Aestuat, & papulas altè sustollit acutas,
Resinam misces, & saxis ordea fracta.

Consersa hæc tepidis apponere conuenit vndis.

* hyoscyamum caræ seuoq; iugatum
ni semen Nescere, nō minus hæc poterit medicina iuuare.

* euumq; Prætereaq; finum ex gallo quod legeris albo.
Hymbribus ex acidis fidens appone dolenti.
Auribus aut pecudum molles expromito sordes,
Vngvine quo fotis dabitur medicina papillis.

* tollendo

Carboni * medendo.

HOrrēdus magis est, pimit q corpora, carbo:
Vrit hic inclusus, vitalia rumpit acerbus:
Hunc veteres quōdam varijs pepulere medelis:
Tertia nanq; Titi simul & centesima Liui
Charta docet ferro talem candente dolorem
Exectum, aut poto raporum semine pulsum:
Infecti dicens vix septem posse diebus
Vitam produci: tanta est violentia morbi.

* laticem Dulcacidum * laticemq; cumini semine iunges,
cum lini Atq; finum pariter Paphiæ compone columbæ.
Hinc line diruptis partes, & clausa venena.

* adoper- Præterea triti referant * & operta lupini.
ta Nonnullus calcem viuam dissoluit aceto,
Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.
Est qui gallinæ perducit stercore corpus.
Allia vel piperi parce commista linuntur
Pythagoræ cognata leui condita cumino.
Proderit & madida fermentū polline turgens.

Pani,

Pani, vomica, & strumæ depellendis.

561

Sunt alij quos dura^{*} mouet natura tumores ^{*vomit}
Non minus horrendi, sed non ita perniciosi.
Vomica qualis erit, vel eidem proxima quedam:
Simplice resina miscebimus hordea tusa,
Et mulso amnes, & purgamenta columbæ,
His bene decoctis languentia membra fouentur.
Mollis odorato faba iungatur coriandro.
Proderit appositum, mollitq; aperitq; tumorem.
Aut de phasgano radix decocta palustri,
Quæ salis admisto tundetur condimento.
Proderit & māsūm quod traxeris arbore visci.
Gramen hyoscyami cære seuoq; vetusto
Concilia, mistisq; locos perduce dolentes.
Exercere etiam corpus medicina potens est.
Ouum defundes in fictile, deinde putamen
Marrubij succo implebis, post melle liquenti
Omnia consociata tepenti prospera potu
Sumuntur, reserantq; malum purgantq; leuantq;.

Igni sacro demouendo.

Est etiam morbi species, quæ dicitur ignis, ^{ἔγυσι πῆλα}
Laguida quo multo torretur mēbra calore, ^{Græcis dicitur,}
Vel tu vicino seuum bouis igne remittis, ^{vulgo}
Mollitumq; lines, vel oloris fecibus oua, ^{ignis dicitur}
Sed non cocta dabis, sic torrida membra fouebis. ^{Antonij.}
Lumbricus terræ misto inducetur aceto, ^{Fecibus, id est,}
Aut parili noua ruta modo, sed iungis oliuum, ^{excrementis, siue}
Ouaq; cum betis prosunt saepe illita tritu, ^{pinguibus}
Allia dant cinerem sociato oleoq; garoq; ^{hoc est ad}
Vngvine quo gliscens deponet flamma furorem, ^{pe.}

N

Sape

Sæpe chelidonia pars candida iungitur oui.
 Quæ modico potu sed vili trita capeßes,
 Admiscere memor lymphas amnemq; falerni.

Podagræ depellende.

trigemi
 as **Q**uædã int̃ rabidæ medicamina digna poda
 Cui ter^{*}tricenâs spēs Epidauri^o ip̃e (græ,
 Dixit inesse deus, requiem tamen indere morbo
 Fas erit, & tristem saltem mulcere dolorem.
 Ergo age & arreptũ salicis frondemq; librumq;
 Cum vino tere, sic contractos perline nervos.
 Aut cum prima mali sese ostentabit origo,
 Feruida non timidis tolera cauteria plantis,
 Seminecis'ue hirci reßerato pectore calces
 Insere, sic diræ reprimes primordia pestis.
 Aut si corruptus persederit altius humor,
 Trita cupressus ibi Baccho iungetur acerbo
 Panibus & teneris, cohibebitq; addita quæstus
 Parua sabucus item hircino collita seuo,
 Triticeaq; acido manantes amne farine,
 Aut nitidum ranæ decoctum viscus oliuo,
 Sive chelidoniæ succus sale mistus aceto.
 Sunt quibus apposita siccatur hirūdine sanguis.
 Non audita mihi sit fās, sed lecta referre,
 * rabidus Hoc quidam * raptus morbo per tempora messis
 *mersit Vicino plantas frumenti * pressit acerus,
 Vide Plin. Euasitq; grauem casu medicante dolorem.
 lib. 22, cap.

Vulneribus ferro, aut verberibus factis.

Natura vitij medicas obiecimur artes,
 Nunc & fortune iaculis obsistere par est.
 Si cui forte lapis teneros violauerit artus,

Necte

Nec te adipēs vetulos & tritam chamæcisson,
 Nec pudeat luteæ sterco perducere porcæ.
 Sin autem sæuo laceratum est verberare corpus,
 Tum lixiua cinis ceras dissoluit & ova,
 Admixtoq; oleo vibices comprimit atras.
 Si verò infrænus manat de vulnere sanguis,
 Purpura torretur conchyli perlita * succo,
 Huius & atra cinis currentem detinet vndam.
 Verrucæ quoq; desectæ frænare cruorem
 Dicitur ambustus tyrio de vellere pulvis:
 Præterea nimios reserati vulneris amnes
 Peniculi cinis astringit vel fimbria porri.
 Siue fimus manni cum testis vritur oui,
 Et reprimat fluidos miro medicamine cursus.

Vulneribus quibuscunque casibus factis.

TAm varia humane sūt vulnera cōditiōis,
 Ut nequeā proprias cūctis ascribere curas.
 Iisdem igitur monitis casus* armabimus omnes, * sanabi-
 Sic tamen vt nullus medicinam clausit error. mus
 Ergo modus quicunq; obtingit vulneris atri,
 Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:
 Herbaq; quæ folijs nomen de mille recepit,
 Apposita prodest adipi permixta vetusto.
 Succida cum tepido neclitur lana Lyæo.
 Ambustæ uel cinis complebit vulneris ora.
 Concludit verò vel frons vel ramus ab ulmo,
 * At succis hederæ pulchrescit fæda cicatrix. * vt

Hominis ac Simiæ morsui.

Siue homo, seu similis turpissima bestia nobis
 Vulnera dēte dedit, virus simul intulit atrū,

*puro *Betonica* ex *duro prodest assumere *Baccho*.
Necnon & *raphani* cortex decocta medetur,
 Si trita admorsis fuerit circumlita membris.

*venenis

Serpentium moribus, & * viperinis
 excludendis

Cuspide nō quisquā lōge neq; cæde carissæ,
 Fulmiē nō gladij, volucris nec felle sagittæ
 Quam cito vipereo potis est affligier iclu.
 Quare aptam dicamus opem, succosq; medētes.
 Quem nocuit serpens, fertur caput illius apte
 Vulneribus iungi, sanat quem sauciat ipsa:
 Utq; Larissæa curatus *Telephus* hastæ.
 Proderit & caulem cum vino haurire sabuci,
 Aut coctum *raphani* librum tritumq; ligare,
 Siue etiam excelsa folium de mole cupressi,
 Aut *tithymallus* atrox vulnus cōtrita pungit.
 Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
 Ex illo radix tepido potatur in amni.
 Ceruino ex fœtu commistæ coagula vino
 Sumuntur, quæ res membris agit atra venena.
 Aut ferulæ radix potatur in hymbre *Lyei*
Betonica ue leues, gallinæ aut iura vetustæ.
 Si verò horrendum vulnus fera fecerit aspis,
 Urinam credunt propriam conducere potu,
Varronis fuit ista senis sententia: necnon
 (Plinius vt memorat) sūpti iuuat hymbre aceti.
 Dicendū, et quæ sit præcox medicina timēti,
 Cautio: nanq; potest diros præuerrere morsus,
 Si iecur exectum tardo de vulture portes.
 Erucis aut si totos perduxeris artus,

Plin. 28.
 cap. 6.

Qu. 15

Quas prius attritas vehementi spargis aceto.
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiesces,
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxicæ præterea qua sint pellenda medela,
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus,
 Qui facili potu antidotos imitatur honestas.
 Vis & mirificos cautus prædiscere odores,
 Accensis quibus arcetur teterrima serpens,
 Aut styracem torres, aut diri vulturis alam,
 Vel nepetâ, aut frondē rigida stirpemq; myricæ.

Ictibus Scorpii, & moribus Muris
 cæci, vel Aranci.

Sunt minimæ species, sed diræ vulnere pestes,
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallât,
 Scorpius ut grauis est et araneus, hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus Orion,
 Magna quod exiguis perimatur* sepe venenis. *membræ
 Et quum vulnus atrox incussit scorpius ardēs,
 Continuò capitur, tunc digna cæde retusus,
 Vulneribusq; aptus, fertur reuocare venenum.
 Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur,
 Sine meri potu dissoluitur improba pestis.
 Ad cunctos autem morsus ictusq; minorum
 Caseus aptus erit *simæ de lacte capellæ, *pauide
 Cumq; hoc absumi debet origanus herba:
 Hæc duo mirificis curabunt icta medelis.
 Necnon *peniculo calidum annectetur acetum, *fœnicu
 Aut viuum sulphur sicci cum fece Lyæi. lo
 Exiguo piperis cerebrum conspergito *galli, *melis

Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit violentia cæci,
 Quæ sola signauit voluendis orbita plaustis,
 Illinc, mira datur vili de puluere cura.

Subitaneo dolori, feбри, atque
 ostocopo.

N Onniquā existit subiti noua causa doloris
 Cuius origo latet, veris reprimēda medelis.
 Nanq; chelidoniam misto sale nectere prodest,
 Velleraq; infuso recalentia sulphure sanant.
 Ostocopon lento conducit melle perungi.
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,
 Tunc apij succus leni sociatur oliuo.
 Membra lines, fotuq; ferus mulcebitur ignis.
 Nec spernendus adeps, dederit quē bestia melis.
 Seminecis cerui lacrymam miscere liquori
 Conuenit, atq; artus illinc mulcere* calentes:
 Sic lacerat morbum, bilemq; reuoluit in aluum.
 Præterea chymum stomacho desiccatur iniquum,
 Quæ magis atq; magis promittūt corpora claudi.
 Febribus aut longis galli noua iura vetusti
 Subueniunt, etiā tremulis medicantia membris.

Quartanae typo medicando.

N Ec tu crede leuem dilato tēpore febrem,
 Quæ spatium sibi dat, magis vt cessando
 Letali quæ grassatur quartana calore, (calescat,
 discam^o Ni medicas adhibere manus* curem^o et herbas.
 Allia non pudeat terno cum cimice trita,
 Et diluta mero medijs haurire diebus.
 Aut facilem iecoris murini ducere fibram,

Quat

Quattuor ut duri iungantur scrupula Bacchi.
 Mira est absynthi cum simplice potio lymphæ.
 Sume tribus digitis apprensus semen anethi,
 Tantundem marathri, mulsum nec desit aceti,
 In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.
 Meonie Iliados quartum suppose timenti.
 Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
 Prodest et potus, * sed mulsum doridis humor. * vel
 Quidam etiam miranda ferunt veniente calore,
 Iurantes ludum Veneris munusq; petendum.
 Sed prius est oleo partus feruescere ranæ,
 In triujs, illoq; artus perducere succo.

Tertianæ typo medicando.

Est etiam alternis febris rediuiua diebus,
 Tēpora discernēs quasi iustæ pōdera libræ.
 Ut possis igitur talem prohibere furorem,
 Inuolues cæra pallentis grana cumini,
 Puniceaq; indes pelli, colloq; ligabis.
 Pulegij ramus lanæ velatus amictu
 Tempore suspecto medicos præbebit odores.
 Præterea tritus cimex potatur in ouo
 Horridus attractu, sed gustu commodus apto.

Puniceæ
 pelli, hoc
 est, malic
 rio, quæ
 testa ē ma
 li punici.

Quotidianæ typo medicando.

At qui continuis non cessat adire diebus,
 Sed tātū certas morbo discriminat horas,
 Triticeum metuit granū (si credere dignum est)
 Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum,
 Nec non ossa iuuant septis inuenta domorum.
 Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.
 Multaq; præterea verborum monstra silebo:

N 4 Nam

Nam febrem vario depelli carmine posse
Vana superstitio credit, tremulaq; parentes.

Hemitritæo depellendo.

Agēs hoc
idē licet
modo, atq;
ordine:

abracadabra
abracadabr
abracadab
abracada
abracad
abrac
abrac
abra
abr
ab
a

Mortiferū magis est, qđ Gracis hemitritæū
Vulgatur verbis, hoc nostra dicere lingua
Non potuere vlli, puto, nec voluere parentes.
Inscribis chartæ, qđ dicitur Abracadabra,
Sæpius, & subter repetis, sed detrahe summā,
Et magis atq; magis desint elementa figuris
Singula, quæ semper rapies, & cætera figes,
Donec in angustum redigatur littera conum.
His lino nexis collum redimire memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.
Coralium atq; crocum corio connectito felis,
Coralium verò si collonectere velles,
Nec dubites illis virides miscere smaragdos.
Talia languenti conducent vincula collo,
Letalesq; abigent (mirāda potentia) morbos.

Fracturis, & luxis sanandis.

Infandum dictu cunctis procul absit amicis,
Sed Fortuna potens omen cōuertat in hostes.
Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis,
Lintea deinde superq; inductasnectere lanas.
Sæpius & succos conspergere pinguis oliui,
Bis septem credunt coalesceere cuncta diebus.
Aut veteri Baccho capræ fimus inde petulcæ,
Hoc aperit clausum, trahit herens, sanat apertū.
Si verò caput infestus colliserit ictus,
Ex oleo necti vestis debet arachnes,

Nesciet

Nesciet hæc illinc (nisi cum sanarit) abire.
 Quod si luxa suo decedant membra tenore,
 Vrere fœmineos crines, ac iungere seuum
 Congruet, ac tali medicamine mota ligare.
 Aut malum ex pingui tritū apposuisse iuuabit.
 Aut si conclusum seruauit tibia vulnus,
 Stercus ouis placidæ iunges adipēsque vetustos,
 Pandere quæ poterunt ulcus, patuloque mederi.

Neruis incisis, & dolentibus, atque
 contractis.

H Aud qsq̃ credet disiectos vulnere nervos
 Ad solitū rursus reuocari posse vigorem.
 Sed prodest terræ lumbricos indere tritos,
 Quis vetus & *rana sociari axungia debet. * rancen
 Si verò occultus nervos dolor vrit inertes,
 Vulturis excisos adipēs rutamque remitte,
 Aut ceram, & tali recreabis languida fotu.
 Conuenit & pelagi calidis perfundier vndis.
 Carica, vel betis lento cum melle iugatur.
 Aut Baccho madefacta Ceres cū frōde cupressi,
 Quo poteris *potu recreare rigentia membra. * fotu
 Sin autem subito replicantur corpora morbo,
 Contractos reuocat nervos caro sumpta colūbæ.

Agris somno adsciscendo.

N On solū miseros teterrima febris adurit,
 Sed super optato pergit viduare sopore,
 Ne prosint placidi cœlestia munera somni.
 Charta igitur, varijs quam pinxit litera verbis,
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.
 Proderit & magnū capiti substernere fulcrum,

N S

Prodest

Prodest & mistam lymphis potare cupressum,
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum
 Iungis, & immisceas madidū tritumq; papauer.
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.
 Dilue præterea glomeramina, quæ gerit intus
 Clausa aries inter geminæ coxendicis umbras,
 Inde soporati ducentur gutture potus.

Lethargiæ expellendæ.

Diximus hæc sortē miseris mortalibus esse,
 Ut sint sæpe mala inter se cōtraria morbi,
 Deniq; nōnunquā somno sic mēbra grauantur,
 Ut coniungatur leto sopor altus acerbo.
 Ergo leui flamma torrentur cornua capræ,
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.
 Aut veneris labrum quæ dicitur herba, bibetur,
 Quæ teritur prius, & vino confusa liquecit.
 Conueniunt acidis euphorbia mista fluentis,
 Gramina vel rutæ gemina si nare trahantur.
 Quidam dira iubent, septeno cimice trito,
 Ut vitientur aquæ, cyathusq; bibatur earum.
 Hæc potiora putant, quàm dulci morte perire.

Comitali morbo.

Est subiti species morbi, cui nomē ab illo est,
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.
 Sæpe etenim membris atro languore caducis,
 Consilium populi labes horrenda diremit.
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profudit.
 *atri Prodest cum veteri Baccho fel vulturis *ampli,
 Sed

Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit vno.
 Aut cruor ex progne mistus cum polline thuris,
 Aut apium elixum, aut cōditum melle fel agni,
 Marrubium' ve pari confusum pondere mellis,
 Cui tu terna dabis gustu cochlearia in vno.
 Aptus mustela cinis est & hirundinis vna.
 Præterea pluuias hominis quas calua supina
 Excepit proiecta sinu, consumere prodest.
 Aut lapis ex nido, vaga quæ congeffit hirundo,
 Vellitur, & nexu fouet attollitq; iacentem.
 Pellitur (vt fama est) gustu quoq; lāguor anethi.

Regio morbo pellendo.

Regius est vero signatus nomine morbus,
 Molliter hic quoniam celsa curat in aula.
 Huic rubia ex mulsâ fertur conducere lymphâ.
 Allia trita dabis vino madefacta calenti.
 Vellera cum vino suffiri sulphure prodest.

Infantibus' dentientibus, vel strige
 inquietatis.

N Vdū hoīem primū *mater natura pfudit, *mundi
 Insup̄ excruciat, niueis cū dētibus armat.
 Collo igitur molli dentes neclentur equini,
 Qui primi fuerint pullo crescente caduci.
 Aut teneris cerebrum gingiuis illine porci.
 Aut leporis niueum bibitur cum lacte caprino.
 Præterea si forte premit strix atra puellos
 Virosa immulgens exertis hubera labris,
 Allia præcepit *Titini sententia necli,
 Qui veteri claras expressit more togatas.

* alias:
 tundi sei
 tentia
 eli

Combus

Combusturis igne, vel frigore.

Sunt diuersa quidē mala frigoris atq; caloris,
Sed tamē amborū simili nocet vlcere virus.
Illa quoq; vsta putes, quæ sunt niue læsa rigente,
Conuersa in cinerem platani pila curat vtrunq;.
At verò ambustum flammis qui candidus oui
Succus inest, penna inductus sanare valebit.

Aut tu succosæ cinerem perducito lææ,

* lini Aut vinam ex oleo* veteri composito calcem,
Ordea vel franges atq; oui candida iunges,
Adsit adeps porcæ (mira est hæc forma medelæ)
Iunge chelidonijs, ac sic line vulnera, succis.
Quodq; recens vssit glacies axungia simplex
Mulcet, et ex facili grata est medicamine cura.

Venenis prohibendis.

Vt tutus sis infestæ fraude nouercæ,
Vel quicumq; tuo carpetur liuidus auctu,

Non expectatis eat obuia cura venenis,
Ante cibos igitur iuglandis fœtus edatur,

*variâtia Produnt electri*rorantia pocula virus.

Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ
Conueniunt potu, dimersa' ve ficus oliuo.

Sæpe etiam raphanū prædixit numen edendum,

Antidotus verò multis mithridatica fertur

Consociata modis, sed Magnus scrinia regis

Cum raperet victor, vilem deprendit in illis

Synthesin, & vulgata satis medicamina risit.

Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,

terno Iuglandesq; duas, totidem cum corpore ficus,

Hæc oriente die parco conspersa Lyæo,

Sum

Sumebat metuens, dederat quæ pocula mater,

Venenis datis.

SI nequit infandū prauertere cautio virus,
Proximus ille gradus data pocula pellerē
Lac asine placidæq; bouis pdesse loquunt. (cura.
Betoniam ex paruo sumunt pleriq; Lyæo.
Quod si hederæ succos, q̄ truncos implicat altos,
Instilles pateris, poterunt haud vlla nocere
Pocula, quæ quisquam sœuis vitiauerit herbis.
Si quis hyoscyamum gustarit, lacte capellæ
Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Vulneribus ex re dubia curandis.

Vulnera tabescunt spatio vitata dierum,
Curaq; nil prodest, nec ducit vlla cicatrix.
Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,
Vlceris annosi sinus vt coalescere possit,
Marrubium si *tu recoquis, illoq; liquore *thure co-
Vulnus atrox foveas, cineres vel hirundinis altæ quas
Inducas, leporis' ve aspersa coagula vino,
Aut hederam Baccho decoctâ, et semen anethi,
Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.
Lumbrici terræ poterunt conducere vulnus,
Aut facilis lapathi* cumulatior vulnera purgat, *coma la-
Et commistus adeps, sed nonnullo sale tactus. tior vlce-
Pinea præterea vino cum sulphure cortex, ra purg,
Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.

Verrucis tollendis.

INterdum existit turpi verruca papilla,
Hinc quondâ Fabio verū cognomen adhesit,
Qui solus patriæ cunctando restituit rem.

Id po

Id poterit vitium sanguis curare lacertæ,
 Aut vrina canis cum terra inducta madenti.
 lichen Aut herbe succus, quæ fertur nomine lathyr,
 Et tithymallus item tali satis apta medele.
 Si rupta immensos fundit verruca cruores,
 Purpureo triti cineres de vellere prosunt,
 Quod fuerit vero conchyli sanguine tinctum.

Hæmorrhoidibus medendis.

EXcruciant turpes anum si forte papillæ,
 Agrestis prodest radix superaddita porri.
 Ni violet, sanat iuglandis fragmine clausa.
 Sal niueum sumes, beticum quod nomine dicunt,
 Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella.
 Apponesq; super, pellit medicina dolorem.

Quæ sequuntur, ex Aldino codice huc trans-
 ferre libuit: etsi videantur non esse Sereni.

P A R A L Y S I D E P E L -
 L E N D A E.

Prima die ita agendum.

Hunc quicq; cupis citius depellere morbum,
 Protinus antidotum studio tu perfice mirum,
 Scilicet ut valeas languenti ferre medelam:
 Castoreas siliquis bis sex perquirere cura,
 Tristis item digitis lympham metire duobus:
 Deniq; tunc capies phialam quæ iustior extat,
 Aut equidem flamas: sed prunas subijce solers:
 Proderit interea tepidum potantibus illud:
 Ieiunis sed enim potius præbere memento.

Secunda ita medendum est.

Cumq; secunda dies orbi peruenerit omni,
 Haud

*Haud alijs rebus prudens adiungere cures.
Castoris atq; nomen siliquas appendito statim,
Atq; duos semis digitos metire memento
In calice atq; probo lympham miscere duobus:
Qui patitur tepidū languens hinc sorbeat ipse.*

Tertia die ita curandum est.

*Gratior atq; dies ternus cum venerit imo,
Rursus in agroto constanter fer medicamen,
Castoreas siliquas iterum quæ pondere sint sex:
Hinc etenim binos digitos metire memento
De lymphâ liquida: sed enim subiungere cura
Et simili debes tepidum præbere modo tunc.*

*Ita peragendum est à quarta die vsq; ad sex-
tam, & à septima vsq; ad nonā, à decima vsq;
ad duodecimam, & mirifice prodest.*

Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.

*Quartus & ille dies consentit: nec'ne priori
Quintus & est similis percellens nanq; secundo:
Sextus itemq; simul concordat deniq; terno:
Septimus vsq; nonum percurritur ordine primo:
Sic decimas currens conscenditur ad duodenum.*

F I N I S.

Q. R H E M N I I
FANNI PALAEMONIS
DE PONDERIBVS
ET MENSVRIS
LIBER.

Sunt, qui
huius opu-
sculi Pri-
cianū au-
torem esse
putant: sed
reclamat
erudito-
rū maior
pars.



ONDERA Peonijs veterum me-
morata libellis

Nosse iuuat: pondus rebus natura
locauit

Corporeis, elementa suum regit omnia pondus,
Pōdere terra manet, vacuus quoq; pōderis aether
Indefessa rapit voluentis sydera mundi.

Ordinar à minimis, post hæc maiora sequentur,
Nam maius nihil est aliud, quàm multa minuta.

Semioboli duplū est Obolus, quē pōdere duplo
Gramma vocāt, Scrupulū nostri dixere priores,

Semina sex alijs siliquis latitantia curuis,

Attribuunt scrupulo, lentes veraciter octo,

Aut totidē speltis numerant, tristes' ve lupinos

Bis duo: sed si par generatim his pondus inesset,

Seruarent eadem diuersæ pondera gentes,

Nunc variant: etenim cuncta non fœdere certo

Naturæ, sed lege valent, hominumq; repertis,

In scrupulis ternis Drachmā, quo pōdere doctis

nūmus Argenti facilis signatur pondus Athenis.

Holceq; à drachma non re, sed nomine differt.

Drachmā si gemines, adierit quem dicier audis,

Siciliquis: drachmæ scrupuli si adiectio fiet,

Sextula

Sextula quæ fertur, nam sex his vncia constat:
 Sextula cum dupla est, ueteres dixere Duellam.
 Vncia fit drachmis bis quattuor: vnde putandum
 Gramata dicta, quod hæc viginti quattuor in se
 Vncia habet: tot enim formis vox Græca notatur,
 Horis quot mundus peragit noctemq; diemq;.
 Vnciaq; in Libra pars est, quæ mensis in anno.
 Hæc maior Latio libra est, gentiq; togatæ.
 Attica nã minor est, ter quinq; hæc deniq; drach
 Et ter vigenis tradunt explerier vnam. (mis,
 Accipe præterea, paruo quam nomine Graiij
 Minam vocitant, nostriq; Minã dixere priores,
 Centũ hæc sunt drachmæ. quod si decerpseris illis
 Quattuor, efficies hanc nostram deniq; libram.
 Attica quæ fiet, si quartã dempseris hinc, Mina.
 Cecropium superest post hæc docuisse Talentum
 Sexaginta minas, seu vis, sex millia drachmas,
 Quod summũ doctis perhibetur pòdus Athenis,
 Nam nihil his Obolo'ue minus, maius'ue Talèto.
 Nunc dicam, solidæ quæ sit diuisio libræ
 Siue Asis, nam sic legum dixere periti.
 Ex quo quod soli capimus perhibemur habere,
 Dicimur aut partis domini pro partibus huius:
 Vncia nam libræ si deest, dixere Deuncem:
 At si sextantem retrahas, erit ille Decuncis:
 Sed nullum reliquo nomen Semuncia certum.
 Dèpta dabit, neq; enĩ est huius Sescũcia triplex:
 Dodrantẽ reliquũ vocitant quadrante retracto:
 Cumq; triens desit, Bessẽm dixere priores.
 Idem Septuncem dempto quincunce vocarunt.

Decuncis
 prodecũx
 qui & De
 tãs dicitur
 positum v
 detur.

o

Post

Post hæc Semissis solidi pars maxima fertur.
 Nam quæ dimidium superat, pars esse negatur,
 Vt docuit tenui scribens in puluere Iulius.
 Cætera dicta prius quibus est semuncia maior.

De ponderibus, siue mensuris humidorum, & frugum.

ET de pōderibus, superest pars altera nobis
 Humida metiri, seu frugum semina maius
 Cuius principio nobis pandetur origo.
 Pes longo spatio latoq; notetur in anglo,
 Angulus vt par sit, quem claudit linea triplex.
 Quattuor ex quadris medium cingatur inane.
 Amphora sit Cubus, quam ne violare liceret,
 Sacrauere Ioui Tarpeio in monte Quirites.
 Huius dimidiū fert Vrna, vt & ipsa Medimni
 Amphora, terq; capit modium, Sextarius istum
 Sex decies haurit, quot soluitur in digitos Pes,
 At Cotylas quas, si placeat, dixisse licebit.
 Hominas recipit geminas Sextarius vnus,
 Qui quater assūptus sit Graio nomine Chœnix.
 Adde duos, Chus fit vulgo, qui est Congius idē,
 A quo sextarij nomen fecisse priores
 Crediderim, quòd eos capiat sex congius vnus.
 At Cotyle cyathos bis ternos vna receptat,
 Sed de abaco nobis id pondus sepe notatur,
 Bis quinq; hūc faciūt drachma, si appēdere tētes:
 Oxybaphus fiet, si quinq; addantur ad illas.
 At Mystrium cyathi quarta est, ac tertia mystri,
 Quam vocitat Cyanē, capit hæc cochlearia bina.
 Quòd si mensura pondus componere fas est,
 Sextarij

Sextarij Cyathus pars est, quæ est vncia libræ,
 Nec non oxybaphi similis Sescuncie fiet.
 Sicilicquumq; tibi mystro simulare licebit.
 Cochlear extremus est, Scrupuliq; imitabit instar.
 Attica præterea dicenda est Amphora nobis,
 Seu Cadus, hanc facies, nostræ si adieceris urna.
 Est & bis decies quem conficit amphora, nostris
 Culleus, hac nulla est maior mensura liquoris.
 Est etiam terris (quas aduena Nilus inundat)
 Artaba, cui superat modij pars tertia post tres,
 Nanq; etiam modijs explebitur Artaba triplex.

De ponderibus variorum liquorum,
 & aquarum.

Illud præterea tecum cohibere memento,
 Finitum pondus varios seruare liquores.
 Nam libræ (vt memorat) besse Sextarius addet,
 Seu pueros pendas latices, seu dona Lyæi.
 Addunt semissem libræ* labentis oliui,
 Selibramq; ferunt mellis superesse bilibri.
 Hæc tamen assensu facili sunt credita nobis:
 Nanq; nec errantes vndis labentibus amnes,
 Nec merfi puteis latices, aut fonte perenni
 Manantes par pondus habent: non deniq; vina,
 Quæ campi aut colles nuper' ne aut antè tulere,
 Quod tibi mechanica proptu est depromere musa.
 Ducitur argenti, tenui' ne ex ære cylindrus,
 Quantum inter nodos fragilis producit arundo,
 Cui cono interius modico pars ima grauat,ur,
 Ne totus sedeat, totus' ne supernatet vndis,
 Lineaq; à summa tenuis descendit ad ima

*liuentis

Ducta superficie, tot quæq; in frusta secatur,
 Quot scrupul^o grauis est argenti aris'ue cylindrus.
 Hoc cuiusq; potest pondus spectare liquoris.

Maiores, subaudi pondere, modulos, est par, in quas cylindri inligatur uisus.
 Nam si tenuis erit, maiori mergitur vnda:
 Sin grauior, plures modulos superesse notabis:
 Aut si tantundem laticis sumatur utrinq;
 Pondere præstabit grauior: si pondera secum
 Cõueniunt, tunc maior erit, quæ tenuior vnda est.
 Quod si ter septem numeros texisse cylindri
 Hos videas latices, illos cepisse ter octo,
 His drachma grauius fatearis pondus inesse.
 Sed refert æqui tantum conferre liquoris,
 Ut grauior superet drachma, quantum expulit vn-
 Illius aut huius teretis pars mersa cylindri. (da,
 Hec de mensuris, quarum si signa requires,
 Ex ipsis veterum poteris cognoscere chartis.

De inuentione argenti, auro in vna
 massa permisti.

Nunc aliud partu ingenio trademus eodẽ.
 Argentum fuluo si quis permisceat auro,
 Quantum id sit, quo'ue id possis deprendere pacto,
 Prima Syracusij mens prodidit alta magistri.
 Regẽ nanq; ferunt Siculam, quam vouerat olim
 Cœlicolum regi, ex auro statuissẽ coronam,
 Compertoq; dehinc furto, nam parte retenti
 Tantundemq; argenti opifex immiscuit auro,
 Orasse ingenium ciuis, qui mente sagaci
 Quis modus argenti fuluo latitaret in auro,
 Repperit, ille sum quod dijs erat antè dicatum.
 Quod te quale fiet, paucis (aduerte) docebo.

Lancib.

Lancibus equatis quibus hæc appèdere mos est,
 Argenti atq; auri, quod edax purgauerit ignis,
 Impones libras, neutrum vt præponderet: has q;
 Submites in aquam, quas pura vt ceperit vnda,
 Protinus inclinat pars hæc, quæ sustinet aurum.

*Pensius hoc nanq; est, similaricrassius vnda. *Densu

At tu siste iugum, medijq; è cardine centri
 Interualla nota, quantum discerpserit illinc,
 Quotq; notis distet suspensio pondere filum.

Fac drachmis distare tribus: cognouimus ergo
 Argenti atq; auri discrimina, deniq; libram
 Libra trib. drachmis superat cū mergitur unda.

Sume dehinc aurum, cui pars argentea mista est,

Argentiq; meri par pondus, itemq; sub vnda

Lancibus impositum spectata: propensior auri

Materies* subsistit enim, furtumq; docebit.

Nam si ter senis superabitur altera drachmis,

Sex solas libras auri dicemus inesse,

Argenti reliquum, quia nil in pondere differt

Argentū argento, liquidis cum mergitur vndis.

Hæc eadem puro deprendere possumus auro,

Si par corrupto pondus pars altera gestet.

Nam quoties ternis pars illibata grauarit

Correptā drachmis sub aquam, totidē esse notabis

Argenti libras, quas fraus permiscuit auro.

Pars etiam libræ quæuis si forte supersit

Hæc quoq; drachmarū simili tibi parte notetur:

Necnon & sine aquis *

*aliàs,
 sub aquis
 fiet

FINIS.

O 3

INDEX OMNIVM, QVAE IN CELSO CON-

tinentur. Et primus numerus li-
brum, secundus caput
designat.

✱

<i>A</i>		1. praë.
A Bdomen lib. 4. cap. 1.	Adolescentia quibus morbis magis obnoxia sit	1.1
Abdominis ruptura quomodo curanda sit lib. 7. cap. 17	Adurentia	5.8
Abditæ causæ lib. 1. in praë.	Adusta quomodo curari debeant	5.26
Abscessus quibus signis indicentur futuri 2.6	Aegilops	7.7
Abortus periculū quādo lib. 1. cap. 7	Aestas periculosa	2.1
Abstinentia nimia saepe inutilis ibidem	Aestas quos pariat morbos	1.2.1
Accessiones in febribus 3.3	Aestate quæ ad vitium magis conducant	1.3
Aceti natura & usus 5.27	Aestuanti in balneo, quid opus sit facere	1.3
Acopa 5.2.3	Aetatis differentia vitæ & curatione	1.3
Acrochordones lib. 2. cap. 14. & lib. 5. ca. 28	Aetatum differentia, quantum ad bonam, malam'ue valetudinem	2.1
Actiões naturales quæ	Aesculapius in deorum	

I N D E X.

tum numerum rela-	Andro medicus	6.18
tus 1. proæ.	Angina	4.4
Agamemnon 1. proæ.	Angina subito finita,	
Agricolam vsu fieri,	quid portendat	2.5
nō disputatione ibid.	Animalium quadru-	
Ajax quo genere in-	pedum differentie	
saniæ laborauerit 3.		2.17
18	Angues in Italia, &	
Alentia 5.14	in frigidis regionib-	
Alopecia 6.4	us minus terribi-	
Alphos lib.5.ca.vlt.	les	5.26
Alui stringentia 1.5	Ani uitia quomodo cu	
Aluum soluentia ibid.	rari debeant	7.30
Aluus quæ mala 1.3	Anodina	5.25
Aluus soluta, quibus	Antidoti, & eorum	
remedijs coërceatur	compositiones	5.23
1.6	Antheræ	6.11
Alui iudicatio 2.7	Antigonus rex	3.22
Ambrosia Antidoti no	Apollonius medicus	
men lib.5.23	1. proæ.	
Ammonius lithotom.	Apostemata	2.1
7.20	Aphthæ ibidem	
Anatomice, id est, in-	Apollonius, qui Melys	
sectio corporum ne-	cognominatus est	5.
cessaria 1. proæ.	proæ.	
Ancyloblepharos 7.7	Aperientia	5.8
Andreas medicus 5.	Aqua frigida quibus	
proæ.	profit	1.9
Andree collyrium 6.6	Aquæ differentia in	

potionibus	2.17	Aristonis malagma	
Aquæ bonitatis probatio	ibidem	ibidem	
Aqua in qua candens ferrum tinctum sit	4.9	Articulorum curationes	5.26
Aqua inter cutē quando minime terribilis	2.7	Asclepiades	1. proœ.
Aqua quomodo hydropicis emittatur	7.13	Ascites	3.21
Aquilonis flatu quos generet morbos, & quid boni sanis corporibus adferat	2.1	Asthma	4.4
Area	6.4	Asius lapis	lib.4.
Arquatus morbus	3.24	cap.vlt.	
Arteriaces compositio	5.26	Aduersus aspidis ictū	5.26
Articulorū vitia	2.7	Athenio	5.25
Arteria aspera, eiusq; descriptio	4.1	Atheroma	7.6
Articulorum dolores	4.vlt.	Attoniti qui dicantur	3.26
Ad articulos malagma	5.18	Atrophia	3.22
		Attalicum emplastrū	5.19
		Auium differentie in cibo	2.17
		Aurium vitium	6.7.
		& lib.6.c.18	
		Aurium morbi	7.8
		Aurium fractarum cura	8.6
		Autumnus periculosissimus	2.1
		Autumnus quos morbos pariat	ibidem
		Autum	

I N D E X.

Autumni tēpore quæ	Calor quid corporibus
ad victū magis con-	adferat 2.1
ferant 1.3	Calculo quomodo suc-
Auster quos morbos	curratur 7.26
generet 2.1	Cancer in ore 6.15
Autopyron 2.17	Cancer in cole 6.18
B	aduersus Cantharidas
B asilicon empla-	2.27
strum 5.19	Capitis dolores quibus
Bæthus ibidem	leuentur 2.7
Brachij fracti curatio	Capitis longus dolor si
8.10	sine causa est, &c.
Brachium 8.1	ibidem
Bronchocele 7.13	Capitis descriptio 4.1
Bubonoccele 7.18	Capitis morbi, & eo-
C	rum curatio 4.2
C achexia 2.1.	Caput quibus infirmū
& 3.22	est, quid facere con-
Cacoëthes 5.28	ueniat 1.4
Calefacientia 1.3	Caput quod firmissi-
Calculosi quibus indi-	mum 8.1
cij cognoscantur	Caput luxatum 8.13
2.6	de Capillis fluentibus
Calculus quibus signis	6.1
cognoscatur 7.26	Carbunculus in oculis
Caluaria 8.1	6.6
Caligatio oculorum	Carcinodes 6.8
6.6	Carbunculi in cole cu-
Calor quibus proffit 1.9	ratio 6.18

o 5 ad

I N D E X.

ad Carcinodas mala-	8.cap.5.	
gma	5.18	Chirurgus Sostratus
Cardiacus morbus quis	1.proæ.	
dicatur	3.19	Cæsarianum collyrium
Carcinoma	5.28	6.6
Casus quid inuenerit	Cercis	lib.8.c.1.
5.26	Chiragra	2.6.
Cassius medicus	1.pr.	et 4.24
Catapotiorum descri-	Chirurgica	lib.1.
ptio, siue varia com-	in proæ.	
positio	5.25	Chironium vlcus
Catapotium ad somnũ	5.28	
ibidem	Chirurgus qualis esse	
Catapotium Athenio-	debeat	7.proæ.
nis	ibidem	Chænicion
Catapotium Heraclidis		8.3
ibidem	Cholera	4.11
Causse abditæ quæ sint	Chordapsos	4.13
1.proæ.	Chordion	ibidem
Causse euidentēs quæ	Chrite tuberculum	7.6
eodem	Chrysippus	1.in
Causse obscuræ quæ	Chrysippi discipulus	
eodem	medicus	2.21
Cephalea	4.2	Chrysippi malagma
Cerebri vel membra-	5.18	
na eius percussa cu	Cibus à quibus rebus	
ratio	5.22	melius incipiat
Chirurgus Tryphon	Ciborum potionumq;	1.2
lib.7. in proæ. et lib	differentiæ	2.17
	Cibus	

INDEX.

Cibus quomodo &	eius curatio	4.12
quando in febris	Comitialis morbus	
dandus lib.3.cap.	3.23	
4.5	Concoctio cibi in sto-	
Cibi varij eduntur fa-	macho	lib.1.
cilius quam conco-	in proe.	
quuntur	3.6	Concoctio quibus fit,
Cibus febricitantibus	quomodo se gerere	
dandus, qualis esse	debeant	1.2
debeat ibidem. ad-	Concubitus qualis esse	
uersus eicutam	debeat	1.1
5.27	Concubitus in faemi-	
Cirsocele	nis, si per naturam	
7.18	prohibitus, quomodo	
Circulatores	restitui debeat	7.28
5.26	Conditia duab. de caus-	
Clauius	sis inutilia	1.3
5.28	Condylomata	5.28
Clauius oculorum	Condylomatum cura-	
7.7	tio	7.30
Cleonis collyrium	Coquentia & matu-	
6.6	rantia pus	5.3
Coli dolor quibus re-	Cordis descriptio, &	
medys inuetur	ubi situm sit	
1.7	4.1	
Coles	4.1	
4.1	Cordis percussi signa	
Colicon medicamenti	5.22	
genus, ex quibus	Coryza	4.2
rebus constet	4.14	
4.14	Corpus integrum quod	
Collyriorum varia com-	nam	
positiones		
6.6.		
& 4.28		
Coemuntiam aliqua cor-		
poris parte dissoluen		
tia		
5.11		
Caliacus morbus, &		

I N D E X.

nam habeatur	1.2	Craſſiſſimum os in ca-	
Corporum incifio	1.	pite	8.1
proæ.		Cubitus	ibid.
Corpus gracile quale		Cubitus luxatus quo-	
2.1		modo reſtitui de-	
Corpus quæ extenuent		beat, & quot in eo	
1.3		offa coëant	8.16
Corporis humani de-		Curta in auribus quo-	
ſcriptio	8.1	modo ſarciri debeât	
Corpus quodnam habi-		7.9	
liſſimum	2.1	Cutem purgantia	5.16
Corporis noxæ quinq;		Cucurbitularum gene-	
5.26		ra duo	2.10
Coſtæ, & earum ſitus		Curatio morborû quot	
atque differentia		modis fiat	2.8
8.1		Curationum duo gene-	
Coſtarum fracturariû		ra	7.7
curatio	8.9	Cucurbitulis quomodo	
Coxarum dolores	4.	ſanguinis detractio	
22		fiat	2.10
Coxarum dolor, quid		Cynicus ſpasmus	4.2
portendat	2.5	D	
Coxarum os	8.1	Democritus lib.	
Crato medicus	6.7	1.proæ.	
Cruſtas vulneribus in-		Deiectione	1.3
ducentia	5.10	Deiectione quando ſine	
Cruſtas ulcerum re-		vlla noxa ſit	2.4
ſoluentia	eodem	Deſruti differentia in	
Cremaſteres	7.18	potionibus	2.17
		Denarij	

I N D E X.

Denarij pondus 5.	Difficilime curationē
17	admittentia 5.22
Dentium situs & or-	Diocles 1.proæ.
do & numerus &	Disciplina corpori ini-
nomina 8.1	mica ibidem
Dentium dolor 6.7	Dionysij collyrium
Dentium curatio 7.12	6.6
Dentes quomodo ex-	Dyspnœa 4.4
trahendi sint ibid.	Dysenteria 4.15
Destillatio, eiusq; cu-	E
ratio 4.2	E ctropium oculo-
Destillatione laboran-	rum 7.7
tibus quid opus sit	Elæodes 5.26
1.5	Elcodes 5.28
Desidia lib.1.in proæ.	Elephantia 3.25
Detractio materiæ à	Empyricus vnde di-
corporibus, quot mo-	ctus sit lib.1.in
dis fiat 2.8	proæ.
Dexij malagma 5.18	Empyrici qui sint
Diaphragma 1.proæ.	ibidem
Dietetica medicina	Empedocles ibid.
ibidem	Emplastrorum varia
Dies critici 3.4	cōpositiones, & de-
Digiti lib.8.cap.1.	scriptiones 5.17.
19	& deinc.
Digitorum coheren-	Empyrosthotonos 4.3
tium curatio 7.32	Enchanthis 7.7
Digitorum vlcera	Enterocèle 7.18
6.19	Enneapharmacij em-
	plast

I N D E X.
 plastrum 5.19 Exercitatio quibus fiat
 Ephesium emplastrum modis 1.2
 5.19
 Epinyctis 5.28 Exercitationis finis,
 Ephelis 6.5 quisnam esse debeat
 Epiploce 7.18 ibidem
 Epipaſtica 5.18. & Exercitationem que
 19 sequi debeant ibid.
 Erasistratus 1. in Exedentia 5.7
 proæ. Expletus cibo potu'ne
 quid facere debeat
 1.2
 Errorem suum de fu-
 turis in capite, inge-
 mie cōfessus est Hip-
 pocrates 8.4
 Erysipelas lib. 5. ca. 26. & 28
 Evidentes causſæ 1. 1.3
 proæ.
 Evocantia & educen-
 tia 5.12
 Euticleus 5.18
 Euelpidis collyrium 3.5
 6.6
 Euelpistus chirurgus
 7. proæ.
 Exagitatio quid fa-
 ciat 4.15
 Exanthemata 5.28
 Experientia 1. in pro.

F
 Facies in homine 8.1
 Fatigato quotidianum
 cubile tutissimum
 1.3
 Fatigatum inter ambu-
 landum que reficiat
 ibidem
 Februm differentia
 3.5
 Febrem saepe praesidio
 esse 2.7
 Fel & eius situs 4.1
 Ferarum differentia in
 cibus 2.17
 Femur 8.1
 Fistula in homine ibid.
 Fistul

Fistularum curatio

5.28

Fluxus ventris, eiusq;

curatio

4.19

Fœmina

8.1

in Fœminis secunde

7.30

Foramina in capite

ibidem

Frigus quibus inimi-

cum

1.9

Frigus quibus proffit

ibidem

Frigus quid mali cor-

poribus adferat

2.1

Frigus in febris

quid dicatur

3.3

Fructuum arboreorum

differentie in cibis

2.17

Frumētorum differen-

tie in cibis

ibid.

Furunculus

5.28

G

Granae cura-

G tio

7.33

Ganglion

7.6

GargariZationes

5.22

C

ria qua

2.17

Ge.

mplentia

5.14

Ging.

anabilia

qua sint

6

13

Glaucias

tio quomodo

Glandule

7.25

Glande cole

ui eueniat,

Elo tegenda

endum

Glans colis sua

confecta, quon

aperienda sit

10.20

Glutinantia

5.2

Glutinatio

vulnerum

5.26

Gorgias medicus

2.

14. & libro 7. in

proce.

Grauedines

quomodo

curentur

4.2

Grauedine laboranti-

bus quid conueniat

1.5

Gubernatorem & su

fieri non disputatione

1.pro.

H

H

Ammonius me-

dicus 7.proce.

Hapsna

plastrum	5.19	Homo sanus, nullis
Ephesium emplastrum		se medicorum legi-
5.19		bus obligari debeat
Epinyctis	ous	1.1
Ephelis		Hominem sanum, va-
Epiploce	6.18	rium vite genus ha-
Epipastic. differentia		bere oportet eod.
19	2.17	Horror in febris
Erasistrates	1. proæ.	3.3
proæilus	libr. 1.	Humectantia
Erra proæ.	libr. 5.	1.3
cap. 25		Humerus
Hecatæus	5.25	8.1
Hermonis collyrium		Humerorum dolores
6.6		quibus tollantur
Hernia	7.18	2.7
Heron siue Hieron me-		Humeri fracti curatio
dicus	7. proæ.	8.10
Herpes	5.28	Humerus luxatus quo
Hippocrates	1. proæ.	modo restitui debeat
Hippocrates omnis me-		8.15
dicinæ parens	7.	Humor spissescēs, ace-
proæmio		to intus sumpto dif-
Hireneus	5.25	cutitur
Hieracis collyrium		5.26
6.6		Hyeme quæ magis con-
Hieræ compositio	5.	ueniant
27		1.3
Homerus	1. proæ.	Hyems salubris est
		2.1
		Hyems quos morbos
		pariat
		ibidem
		Hydrocelle
		7.18
		Hydrops, ac eius spe-
		cies

I N D E X.

cies tres	3.21	ria quæ	2.17
Hydropis curatio ibi-		Implentia	5.14
dem		Insanabilia quæ sint	
Hydrocephalon	4.2	5.26	
aduersus Hyoscyamum		Infibulatio quomodo	
5.27		fiat	7.25
Hyposarca	3.21	Inedia si cui eueniat,	
Hypochrysis	6.6	quid faciendum	
I		1.2	
I Chor	5.26	Inguen quomodo inci-	
I lecur, & eius si-		dendum sit	7.20
tus	4.18	Intemperantia qua in	
ad Iecur dolens ma-		re tolerabilior	1.2
lagma	5.18	Intemperantiæ exem-	
Ieiuni hominis vis ad-		plum	3.21
uersus serpētis ictum		Insania quibus signis	
5.26		denuntietur futura	
Ignauia quid faciat	2.5		
1.1		Insaniæ species	53.18
Ileos	2.1	Insanientium commu-	
Ileon	4.13	nia remedia	3.18
ad Infantem mortuum		Intestinum ieiunum,	
expellendum	5.	& cur ita dictum	
25		4.1	
Ilia, & eorum situs		Intestinum tenuius	
4.1		ibidem	
per Imbres qui morbi		Intestinum crassius	
oriantur	2.1	ibidem	
Imbecillissima mate-		Intestinorum nomina	
		P diuer	

I N D E X.

<i>diuersa, & differen</i>	<i>tio</i>	4.8
<i>tiae & situs</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Intestinum cecum &</i>	<i>L</i>	
<i>rectum</i>	<i>Abor quid fa-</i>	1.1
<i>Intestinatorum morbi,</i>	<i>ciat</i>	
<i>& eorum curatio</i>	<i>Laborem quis facilius</i>	
4.10	<i>toleret per atatem</i>	
<i>Intestini tenuioris mor</i>	1.3	
<i>bi curatio</i>	<i>Laborantibus ex par-</i>	
4.14	<i>tu remedium</i>	5.25
<i>Iocinoris morbus</i>	<i>Lagophthalmos</i>	7.7
4.8	<i>Lateris dolor</i>	4.6
<i>in Iocinoris morbo que</i>	<i>ad Laterum dolores</i>	
<i>periculosa</i>	<i>malagma</i>	5.18
2.7	<i>Lauatio</i>	1.3
<i>Intestinatorum percuss-</i>	<i>Lenticula</i>	6.5
<i>forum signa</i>	<i>Lepis</i>	8.3
5.26	<i>Lethargus</i>	3.10
<i>Intestina vulnerata</i>	<i>Lenitas intestinatorum,</i>	
<i>quomodo curari de-</i>	<i>a quibus atatibus</i>	
<i>beant</i>	<i>depellitur</i>	2.7
7.16	<i>Leguminum differen-</i>	
<i>Iollæ medici composi-</i>	<i>tiae incibus</i>	2.17
<i>tio</i>	<i>Leuce lib.5.ca.vlti.</i>	
5.22	<i>Lenia ingenia qualia</i>	
<i>Iocinoris percussi si-</i>	8.4	
<i>gna</i>	<i>Lenitas intestinatorum,</i>	
5.26	<i>& eius curatio</i>	
<i>Iudæi compositio</i>	4.16	
5.	<i>Leucophlegmati</i>	3.21
22	<i>Leuant</i>	
<i>Iudæi emplastrum</i>		
5.		
19		
<i>Iugale</i>		
lib.8.		
cap.1		
<i>Iuguli fracti cura-</i>		

INDEX.

<i>Leuantia siue leuigan-</i>		<i>Luxuria.</i>	<i>lib.1.in</i>
<i>tia.</i>	5.13	<i>proœmio</i>	
<i>Lienteria</i>	2.1	<i>M</i>	
<i>Lien siue lienis</i>	4.1	<i>Achaon lib.1.</i>	
<i>Lienes quibus magni</i>		<i>in proœ.</i>	
<i>sint</i>	2.5	<i>Malagmatum compo-</i>	
<i>Lienis malum quando</i>		<i>sitiones varie</i>	5.17
<i>periculosum</i>	2.7	<i>Malæ</i>	8.1.
<i>Lienis morbi curatio</i>		<i>Manus lixata quo-</i>	
4.9		<i>modo restitui debeat.</i>	
<i>ad Lienem malagma</i>			8.17
5.18		<i>Materia extrahenda</i>	
<i>Lienis vulnerati signa</i>		<i>per malagmata</i>	5.18
5.26		<i>Materie genere</i>	
<i>Ligæ resolutio, eiusq;</i>		<i>modo vtendum pro-</i>	
<i>curatio</i>	4.2	<i>viribus cuiusq;</i>	2.17
<i>Linguarũ vlcera</i>	6.12	<i>Maxilla</i>	8.1
<i>Lippitudine laboran-</i>		<i>Maxillæ fractæ cura-</i>	
<i>tibus quid opus sit</i>		<i>tio</i>	8.7
1.5		<i>Maxillæ luxata cura-</i>	
<i>Literarum disciplina</i>		<i>tio</i>	8.12
<i>animo necessaria,</i>		<i>Medicina nusquã non</i>	
<i>corpori inimica</i>	1.	<i>est</i>	1.proœ.
<i>proœ.</i>		<i>Medicina quid pro-</i>	
<i>Lucubrandum quando</i>		<i>mittat</i>	<i>ibidem</i>
<i>potissimum.</i>	1.2	<i>Medicina multiplex</i>	
<i>Luxata membra quo-</i>		<i>ibidem</i>	
<i>modo restitui debeat</i>		<i>Medendi scientia, sa-</i>	
8.11		<i>pientie pars</i>	<i>ibid.</i>
		<i>P 2</i>	<i>Med</i>

I N D E X.

<i>Medicina triplex ibi-</i>	<i>Meliceria</i>	5.26
<i>dem</i>	<i>Meliceria siue melice-</i>	
<i>Medicina que victu</i>	<i>ris lib.5.cap.28. &</i>	
<i>curat in duas partes</i>	<i>lib.7.cap.6</i>	
<i>diuisa ibid.</i>	<i>Meningophylax</i>	8.3
<i>Medicinae que pars</i>	<i>Menophilus medicus</i>	
<i>difficilima ibid.</i>		8.7
<i>Medicinā artem con-</i>	<i>Menemachus</i>	6.9
<i>iecturalem ibidem</i>	<i>Mensa secunda</i>	1.2
<i>Medicina quid ibid.</i>	<i>Metrodorus medicus,</i>	
<i>Medicorum officium,</i>	<i>Epicuri discipulus</i>	
<i>quodnam sit in cu-</i>		3.20
<i>rando ex Asclepia-</i>	<i>Mentum</i>	8.1
<i>dis sententia 3.4</i>	<i>Mithridatis antidotū</i>	
<i>Medici periti officium</i>		5.23
<i>circa egrum, cuius-</i>	<i>Modiolus</i>	8.3
<i>modi esse debeat 3.6</i>	<i>Mollientia</i>	5.15
<i>Mediamateria 2.17</i>	<i>Morbos in deorū iram</i>	
<i>Medulle percussæ si-</i>	<i>relatos 1.in proæ-</i>	
<i>gna 5.26</i>	<i>mio</i>	
<i>Meles chirurgus lib.</i>	<i>Morbos non eloquen-</i>	
<i>5.cap.28. & lib.7.in</i>	<i>tia, sed remedijs cu-</i>	
<i>proæmio</i>	<i>rari ibid.</i>	
<i>Melas lib.5.ca.vlt.</i>	<i>Morborum tria gene-</i>	
<i>Melancholia 2.5</i>	<i>ra ibid.</i>	
<i>Mellis natura in medi-</i>	<i>Morbi per singulas</i>	
<i>cina 3.9</i>	<i>tempestates 2.1</i>	
<i>ad Melicertas mala-</i>	<i>Morbus comitialis,</i>	
<i>gma 5.18</i>	<i>qua etate egre cu-</i>	
	<i>retur</i>	

I N D E X.

vetur	2.7	Motatio per vitæ cur-	
Morborum diuifio &		sum quomodo mode-	
differentia	3.1	randa	1.3
Morbus increfcē: qui-		Mycon	5.18
bus fignis dinofca-		Myron	5.28
tur	3.2	Myrmecia	4.28
Morbi decedentis quæ		Mydriafis oculorum	
notæ fint eodem	6.6		
Morbus fi acutus fue-		N	
rit quomodo ager		Narium morbi	
tractandus fit eo-		6.6	
dem		Narium fractarum cu	
Morbus fi longus fit		ratio	8.5
quomodo ager tra-		Naturales cauffæ quæ	
ctandus fit eod.		fint	1. proæ.
Morbus comitialis	3.	Nauiganti & nauſea	
23		preſſo, quid facere	
Morſus omnis quo-		opus fit	1.3
dam modo veneno-		Negotioſi hominis pri-	
ſus	5.26	ma curatio, exerci-	
Mortis indicia quæ		tatio eſt	1.2
2.5		Neruorum dolore la-	
Mos magnorum viro-		borantibus, quid ob-	
rum qui fit	8.4	ſeruandum fit	1.9
Mulieri grauidæ quæ		Neruorum diſtentio,	
incommoda euenire		quibus futura cepte	
poſſint	2.5	hendatur	2.5
Mulſi differentia in		Nileus, ſiu: Nilei ol-	
potionibus	2.17	lyrium	6.5

I N D E X.

Notæ in singulis mor-	curari debeant	7.11.	
bis obseruandæ	2.6	et 6.11	
Notæ	8.1	Orthopnœa	4.4
Nuimenij malagma	5.	Oſis fracti curatio	
18		8.7	
Nymphodorus medi.	Os quot modis excida-		
8.20	tur	8.3	
O	Oſſa vitiata	8.1	
O Bſcænarum par	Oſcheos	7.18	
tiū vitia quo-	Oſiivæ	6.8. et 7.8	
modo curanda ſint	Oſu	5.11	
6.18			
	P		
Oculorum varij morbi	P Alma	8.1	
6.6	Partuſe mortuus		
Oculorum naturæ indi	in vtero quomodo		
catio	excutiendus	7.29	
Oculorum vitia, et	ad Panum malagma-		
eorū curationes	ta	5.18	
6.6			
Olerum differētiæ	Paralyſis	2.1	
5.17			
Omentum, eiꝯq; offi-	Paralyſis oculorum		
cium	6.6		
4.1			
Omenti curatio	Parasynanche	4.4	
7.21			
Omoplate	Periculum in tabe quæ		
8.1	denuntient	2.7	
Opisthotonos	Parodontides	6.13	
4.3			
Opiæſis	Parotides	6.16	
6.4			
Oreſtes, quo genere	ad Parotidas mala-		
inſaniæ laborauerit	gmata	5.18	
3.18			
Oris vlcera, quomodo	Partium animalium dif-		
	ferent		

I N D E X.

ferētia in cibis	2.18	Phacos	6.5
Panificia	eodem	Phagedenē in cole na-	
Passi differētia in po-		scētis curatio	6.18
tionibus	eodē	Philippus Epirotes me-	
Pastillorum descriptio-		dicus	3.21
nes, & varia com-		Philocratis emplastrū	
positiones	5.20		5.19
Pastillus Polybij	ibid.	Philocrates	5.26
Pastillus Andronis		Philon	6.6
ibidem		Philothis collyriū eodē	
Parotides arteriæ	4.1	Philoxenus medicus	
Patella	8.1		6.19
Pecten	ibidem	Philotimus	8.20
Pediculi in palpebris o-		Phlegmone	1. in pro.
culorum	6.6	Phrenesis siue phrene-	
ad Pedum dolores ma-		tidis genera plura	
lagma	5.18		3.18
Peripneumonia	4.7	Phthisis	2 c.1. &
Pessi compositio	5.21		lib.3. c.22
Pessi alia compositio		Prygethlon	5.18. &
eodem			6.28
Pessi Numenij	eod.	Phymata	2.7. &
Pestilentia unde fiat			5.18. & 5.28
1.2		Piscium differentie in	
in Pestilentia quæ sunt		cibis	2.17
obseruanda	1.3.	Pituita oculorum quo-	
ca.10		modo curāda sit	7.7
Petro medicus	3.3	Planta	8.1
Pharmaceutica	1. pro.	Plistonius Praxagoræ	
		P 4	discip

INDEX.

discipulus 1.in pro.	Pterygion	6.19
Podagra li.2.c.6. &	Ptolemaeus rex	5.23
4.24	Ptolemaeus chirurgus	6.7
Podagra calidae cura-	Pueritia quibus mor-	
tio, per malagma	bus periclitetur	2.1
5.18	Pulmo ubi situs sit, &	
Polypus	qualis sit	4.1
6.8	Pulmonis morbus, quae	
Polypus in naribus	pericula portendat	
7.10	2.7	
Ponderum ratio	Pulmonis percussi fig.	5.26
5.17	Purgantia	5.5
Porrigo	Purgationes reiectae ab	
6.2	Asclepiade	1.2
Potionum differentiae	Purgationes interdum	
2.17	necessariae, interdum	
Potiones in febris,	inutiles	1.3
quando & quomo-	Pustulae in oculis	6.6
do dari debeant	Pustularum genera	5.28
3.6	Pus, eiusque differentia	
Praxagoras lib. 1.	5.26	
in proce.	Puris significatio	2.7
Prandium quid requi-	Pus coquētia siue ma-	
rat	turantia, & mouen-	
1.3	tia	5.3
Protarchus	5.28	
5.28	Pyloros	4.1
Proptosis	6.6	
6.6	Pyrites	5.18
Prudens medicus quis		
habeatur		
5.26		
Psorici descriptio		
6.6		
Psydration		
5.28		
Psylli, quibus medica-		
mentis vtuntur ad-		
uersus venena		
5.26		
	Pyth	

I N D E X.

Pythagoras	1.pro.	gna	5.26
Q		Resolutio stomachi	4.5
Quartana memi-		Resolutio oculorū	6.6
nem iugulat		Rhagadia	6.18
3.15		Rhyas	7.7
in Quartana veteri,		Rhyposes emplastrum	
quid obseruare profit	5.19		
3.15		Rodentia	5.6
Quartane febris cura-		Rose natura in medi-	
tio	ibidem	cina	3.9
R		S	
Adius	8.1	Acer ignis	5.18
Rationalis me-		Sanguis ex nari-	
dicus quis & vnde		bus, quibus sepe fluit	
dicatur	1.pro.	2.5	
aduersus Rabidi canis		Sanguinis detractio,	
morsum	5.26	quot modis fiat	2.9
Ramex	7.18	Sanguinis natura &	
Ramicis curatio	7.22	proprietas	4.3
Recidua quando ti-		Sanguinem supprimens	
menda	3.4	tia	5.8
Refrigerantia quæ	1.3	ad Sanguinem suppri-	
Regius morbus, et cur		mēdū malagma	5.18
ita dictus sit	3.24	Sanguis, atq; eius diffe-	
Renes, & eorum situs		rentia	5.26
4.1		aduersus Sanguinis pro-	
Renum curatio	4.10	fusionem in vulneri-	
Renum percussorum si-		bus	eodens
ue vulneratorum si-		Aduersus Sanguisu-	
		gans	

INDEX.

gam	ibidem	cap.1	
Sanies, & eius diffe-		Septi trāuersi percussi	
rentia	ibidem	signa	5.26
de Sanitate tuenda li-		Septicum	7.21
brum scripsit Ascle-		Serapion	1.in proœ.
piades	1.3	Siccitas quid mali in-	
Satietas nimia nunquā		ferat corporibus	2.1
utilis	1.2	Signa in ægrotantibus	
Sarcophagus	4.c.vlt.	bona quæ sint	2.2
Sarcocoele	7.18	Signa in ægrotantibus	
Sasagoras	5.8	mala quæ sint	2.3
Scapule	8.1	Signa longæ valetudi-	
Scoptula	eodem	nis quæ sint	2.4
Scorpio sibi ipse me-		Signa membrorū per-	
detur	5.26	cussorum	5.26
aduersus Scorpionis i-		Silanus	3.18
ctum	ibidem	Siligo	2.7
Scrotum, quod et scor-		Singultus frequēs quid	
tum quidam dicere		indicet	2.5
malunt	7.18	Singultus sternutamē-	
Secundæ quæ sint	7.29	to finitur	2.7
Secunda mensa	1.2	Spagitites venæ	4.1
Seminis profusio, & e-		Spasmos	2.1
ius curatio	4.21	Spina luxata quomo-	
Senectus, quibus mor-		do restitui debeat	
bis magis obnoxia sit	7.14		
2.1		Sputum quid significet	
Septū transuersum li.1.	2.7		
in proœ. & lib.4.		Staphyloma	7.7
		Statu	

I N D E X.

Statura longa	2.1	periculosissima est	
Steatomata	7.6	1.3	
Sternutamenta quomo- do excitanda	5.22	Suffusio oculorum	6.6
Stercus animalium	5.	Sumpturis cibum post fatigationē, quæ ob- servanda	1.3
Stomachum infirmum		Suppurationes	3.27
indicantia	1.8	Supprimentia sangui- nem	5.1
Stomacho laborantibus quæ agēda sint eod.		Suturæ in capite quot sint	8.1
Stomachi infirmitas		Sycosis	6.3
quibus signis cogno- scatur ibidem		Synanche	4 4
Stomachus nonnunquā pro gula accipitur	4.1	T	
Stomachi duplex signi- ficatio ibidem		Tabes	2.1. & 4.7
Stomachi curatio	4.5	Tabes, eiusque species	3.22
Stomachi percussi sig.	5.26	Tali	8.1
Stomachus studiosorū qualis plerūq; sit	1.2	Talus luxatus, quomo- do restitui debeat	8.22
Stomoma	6.6	Telum latum, quomodo educendum	7.5
Stranguria	2.1	Telis extrahēdis reme- dium eodem	
Struma	5.28	Tempora anni consi- deranda	1.3
Strophos	2.6	Tempestates, quæ opti- mæ,	
Sudanti ex labore & itinere frigida potio			

INDEX.

<i>ma</i> , quæq; pessimæ		<i>Tormina</i> quando peri-	
2.1		culosa non sint	2.7
<i>Terebra</i>	8.3	<i>Tormina</i> quibus bona	
<i>Tetanus</i>	2.1. &	sint	eodem
4.3		<i>Tormina</i> , id est dysen-	
<i>Tetherapeumena</i>	5.19	teria	4.15
<i>Tetrapharmacum em-</i>		<i>Tristitia</i> longa quid in-	
<i>plastrum</i>	5.19. &	dicet	2.5
6.18		<i>Tussis</i>	4.4
<i>Testiculorum natura, et</i>		<i>Tympanites</i>	3.21
<i>eorum morbi</i>	7.18		
<i>de Testiculorum mor-</i>		V	
<i>bis</i>	6.18	V <i>Aletudinis in-</i>	
<i>Testiculorum incisio</i>		<i>stantis quæ si-</i>	
7.19		gna	lib. 1. pro.
<i>Tharrias medicus</i>		<i>Valentissimum</i> quid	
3.20		2.17	
<i>Themison</i>	1. in pro.	<i>Vari</i>	6.5
<i>Theodoti collyrium</i>	6.6	<i>Varices</i> quomodo cu-	
<i>Therioma</i>	5.28	randi sint	7.17
<i>Theosenus</i>	5.18	<i>Varicum curatio</i>	7.31
<i>Thymium</i>	5.28	<i>Veetus</i> toto die quid fa-	
<i>Tibiæ</i>	8.1	cere debeat	1.3
<i>Tinæi compositio</i>	5.22	<i>Ventrem solutum</i> quid	
<i>Titio extinctus</i>	3.12	comprimat	eodem
<i>Tonsillarum vitium</i>		<i>Ventrem compressum</i>	
6.10		quid soluat	eodem
<i>Tonsillis laborantibus,</i>		<i>Ventriculus</i> ex quibus	
<i>quid conueniat</i>	1.5	constet, & eius si-	
		tus	4.1
		<i>Ventri</i>	

INDEX.

<i>Ventriculus ex quibus constet, & eius si- tus</i>	4.1	<i>Vesica vulnerata signa</i>	5.26
<i>Ventriculi vulnerati si- gna</i>	5.26	<i>Viuerē elatum Ascle- piades funeri obuius intellexit</i>	2.5
<i>Venarū ora subito sup- pressa, alioqui san- guinem fundere con- suetā, quid indicent</i>	2.7.	<i>Viuerum corpora inci- dere, crudele & su- peruacuum esse</i>	1.
<i>Venere abstinendum quando, & quando non sit</i>	1.3	<i>Umbilici prominentis curatio</i>	6.17
<i>Venti qui nā salubres, & qui non sint</i>	1.1	<i>Umbilici vitia quomo- do curari debeant</i>	7.18
<i>Venenis omnibus con- trarium quid</i>	5.26	<i>Ungues</i>	8.1
<i>aduersus Venenosorum animalium ictus eodem</i>		<i>Uñctio</i>	1.3
<i>Ver saluberrimum</i>	2.1	<i>Vomitū quando, & quibus utilis aut inu- tilis eodem</i>	
<i>Vere quæ ad victum magis conueniant</i>	1.3	<i>Vomitū si post cibum fieri debeat, quomo- do prouocandus eod.</i>	
<i>Vere qui morbi fiant</i>	2.1	<i>Urina sana quæ</i>	1.2
<i>Vertebræ</i>	8.1	<i>Urine reddendæ diffi- cultati, quomodo suc- curratur lib.7.ca.26. & lib.1.ca.25</i>	
<i>Vesica, & eius si- tus</i>	4.1	<i>Urina parum liquida, in sano homine quid signi</i>	

INDEX.

significet	2.5	Vulsella	7.30
Urina que mala	2.3	Vulua & eius situs	
Ureteres	4.1	4.1	
Uti synanche	4.4	Vulua percussa signa	
Uua morbus intra fau-		3.26	
ces	6.14. & 7.12	Vulua natura mirabi-	
Vulnera quomodo glu-		lis	7.21
tinanda	5.26		
Vulnerum signa eode		Z	
Vulnerum differentie			
ex ipso morsu eode		Z Enon	lib.5.
Vulnus glutinantia	5.2	Z in proce.	
Vulnera aperientia	5.4	Zopyrus	li.5.ca.25

FINIS.

